

MOXIPEN POWDER FOR ORAL SUSPENSION

Amoxycillin (125mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Moxipen
2. Bagaimana Moxipen berfungsi
3. Sebelum menggunakan Moxipen
4. Cara menggunakan Moxipen
5. Semasa menggunakan Moxipen
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Moxipen
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Moxipen

Ia digunakan untuk merawat jangkitan bakteria di dalam telinga dan tekak, saluran kencing, kulit dan tisu lembut.

Ia juga boleh digunakan untuk merawat jangkitan penyakit kelamin dan salur genital.

Bagaimana Moxipen berfungsi

Amoxycillin adalah antibiotik yang membunuh bakteria di dalam badan manusia.

Sebelum menggunakan Moxipen

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Moxipen jika anda:

- alah (hipersensitif) terhadap Amoxycillin, Penicillin atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini. Simptom tindak balas alahan seperti ruam, gatal-gatal atau bengkak pada kulit, bengkak pada muka, bibir, lidah, tekak yang mana boleh mengakibatkan kesukaran untuk menelan atau bernafas; lelah atau sesak bernafas.
- menghadapi jangkitan virus, *infectious mononucleosis* di mana pesakit akan demam, sakit tekak dan keletihan.

-Sebelum mula menggunakan

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Moxipen jika anda:

- alah terhadap sebarang ubat, makanan, pewarna atau bahan pengawet.
- mempunyai masalah buah pinggang atau hati.
- Demam-glandular (*mononucleosis*) atau gangguan darah. hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Moxipen

-Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak dengan berat 20kg ke atas:

10ml-20ml (250-500mg) setiap 8 jam.

Bayi dan kanak-kanak dengan berat 8-20kg:

6.7 – 13.3mg/kg berat badan.

Bayi dengan berat 6-8kg:

50-100mg setiap 8 jam.

Bayi sehingga berat 6kg:

25-50mg setiap 8 jam.

Ikut arahan doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Mereka mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, sila bertanya pada doktor atau ahli farmasi anda untuk bantuan.

-Bila perlu digunakan

Boleh diambil sebelum atau selepas makan. Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang. Jangan berhenti mengambil ubat, walaupun anda berasa lebih baik selepas beberapa hari, kecuali dinasihatkan oleh doktor anda. jangkitan anda mungkin tidak hilang sepenuhnya jika anda berhenti mengambil ubat anda terlalu awal.

-Jika terlupa menggunakannya

Ambil secepat mungkin sebaik sahaja anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda fikir anda atau sesiapa sahaja mungkin telah mengambil ubat ini berlebihan. Ambil tindakan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil secara berlebihan boleh menyebabkan ketidakselesaan perut dan usus, seperti loya, cirit-birit dan muntah-muntah.

Semasa menggunakan Moxipen

-Perkara yang perlu dilakukan

- Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil ubat.
- Gunakan air untuk membancuh serbuk. Tuangkan air sehingga ke tanda 60ml yang terdapat pada botol. Goncang botol untuk memastikan semua serbuk basah dan larut. Simpan ubat yang telah dibancuh di dalam peti sejuk.
- Sebelum mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor atau ahli farmasi bahawa anda mengambil Moxipen.
- Beritahu doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda mengambil Moxipen.
- Maklumkan kepada doktor jika simptom tidak berkurangan dalam masa beberapa hari atau menjadi lebih teruk.
- Maklumkan kepada doktor dengan segera jika anda mengalami cirit-birit yang teruk. Maklumkan juga jika ia berlaku selepas beberapa minggu anda berhenti mengambil Moxipen. Cirit-birit menandakan anda mungkin mengalami keadaan yang serius dan menjejaskan usus. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.
- Beritahu doktor jika anda menjadi hamil semasa mengambil Moxipen.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil ubat yang telah dibancuh selepas 5 hari.

Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Hati-hati ketika memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana kesan Moxipen terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda secepat mungkin jika anda tidak berasa sihat semasa anda mengambil Moxipen.

Moxipen merawat jangkitan dalam kebanyakan orang, tetapi ia mungkin mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini pada sesetengah orang.

Semua ubat mempunyai kesan sampingan. Ada yang yang serius, namun kebanyakannya tidak. Anda mungkin memerlukan rawatan jika anda mengalami beberapa kesan sampingan.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika ada sebarang persoalan.

Jangan terkejut dengan senarai kesan sampingan yang dijangka. Anda mungkin tidak mengalami sebarang kesan sampingan.

- Tindak balas alahan seperti ruam kulit, gatal-gatal, melepuh atau pengelupasan kulit.
- Cirit-birit, rasa loya, muntah-muntah.
- Kerosakan hati.
- Bacaan darah yang tidak normal.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835550, atau lawan web portal.bpfk.gov.my (consumers → Reporting)

Cara penyimpanan dan pelupusan Moxipen

-Penyimpanan

Simpan di bawah 25°C. Di tempat dingin dan kering.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

- Sebelum dibancuh:

Serbuk putih, berderai dengan bau buah-buahan.

- Selepas dibancuh:

Suspension berwarna kuning dengan perisa buah-buahan.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Amoxycillin Trihydrate

Bahan tidak aktif

Colloidal Silicon Dioxide, Sodium Carboxy Methyl Cellulose, Tutti-frutti Flavour, Quinoline Yellow, Saccharin Sodium, Lactose, Sodium Benzoate, Disodium Edetate.

-Nombor MAL

MAL19900374AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

12 Mac 2020