

SEDILIX-DM LINCTUS

Pseudoephedrine Hydrochloride/ Dextromethorphan Hydrobromide/Promethazine Hydrochloride (30mg/15mg/3.125mg setiap 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sedilix-DM Linctus
2. Bagaimana Sedilix-DM Linctus berfungsi
3. Sebelum menggunakan Sedilix-DM Linctus
4. Cara menggunakan Sedilix-DM Linctus
5. Semasa menggunakan Sedilix-DM Linctus
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Sedilix-DM Linctus
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Sedilix-DM Linctus

Sedilix-DM Linctus digunakan untuk:

- melegakan batuk tanpa kahak yang berkaitan dengan selsema atau jangkitan saluran pernafasan.
- melegakan hidung tersumbat, bersin, dengan selsema berair yang berkaitan alergi dan selsema.

Bagaimana Sedilix-DM Linctus berfungsi

Dextromethorphan Hydrobromide membantu menghentikan batuk dengan bertindak secara pusat untuk meningkatkan ambang refleks batuk. Phenylephrine Hydrochloride melegakan hidung tersumbat dengan mengurangkan bengkak pada salur darah di saluran pernafasan, untuk memudahkan bernafas. Promethazine Hydrochloride ialah antihistamina dan menghalang bahan semula jadi (histamina) yang dihasilkan dalam badan semasa tindak balas alergi.

Sebelum menggunakan Sedilix-DM Linctus

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Sedilix-DM Linctus jika anda:

- alah (hipersensitif) terhadap baha-bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- Produk ini mengandungi promethazine hydrochloride. Ia tidak sesuai digunakan di kalangan kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun kerana potensi untuk kesukaran bernafas dan boleh menyebabkan kematian. Harus digunakan dengan berhati-hati dan mengikut nasihat doktor/ahli farmasi bagi kanak-kanak yang berumur 2 hingga 6 tahun.

- Sebelum menggunakan Sedilix-DM Linctus

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Sedilix-DM Linctus jika anda:

- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.
- mengalami batuk yang berterusan akibat merokok, penyakit paru-paru atau lelah.
- batuk dengan kahak berlebihan.
- mempunyai masalah hati, paru-paru, jantung atau metabolik seperti lelah, tekanan darah tinggi, tinggi kandungan gula darah, kelenjar tiroid terlampau aktif.
- sedang mengambil ubat penenang seperti MAOIs (monoamine oxidase inhibitors) atau dalam tempoh 2 minggu selepas tamat rawatan.
- mempunyai sawan.
- mengalami pembesaran prostat dan/atau gangguan pundi kencing.
- mempunyai glaucoma (tekanan di dalam mata meningkat).
- mempunyai masalah gastrousus.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sedilix-DM berkemungkinan akan memberikan tindak balas dengan betahistine, sesetengah ubat hipnosis dan anxiolytic, juga ubat jenis metoclopramide dan antiparkinson.

Cara menggunakan Sedilix-DM Linctus

- Berapa banyak harus digunakan

- Dewasa dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas: 10ml setiap 6 jam.
- Kanak-kanak 6 hingga 12 tahun: 5ml setiap 6 jam.
- Kanak-kanak 2 hingga 5 tahun: 2.5ml setiap 6 jam.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat mengikut preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang. Jika simptom-simptom tidak bertambah baik dalam masa seminggu atau berserta demam, hubungi doktor sebelum meneruskan penggunaan ubat.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Simptom-simptom terlebih dos termasuk sukar bernafas, psikosis paranoia, khayal, halusinasi, tekanan darah tinggi dan kadar degupan jantung perlahan.

Semasa menggunakan Sedilix-DM Linctus

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Sedilix-DM Linctus.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil ubat.
- Minum dan telan ubat secara perlahan. Sebaiknya diambil tanpa air.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

SEDILIX-DM LINCTUS

Pseudoephedrine Hydrochloride/ Dextromethorphan Hydrobromide/Promethazine Hydrochloride (30mg/15mg/3.125mg setiap 5ml)

- Jangan berkongsi Sedilix-DM Linctus dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alah terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- hamil atau menyusukan anak.
- mengalami masalah hati, paru-paru dan/atau jantung.
- Jangan minum minuman beralkohol atau mengambil ubat yang boleh menyebabkan mengantuk semasa mengambil ubat ini.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

- Rasa mengantuk, pening.
- Sembelit.
- Mulut kering.
- Gangguan gastrousus.
- Sukar tidur, keresahan.
- Gangguan mental.
- Denyutan jantung yang tidak normal.
- Sakit dada.
- Ruam.
- Masalah darah.
- Rembesan yang pekat.

Ini bukan senarai kesan-kesan sampingan yang lengkap. Seperti ubat-ubatan lain, Sedilix-DM Linctus boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.moh.gov.my [Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Sedilix-DM Linctus

- Penyimpanan

Simpan di tempat dingin di bawah 30°C. Jauhi dari kanak-kanak. Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Sirap berwarna coklat. Didapati dalam bungkus 90ml dan 120ml.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan-bahan aktif
Dextromethorphan Hydrobromide,
Pseudoephedrine Hydrochloride,
Promethazine Hydrochloride.
- Bahan-bahan tidak aktif
Syrup, Glycerin, Citric Acid Anhydrous, Sodium Citrate, Ascorbic Acid, Sodium Sulphite, Sodium Metabisulphite, Saccharin Sodium, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Menthol, Chloroform Spirit, Liquid Caramel, Cherry Flavour, Purified Water.

- Nombor MAL

MAL19913393AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

08/03/2019

Nombor Siri

NPRA(R2/1)190219/49