

SOFILEX POWDER FOR ORAL SUSPENSION

Cephalexin (125mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Sofilex
2. Bagaimana Sofilex berfungsi
3. Sebelum menggunakan Sofilex
4. Cara menggunakan Sofilex
5. Semasa menggunakan Sofilex
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Sofilex
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Sofilex

Ia digunakan untuk merawat jangkitan bakteria di dalam telinga, saluran pernafasan, saluran kencing, kulit dan tisu lembut.

Bagaimana Sofilex berfungsi

Cephalexin adalah antibiotik yang membunuh bakteria di dalam badan manusia.

Sebelum menggunakan Sofilex

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan *Sofilex* jika anda alah (hipersensitif) terhadap Cephalexin, kumpulan antibiotik Cephalosporin, Penicillin atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.

- Sebelum mula menggunakan Sofilex

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan *Sofilex* jika anda:

- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.
- mempunyai masalah buah pinggang.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan. Beritahu doktor jika anda mengambil ubat lain, khususnya:

- sebarang antibiotik
- ubat diuretik (tablet air) seperti Furosemide
- Probenecid untuk rawatan gout

Cara menggunakan Sofilex

- Berapa banyak harus digunakan

- Kanak-kanak 6-12 tahun:
10ml (250mg) setiap 8 jam
- Kanak-kanak 1-5 tahun:
5ml (125mg) setiap 8 jam
- Kanak-kanak berusia di bawah 1 tahun:
5ml (125mg) setiap 12 jam

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Diambil sebelum atau selepas makan. Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan ketidakselesaan perut, rasa loya, cirit-birit, muntah-muntah dan kencing berdarah.

Semasa menggunakan Sofilex

- Perkara yang perlu dilakukan

- Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil ubat.
- Gunakan air untuk membancuh serbuk. Tuangkan air sehingga ke tanda 60ml yang terdapat pada botol. Goncang botol untuk memastikan semua serbuk basah dan larut. Simpan ubat yang telah dibancuh di dalam peti sejuk.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Sofilex*.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil ubat yang telah dibancuh selepas 7 hari.
- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi *Sofilex* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alah terhadap Cephalexin atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- hamil atau menyusukan anak.
- mengalami masalah hati dan/atau buah pinggang.
- mempunyai jangkitan bakteria, kulat atau virus.

Kesan-kesan sampingan

- Gatal kulit dengan tompok merah pucat, bengkak dan lebam.
- Ruam kulit.
- Cirit-birit, rasa loya, muntah-muntah.
- Demam.
- Keradangan kolon.
- Bacaan darah yang tidak normal.

Sofilex akan mengakibatkan alahan yang serius dan reaksi pada kulit. Hentikan pengambilan *Sofilex* dan jumpa ahli medical dengan segera sekiranya mengalami simptom seperti berikut: kemerahan kulit, lepuh, ruam kulit, sakit tekak atau irtasi mata.

Seperti ubat-ubatan lain, *Sofilex* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [Consumers→Reporting Side Effects to Medicinal (ConSERF) or Vaccine (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Sofilex

-Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

Jauhi dari kanak-kanak.
Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

- Sebelum dibancuh:
Serbuk putih, berderai dengan bau blackcurrant..
- Selepas dibancuh dengan air:
Suspension berwarna kuning pucat dengan perisa blackcurrant.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Cephalexin Monohydrate
- Bahan tidak aktif
Sodium Benzoate, Blackcurrant Flavour, Sodium Carboxy Methyl Cellulose, Saccharin Sodium, Colloidal Silicon Dioxide, Lactose Anhydrous

- Nombor MAL

MAL19984839AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

08/09/2021

Nombor Siri

NPRA(R4/1))130319/00072