

PRISTINEX CREAM 2%

Ketoconazole (2%w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pristinex cream
2. Bagaimana Pristinex Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Pristinex Cream
4. Cara menggunakan Pristinex Cream
5. Semasa menggunakan Pristinex Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pristinex Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pristinex Cream

Untuk kegunaan pada kulit. Digunakan untuk merawat:

- jangkitan *ringworm* pada tangan dan kaki, tapak kaki dan di pangkal peha.
- jangkitan yis.
- radang kulit seperti bersisik, kulit mengelupas, gatal dan merah.

Bagaimana Pristinex Cream berfungsi

Ketoconazole merupakan antikulat yang melambatkan pertumbuhan kulat yang membawa jangkitan kepada badan.

Sebelum menggunakan Pristinex Cream

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan guna ubat ini jika anda ada alahan (hipersensitif) terhadap Ketoconazole atau bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.

- Sebelum menggunakan Pristinex Cream

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- hamil atau sedang menyusukan anak.
- mengambil ubat lain pada masa yang sama.
- mempunyai alahan terhadap ketoconazole atau kandungan lain yang terdapat di dalam ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Pristinex Cream

- Berapa banyak harus digunakan

Rigworm dan jangkitan yis:
Disapukan 1 kali sehari.

Radang kulit:

Disapukan 1 -2 kali sehari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini. Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlewat.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan berlebihan boleh mengakibatkan kulit menjadi merah, bengkak dan rasa bahang.

Semasa menggunakan Pristinex Cream

- Perkara yang perlu dilakukan

- Cuci tangan sebelum dan selepas menggunakan krim ini.
- Gosokkan ubat dengan perlahan ke atas kawasan jangkitan.
- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan *Pristinex Cream*.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Krim ini hanya untuk kegunaan pada kulit sahaja. Tidak boleh ditelan.
- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi *Pristinex Cream* dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alah terhadap bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- mengambil sebarang ubat pada masa yang sama.
- Hamil atau menyusukan anak.

Kesan-kesan sampingan

Kulit gatal dan rasa bahang.

Seperti ubat-ubatan lain, *Pristinex Cream* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau alahan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Pristinex Cream

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Krim berwarna putih, licin dan sekata.

Didapati di dalam tiub aluminium 15g.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Ketoconazole

- Bahan tidak aktif

Purified Water, Cetomacrogol 1000,

White Soft Paraffin, Methyl

Hydroxybenzoate, Propyl

Hydroxybenzoate, Cetostearyl Alcohol,

Disodium Edetate dan Liquid Paraffin.

- Nombor MAL

MAL19984838AZ

**Pengilang dan Pemegang Pendaftaran
Produk**

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd

1-5 Cheng Industrial Estate,

75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/08/2020

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200818/501