

FEBRICOL TABLET

Paracetamol/Pseudoephedrine hydrochloride/Chlorpheniramine maleate (500mg/30mg/2mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Febricol
2. Bagaimana Febricol berfungsi
3. Sebelum menggunakan Febricol
4. Cara menggunakan Febricol
5. Semasa menggunakan Febricol
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Febricol
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Febricol

Febricol digunakan untuk melegakan sakit kepala, sakit otot, demam, bersin, kesesakan hidung, gatal dan mata berair yang disebabkan selsema dan rinitis alahan (radang pada membran mucus dalam hidung).

Bagaimana Febricol berfungsi

Paracetamol merawat sakit ringan dan mengurangkan demam dengan cara menghalang tindakan *prostaglandin* yang dihasilkan semasa keradangan.

Pseudoephedrine hydrochloride adalah sejenis dekongestan yang berfungsi dengan menyempitkan saluran darah untuk mengurangkan pembengkakan dan kesesakan hidung.

Chlorpheniramine Maleate membantu mengurangkan rembesan dalam hidung dengan menghalang tindakan histamina, sejenis bahan semulajadi yang dihasilkan dalam badan semasa tindakbalas alergi.

Sebelum menggunakan Febricol

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Febricol jika anda:

- alah (hipersensitif) terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- ingin menggunakannya pada kanak-kanak berusia di bawah 12 tahun.

- Sebelum mula menggunakan Febricol

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Febricol jika anda:

- mempunyai glaukoma (tekanan tinggi dalam mata)
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.
- mengambil ubat lain yang mengandungi Paracetamol.
- Sedang mengambil ubat untuk kemurungan seperti MAOIs (monoamine oxidase inhibitors) atau dalam masa 2 minggu selepas tamat rawatan.

- mempunyai masalah hati, jantung, buah pinggang, atau metabolik seperti, tekanan darah tinggi, kandungan gula darah yang tinggi, kelenjar tiroid terlampau aktif.
- mengalami pembesaran prostat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Febricol mungkin berinteraksi dengan:

- *sympathomimetic (decongestant, tricyclic antidepressant, appetite suppressants dan amphetamine-like psychostimulants)*
- *monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)*
- *bretylum, bethanidine, guanethidine*
- *deprisoquine, methyldopa*
- α - dan β -adrenergic blocking agents

Cara menggunakan Febricol

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas

- 1 – 2 tablet setiap 4 – 6 jam.
- Maksimum 8 tablet sehari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Sebaiknya diambil selepas makan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat mengikut preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan dos berlebihan boleh mengakibatkan muntah-muntah, loya, lemah, denyutan jantung yang cepat, tekanan darah tinggi, peluh berlebihan dan keresahan.

Semasa menggunakan Febricol

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Febricol.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil ubat.
- Telan tablet bersama air dan cuba mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan berkongsi Febricol dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.
- Jangan kunyah tablet.
- Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Ubat ini boleh menyebabkan mengantuk. Jika terjadi, jangan memandu atau mengendalikan mesin.
- Jangan mengambil minuman beralkohol atau mengambil ubat yang mungkin menyebabkan kesan mengantuk semasa mengambil ubat ini.

Amaran alergi:

Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Simptom mungkin termasuk kulit kemerahan, lepuh atau ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan yang serius.

Sekiranya tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

FEBRICOL TABLET

Paracetamol/Pseudoephedrine hydrochloride/Chlorpheniramine maleate (500mg/30mg/2mg)

Kesan-kesan sampingan

- Pening, keletihan.
- Pergerakan badan yang tidak terkawal dan bergetar.
- kegelisahan, keresahan, sukar tidur, kegemuruhan, keterujaan, kerengsaan, kekeliruan.
- Loya, muntah, cirit-birit atau sakit gastrik.
- Mulut kering, rembesan mukus yang tebal, sesak dada.
- Penglihatan kabur.
- Kesukaran untuk kencing bagi lelaki yang mengalami pembesaran prostat.
- Sembelit.
- Denyutan jantung tidak normal
- Tekanan darah tinggi.
- Reaksi hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, angioedema, Stevens Johnson Syndrome / Toksik Epidermal Necrolysis telah dilaporkan.

Seperti ubat-ubatan lain, *Febricol* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Febricol

- Penyimpanan

Simpan di tempat kering dan sejuk dan di bawah 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berwarna hijau muda, berbentuk bulat, bertepi serong dan rata, dicetak timbul dengan logo pada satu permukaan dan garis putus pada permukaan satu lagi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan-bahan aktif

Paracetamol, Pseudoephedrine Hydrochloride dan Chlorpheniramine Maleate.

- Bahan-bahan tidak aktif

Povidone, Magnesium Stearate, Purified Water, Colloidal Silicon Dioxide, Sodium Starch Glycolate, Starch, Quinoline Yellow, FDC Blue, Isopropyl Alcohol, Dioctyl Sodium Sulphosuccinate.

- Nombor MAL

MAL20013375AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

12/03/2020

Nombor Siri

BPFK(R4/1)180815/00255