

Province Tablet 4mg

Setiap tablet mengandungi Perindopril Erbumine 4mg.

Apakah yang ada pada risalah ini?

- *Apakah kegunaan Province*
- *Bagaimana Province berfungsi*
- *Sebelum mengambil Province*
- *Cara mengambil Province*
- *Semasa mengambil Province*
- *Kesan-kesan sampingan*
- *Cara penyimpanan Province*
- *Deskripsi produk*

Apakah kegunaan Province

Ia digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi (hipertensi) dan kegagalan jantung.

Bagaimana Province berfungsi

Perindopril merupakan perencat bagi angiotensin converting enzyme (ACE). Ia menyekat penukaran angiotensin (hormon) kepada bentuk aktif yang mengecutkan saluran darah dan seterusnya meningkatkan tekanan darah.

Sebelum mengambil Province

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika anda:

- alahan (hipersensitif) kepada perindopril, bahan lain yang terkandung di dalam ubat ini atau perencat ACE yang lain.
- pernah mengalami angioedema (bengkak pada muka, mata, bibir, lidah) setelah mengambil perencat ACE.
- ahli keluarga pernah mengalami angioedema (kebengkakan) di bawah sebarang keadaan.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

Sebelum mula mengambil

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai tekanan darah yang rendah
- mempunyai saluran darah tersumbat
- mempunyai kegagalan fungsi ginjal dan/atau menjalani rawatan hemodialisis
- mempunyai sejarah keluarga angioedema (bengkak pada muka, mata, bibir, lidah)
- akan mengambil ubat bius
- mempunyai diabetes
- ada mengambil ubat penurunan tekanan darah yang lain.
- ada mengambil litium

Jika mengambil lain-lain ubat

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

Cara mengambil Province

Berapa banyak harus diambil

Tekanan darah tinggi:

4mg sekali sehari. Dos boleh ditingkatkan kepada 8mg sekali sehari berdasarkan preskripsi.

Kegagalan jantung:

2mg sekali sehari. Dos boleh ditingkatkan kepada 4mg sekali sehari berdasarkan preskripsi.

Doktor atau ahli farmasi akan preskrip kekuatan ubat yang bersesuaian, bergantung kepada keadaan anda, rawatan semasa dan risiko berlainan setiap individu

Bila perlu diambil

Satu kali sehari, diambil pada awal pagi sebelum sarapan.

Berapa lama perlu diambil

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Jika anda terlupa mengambil

Ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan

Simptom akibat dos berlebihan termasuk:

- tekanan darah yang rendah
- kekurangan bekalan darah di dalam badan
- ketidakseimbangan elektrolit
- kegagalan fungsi ginjal
- denyutan jantung tidak normal (terlalu cepat atau terlalu perlahan)
- pening
- batuk
- kegelisahan

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil berlebihan atau bimbang akan keadaan yang dialami.

Semasa mengambil Province

Perkara yang harus dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil tablet. Makan tablet bersama air dan cuba

mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan kunyah tablet. Telan tablet dengan air. Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alahan kepada bahan yang terkandung di dalam ubat ini.
- batuk setelah mengambil ubat ini.
- mengalami tekanan darah rendah dan/atau angioedema.
- mengalami peningkatan paras kalium dalam darah.
- mempunyai bacaan sel darah putih yang tidak normal.
- mempunyai (kurang sel darah merah) anemia.
- mempunyai kegagalan fungsi hati.
- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.

Kesan-kesan sampingan

- Sakit kepala, pening, sesemut atau sakit seperti ditusuk.
- Gangguan penglihatan.
- Bebunyi di telinga (tinnitus).
- Tekanan darah rendah.
- Batuk.
- Sukar untuk bernafas.
- Loya, muntah, sakit perut.
- Gangguan deria rasa, masalah penghadaman.
- Cirit-birit, sembelit.
- Ruam kulit dan gatal-gatal.
- Kekejangan otot.
- Lemah atau kurang bertenaga.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan Province

Simpan dalam suhu bilik di bawah 30°C. Lindungi dari kelembapan.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

Deskripsi produk

Rupa dan warna produk

Tablet cembung biasa, berwarna putih dengan garis tengah pada satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain. Didapati dalam blister strips 10's di dalam kotak bungkusan 30 tablet.

Bahan aktif

Perindopril Erbumine 4mg.

Bahan tidak aktif

Colloidal Silicon Dioxide, Cellactose, Microcrystalline Cellulose, Lactose Anhydrous and Magnesium Stearate.

Nombor pendaftaran

MAL04125486AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Product

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Tarikh kemaskini: 04 April 2024

Nombor Siri

NPRA(R2/1)240325/1237