

# EYE MO REGULAR EYE DROPS

Boric Acid (1.3% w/v) dan Sodium Borate (0.32% w/v)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Eye Mo Regular Titis Mata
2. Bagaimana Eye Mo Regular Titis Mata berfungsi
3. Sebelum menggunakan Eye Mo Regular Titis Mata
4. Cara menggunakan Eye Mo Regular Titis Mata
5. Semasa menggunakan Eye Mo Regular Titis Mata
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Eye Mo Regular Titis Mata
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini

## Apakah kegunaan Eye Mo Regular

Digunakan untuk melegakan kerengsaan mata yang tidak keterlaluan seperti kegatalan dan kepedihan mata akibat terdedah kepada faktor persekitaran luar yang boleh mengancam mata seperti cahaya terik matahari, debu, asap dan pencemaran udara yang lain.

## Bagaimana Eye Mo Regular berfungsi

Asid Borik mempunyai sifat bakterostatik yang lemah dan sifat fungistatik.

Asid Boric digunakan bersama Natrium Borat dan bertindak sebagai penampungan dan antimikrobial di dalam titis mata.

## Sebelum menggunakan Eye Mo Regular

### - Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Eye Mo Regular Titis Mata jika anda alah (hipersensitif) terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam ubat ini.

### - Sebelum mula menggunakan Eye Mo Regular

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Progesic jika anda:

- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusukan.
- Menggunakan ubat mata lain
- Memakai kanta lekap

### - Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

## Cara menggunakan Eye Mo Regular

### - Berapa banyak harus digunakan

Titis 2-5 titik pada mata yang berjangkit, 4-5 kali sehari atau sehingga perlu.

### - Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

### - Berapa lama perlu digunakan

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

### - Jika terlupa menggunakan

Guna secepat mungkin sebaik sahaja anda teringat. Ambil dos seterusnya mengikut masa yang ditetapkan.

### - Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Cuci mata anda atau dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil secara berlebihan atau bimbang dengan keadaan yang dialami.

## Semasa menggunakan Eye Mo Regular

### - Perkara yang perlu dilakukan

- Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil ubat.
- Tanggalkan kanta lekap sebelum menggunakan ubat ini.
- Tutup penutup botol dengan segera selepas setiap penggunaan.
- Amalkan penggunaan ubat pada waktu yang sama setiap hari.

### - Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Ubat ini tidak boleh dimakan
- Jangan guna kanta lekap sebaik sahaja menggunakan ubat ini. Kanta lekap boleh digunakan sekurang-kurangnya 20 minit kemudian.
- Jangan guna jika ubat berubah menjadi keruh
- Jangan sentuh muncung bekas pada sebarang permukaan untuk mengelakkan pencemaran.
- Tidak disyorkan untuk penggunaan dengan kanta lembut
- Jangan gunakan ubat ini selepas 4 minggu dibuka.

### - Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alah terhadap bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- hamil atau menyusukan anak.
- Mengalami perubahan pada penglihatan

- Rasa tidak selesa selepas menggunakan ubat ini atau keadaan bertambah teruk
- Mengalami sebarang jangkitan.

## Kesan-kesan sampingan

- Mata rasa lecur atau tidak selesa
- Sakit pada mata
- Gatal pada mata
- Mata merah

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

## Cara penyimpanan dan pelupusan Eye Mo Regular Titis Mata

### - Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Jangan guna selepas 4 minggu dibuka.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan guna ubat ini selepas tarikh luput.

### - Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

## Maklumat lanjut

### - Rupa dan warna produk

Cecair steril yang jelas, tidak berwarna, tidak berbau dan bebas dari benda asing. Didapati dalam botol plastic 7.5mL dan 15mL steril bersama penitis

### - Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

*Boric Acid, Sodium Borate.*

- Bahan tidak aktif

*Dibasic Sodium Phosphate, Disodium Edetate, Sodium Chloride, Benzalkonium Chloride, Monobasic Sodium Phosphate, Glycerin, Purified Water, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid.*

### - Nombor MAL:

MAL19973559XC

# EYE MO REGULAR EYE DROPS

Boric Acid (1.3% w/v) dan Sodium Borate (0.32% w/v)

---

**Pengilang dan Pemegang Pendaftaran**

**Produk**

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd  
1-5 Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka, Malaysia.

**Tarikh kemaskini RiMUP**

10/05/2024

**Nombor Siri**

NPRA(R2/1)240503/1265