

# Cafuroid Tablet

(Micronized Purified Flavonoid Fraction 500mg- Diosmin 450mg; Hesperidin 50mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Cafuroid
2. Bagaimana Cafuroid berfungsi
3. Sebelum menggunakan Cafuroid
4. Cara menggunakan Cafuroid
5. Semasa menggunakan Cafuroid
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Cafuroid
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini

## Apakah kegunaan Cafuroid

Cafuroid digunakan untuk merawat:

- simptom yang berkaitan dengan *venolymphatic* (keadaan di mana pengaliran darah ke dalam saluran darah tidak memadai dan mengakibatkan pengumpulan darah pada kaki), seperti terasa berat, sakit dan rimas pada kaki.
- simptom yang berkaitan dengan buasir.

## Bagaimana Cafuroid berfungsi

*Micronized purified flavonoid fraction* mengandungi Diosmin and Hesperidin.

Diosmin adalah bahan sintesis daripada Hesperidin. Hesperidin adalah sejenis flavonoid yang boleh didapati pada buah sitrus.

Cafuroid merawat dan melindungi saluran darah. Ia mengurangkan keregangan pada saluran darah dan kelengahan dalam pengaliran darah. Ia turut menguatkan dan meningkatkan penembusan kapilari darah (cabangan kecil saluran darah).

## Sebelum menggunakan Cafuroid

### Bila anda tidak boleh menggunakan

Jangan guna Cafuroid jika:

- Anda mempunyai alahan pada Diosmin atau Hesperidi.

### Sebelum anda mula menggunakan

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- hamil atau merancang untuk hamil
- sedang menyusukan anak.
- mempunyai masalah buasir.

### Jika mengambil ubat-ubat lain

- Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

## Cara menggunakan Cafuroid

### Berapa banyak harus digunakan

### Dos biasa

2 tablet sehari. 1 tablet pada tengah hari, dan 1 tablet pada waktu makan malam.

### Buasir

4 hari pertama- 6 tablet sehari  
3 hari seterusnya- 4 tablet sehari

### Bila perlu digunakan

Bila diperlukan sahaja. Boleh diambil sejurus selepas makan.

### Berapa lama perlu digunakan

- Sila ikut arahan daripada doktor atau ahli farmasi anda.
- Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

### Jika anda terlupa menggunakannya

Jika anda terlepas dos, dilarang mengambil dos berganda. Dos yang berganda akan menyebabkan dos yang berlebihan.

### Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Tiada laporan khusus mengenai simptom berkaitan terlebih dos.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

## Semasa menggunakan Cafuroid

### Perkara yang perlu dilakukan

- Cafuroid adalah dimakan menerusi mulut.
- Telan perlahan-lahan bersama air.

### Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Dilarang mengambil Cafuroid jika tiada keperluan.
- Dilarang melebihi dos yang dibenarkan.
- Jangan kunyah tablet.

### Perkara yang perlu diberi perhatian

- Sila berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda, terutamanya jika anda alahan pada Cafuroid.

## Kesan-kesan sampingan

Mungkin mengakibatkan ketidakselesaian pada saluran usus, seperti cirit birit, susah penghadaman makanan, mual dan muntah. Keadaan seperti *neurovegetative* pernah dilaporkan dengan penggunaan micronized purified flavonoid fraction. *Neurovegetative* adalah keadaan di mana

kehilangan upaya pada fungsi saraf yang penting dalam meneruskan kehidupan.

Jika anda mengalami tanda-tanda berterusan melebihi 7 hari, sila berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

## Cara penyimpanan dan pelupusan Cafuroid

### Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Tarikh luput produk ini ditunjukkan pada bungkusan.

### Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

## Maklumat lanjut

### Rupa dan warna produk

Tablet berwarna perang dan bersalut lapis, berbentuk bujur, dengan "XS" ukir pada satu belah dan tanpa ukiran pada sebelah yang lain.

### Bahan- bahan kandungan

#### *Bahan aktif*

Diosmin and Hesperidin.

#### *Bahan tidak aktif*

Microcrystalline Cellulose, Povidone, Purified Talc, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl Methylcellulose Compound Mix, Colour Pigmen Red, Colour Quinoline dan air.

### Nombor MAL

MAL

## Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd  
1-5 Cheng Industrial Estate,  
75250 Melaka, Malaysia.

## Tarikh kemaskini RiMUP

28 Ogos 2020

# **Cafuroid Tablet**

(Micronized Purified Flavonoid Fraction 500mg- Diosmin 450mg; Hesperidin 50mg)

---

**Nombor Siri**

NPRA (R2) 20/137