

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Palavo Suspension
2. Bagaimana Palavo Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan Palavo Suspension
4. Cara menggunakan Palavo Suspension
5. Semasa menggunakan Palavo Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Palavo Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Palavo Suspension

Palavo Suspension digunakan untuk melegakan kesakitan tahap ringan hingga kesakitan tahap sederhana dan juga digunakan untuk demam.

Bagaimana Palavo Suspension berfungsi

Palavo Suspension mengandungi paracetamol yang membantu melegakan sakit, merawat demam dan juga mengurangkan bengkak.

Sebelum menggunakan Palavo Suspension

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Palavo Suspension kepada anak anda jika mereka:

- terdapat alah terhadap bahan yang terkandung di dalam ubat ini
- sedang mengambil ubat lain yang juga mengandungi paracetamol.

Sebelum menggunakan Palavo Suspension

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika:

- Anak anda berumur kurang daripada 1 bulan dan/atau 3 bulan

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anak anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Palavo Suspension

Berapa banyak harus digunakan

Jika anda mengetahui berat badan anak anda, gunakannya bagi mendapatkan dos yang betul dengan lebih tepat. Seperti dibawah.

$$\text{Dos} = \frac{\text{BW (kg)} \times 15 \times 5\text{ml}}{120}$$

Body Weight	Dose	How Often
10 kg	6 ml	Jangan mengambil lebih kerap daripada setiap 4 jam dan tidak melebihi lebih daripada empat dos dalam masa 24 jam.
15 kg	9 ml	
20 kg	13 ml	
30 kg	19 ml	

Untuk kegunaan oral (diminum) sahaja. Dos ubat perlu diambil setiap 4 hingga 6 jam, sehingga dos maksima hanya 4 kali sehari.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

- Jangkamasa maksimum penggunaan ubat ini secara berterusan tanpa nasihat doctor atau ahli farmasi: 3 hari
- Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.
- Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Jika anda terlupa menggunakannya

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa memberi anak anda ubat ini.

Beri anak anda dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan kerosakan hati yang teruk dan juga menyebabkan kerosakan buah pinggang. Rawatan yang cepat diperlukan dengan menggunakan acetylcysteine atau methionine.

Semasa menggunakan Palavo Suspension

Perkara yang perlu dilakukan

- Ubat ini adalah untuk kegunaan oral (diminum) sahaja.
- Goncang dulu sebelum minum.

Beri ubat ini kepada anak anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anak anda bahawa anak anda sedang menggunakan Palavo Suspension.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anak anda (umur kurang dari 3 tahun) mengalami demam yang berterusan melebihi 24 jam (dengan pemberian 4 dos maximum sehari). Ini untuk memastikan demam yang mungkin disebabkan infeksi yang serius dapat didiagnos dalam masa tersingkat.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan melebihi dos yang dibenarkan.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Palavo Suspension dengan sesiapa, walaupun anak mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Sila berunding dengan doktor anda atau ahli farmasi, terutamanya kepada kanak-kanak yang terdapat alahan dengan ubat ini.

AMARAN

Produk ini mengandungi PARACETAMOL. Dilarang mengambil ubatan lain mengandungi paracetamol pada masa yang sama.

Mungkin mengakibatkan toksik pada hati dan kerosakan teruk. Jangan ambil melebihi dos yang disyorkan.

Amaran alahan: Paracetamol mungkin boleh menyebabkan masalah kulit yang

teruk. Simptom termasuk kulit kemerahan, lepuh atau ruam.

Hal ini mungkin petanda kondisi yang serius. Jika hal ini berlaku, berhenti menggunakan ubat ini dan cari bantuan medikal secepat mungkin.

Kesan-kesan sampingan

- Kesan sampingan ubat adalah jarang berlaku dan selalunya kesan yang ringan sahaja termasuk reaksi sel-sel darah dalam badan seperti thrombocytopenia (kekurangan platelet dalam darah) dan leucopenia (kekurangan sel darah putih)
- Ruam kulit, tindak balas hipersensitiviti jarang berlaku.
- Cutaneous hypersensitivity reactions (penyakit kulit sensitif) termasuk ruam kulit, angioedema (lapisan kulit yang bengkak), Stevens Johnson Syndrome/ Toxic Epidermal Necrolysis telah dilaporkan.

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anak anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Jika anak anda mengalami tanda-tanda berterusan melebihi 7 hari, sila berjumpa dengan doktor, doktor gigi atau ahli farmasi.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Orang Awam → Lapor Kesan Sampingan Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Palavo Suspension

Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Tarikh luput produk ini ditunjukkan pada bungkusan.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan

lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Setiap botol mengandungi suspension berwarna oren dengan perasa oren.

Terdapat dalam pek 60ml.

Bahan- bahan kandungan

Bahan aktif

Paracetamol

Bahan tidak aktif

Syrup, Hydroxypropyl Methylcellulose, Xanthan Gum, Glycerin, Saccharin Sodium, Citric Acid Anhydrous, Sodium Citrate, Colourant, Orange Flavour, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Propylene Glycol dan Purified Water.

Nombor MAL

MAL

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

25/11/2021

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/113