

BENCOVEE CREAM

Clotrimazole 1% w/w, Betamethasone 0.05% w/w (as Bethamethasone Dipropionate)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Bencovee Cream
2. Bagaimana Bencovee Cream berfungsi
3. Sebelum menggunakan Bencovee Cream
4. Cara menggunakan Bencovee Cream
5. Semasa menggunakan Bencovee Cream
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Bencovee Cream
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Bencovee Cream

Bencovee Cream digunakan untuk merawat jangkitan kulat pada kulit bagi pelbagai jenis kurap seperti kaki atlet, gatal jock, panu, dan keredangan kuku serta celah kulit.

Bagaimana Bencovee Cream berfungsi

Bencovee Cream mengandungi clotrimazole, sejenis antikulat kelas imidazole. Ia melawan kulat dengan menggaungu membran sel kulat. Clotrimazole mengentikan sintesis ergosterol, satu komponen penting untuk sel kulat.

Bencovee Cream juga mengandungi betamethasone, sejenis steroid berfungsi anti radang dan menghentikan gatal.

Sebelum menggunakan Bencovee Cream

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Bencovee Cream jika anda:

- terdapat alah terhadap bahan yang terkandung di dalam ubat ini
- mengalami iritasi, kepanasan, kemerahan serta kegatalan pada kulit.
- Mengalami facial rosacea (kemerahan dan bintik pada muka), acne vulgaris (jerawat), dermatitis perioral (peradangan di sekitar mulut), napkin eruptions (peradangan disebabkan lampin) dan jangkitan kulit atau virus

Sebelum menggunakan Bencovee Cream

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika:

- Anda hamil atau merancang untuk hamil
- Anda sedang menyusukan anak.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang

dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Bencovee Cream

Berapa banyak harus digunakan

Krim ini adalah untuk penggunaan luaran sahaja.

Sapu krim pada kawasan kulit yang terjangkit 2 kali sehari, pada waktu pagi dan petang selama 2 minggu jika mengalami tinea cruris, tinea corporis dan candidiasis, selama 4 minggu jika mengalami tinea pedis.

Penggunaan krim lebih daripada 4 minggu adalah tidak digalakkan.

Tempoh rawatan

Tinea cruris, tinea corporis dan candidiasis

- Sapukan dua kali sehari selama dua minggu.
- Jika tidak terdapat sebarang penambahbaikan selepas satu minggu, diagnosis seharusnya disemak kembali.
- Jika keadaan masih sama selama dua minggu, rawatan perlu diberhentikan.

Tinea pedis

- Sapukan dua kali sehari selama empat minggu.
- Jika tidak terdapat sebarang penambahbaikan selepas dua minggu, diagnosis seharusnya disemak kembali.
- Jika keadaan masih sama selama empat minggu, rawatan perlu diberhentikan.

Penambahbaikan kondisi klinikal di mana terdapat kelegaan untuk kulit kemerahan dan kulit gatal selalunya berlaku dalam masa tiga hingga lima hari rawatan.

Kegunaan Bencovee Cream lebih daripada 4 minggu tidak digalakkan.

Bila perlu digunakan

Dua kali sehari setelah bersihkan dan keringkan bahagian jangkitan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

- Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.
- Jangan gunakan Bencovee Cream lebih daripada 4 minggu untuk kaki atlet.
- Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Jika anda terlupa menggunakannya

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Menggunakan krim ini sebaik sahaja anda teringat. Kemudian, teruskan rawatan seperti biasa.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan berlebihan krim steroid untuk jangka masa panjang mungkin akan mengakibatkan sindrom Cushing, iaitu pembentukan lemak pada muka yang menyebabkan muka yang bulat, otot lemah, mudah lebam, jerawat, regangan kulit, berat badan bertambah.

Hentikan penggunaan Bencovee Cream dengan perlahan.

Semasa menggunakan Bencovee Cream

Perkara yang perlu dilakukan

- Basuh tangan sebelum dan selepas menggunakan krim ini.
- Bersihkan dan keringkan bahagian kejangkitan sebelum menyapukan krim.

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Bencovee Cream.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Bencovee Cream adalah untuk kegunaan luaran sahaja. Krim ini tidak boleh dimakan.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi Bencovee Cream dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Sila berunding dengan doktor anda atau ahli farmasi, terutamanya kepada mereka yang terdapat alahan dengan ubat ini.

AMARAN

Semasa menggunakan krim ini untuk jangkitan kurat:

- Elakkan dari terkena mata dan mulut
- Elakkan kegunaan krim ini dengan pembalut luka occlusive
- Elakkan kegunaan krim ini pada luka terbuka
- Elakkan penggunaan dalam jangka panjang; pada muka; dan juga dalam kalangan kanak-kanak.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini. Kesan-kesan sampingan yang boleh disebabkan oleh Clotrimazole termasuk kerengsaan, kepanasan, kemerahan serta kegatalan.

Kesan-kesan sampingan yang boleh disebabkan oleh Clobetasol termasuk peneipisan kulit, tanda regangan kulit serta jerawat.

Kegunaan Clobetasol dalam jangka masa panjang, dalam kuantiti yang banyak, atas luka terbuka serta dalam pembalut luka occlusive boleh menyebabkan sindrom Cushing.

Kegunaan dalam kalangan kanak-kanak dalam tempoh yang lama boleh mengganggu kadar pertumbuhan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Bencovee Cream**Penyimpanan**

Simpan di bawah 25°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Tarikh luput produk ini ditunjukkan pada bungkusan.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan

lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut**Rupa dan warna produk**

Krim berwarna putih dan homogen

Bahan- bahan kandungan**Bahan aktif**

Clotrimazole

Betamethasone Dipropionate

Bahan tidak aktif

Cetostearyl Alcohol, Liquid Paraffin, Macrogol Cetostearyl Ether, Propylene Glycol, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate, Citric Acid Anhydrous, Sodium Citrate, Purified Water.

Nombor MAL

MAL

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

02/12/2021

Nombor Siri

NPRA (R2) 21/105