

EZEDE` ORAL SOLUTION

Loratadine (1mg/ml). Sodium Benzoate 0.1%w/v sebagai pengawet.

Apakah yang ada pada risalah ini?

1. Apakah kegunaan Ezedek` Oral Solution
2. Bagaimana Ezedek` Oral Solution berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ezedek` Oral Solution
4. Cara menggunakan Ezedek` Oral Solution
5. Semasa menggunakan Ezedek` Oral Solution
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ezedek` Oral Solution
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Ezedek` Oral Solution

Melegakan keadaan alahan seperti:

- alahan hidung (bersin, gatal, berair, hidung tersumbat dan mata berair).
- alahan kulit (bengkak, merah, bersisik, kulit mengelupas dan gatal).

Bagaimana Ezedek` Oral Solution berfungsi

Loratadine adalah antihistamin yang menghalang pembebasan histamin. Histamin ialah bahan kimia yang dibebaskan dalam badan akibat tindak balas badan terhadap alahan.

Sebelum menggunakan Ezedek` Oral Solution

Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan gunakan Ezedek` Oral Solution jika anda alah (hipersensitif) terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- Jangan gunakan untuk kanak-kanak di bawah umur 2 tahun. Keselamatan dan keberkesanan Loratadine belum ditubuhkan pada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

Sebelum mula menggunakan

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Ezedek` Oral Solution jika anda:

- hamil atau merancang untuk hamil.
- sedang menyusukan anak atau merancang untuk menyusu.
- mempunyai masalah hati atau buah pinggang.
- mempunyai masalah penghadaman gula.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain, termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Ezedek` Oral Solution

Berapa banyak harus digunakan

- Dewasa dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas: 10ml (2 sudu teh) satu kali sehari.
- Kanak-kanak 6 hingga 12 tahun
Berat badan >30kg: 10ml (2 sudu teh) satu kali sehari.
Berat badan <30kg: 5ml (1 sudu teh) satu kali sehari.
- Kanak-kanak 2 hingga 6 tahun
Berat badan >30kg: 10ml (2 sudu teh) satu kali sehari.
Berat badan <30kg: 5ml (1 sudu teh) satu kali sehari.

Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Berapa lama perlu digunakan

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat ini untuk tempoh masa yang lebih panjang.

Jika terlupa menggunakannya

Ambil secepat mungkin sebaik sahaja anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Terlebih dos boleh mengakibatkan mengantuk, denyutan jantung yang pantas dan sakit kepala.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda terambil secara berlebihan atau bimbang dengan keadaan yang dialami.

Semasa menggunakan Ezedek` Oral Solution

Perkara yang perlu dilakukan

- Amalkan pengambilan ubat pada waktu yang sama setiap hari.
- Ambil ubat bersama air.
- Anda boleh mengambil ubat ini dengan atau tanpa makanan.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.
- Jangan ambil ubat ini untuk sekurang-kurangnya 48 jam jikalau anda merancang untuk menjalani pemeriksaan pada kulit.
- Elak minuman alkohol.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Hati-hati ketika memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana kesan Ezedek` terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

- Mengantuk
- Sakit kepala
- Selera makan bertambah
- Sukar untuk tidur.

Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alahan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Ezedek` Oral Solution

Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Cecair berwarna merah jambu dan perisa vanila anggur.

Didapati dalam kotak bungkusan 60ml, 90ml dan 120ml.

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif

Loratadine

Bahan tidak aktif

Sorbitol Solution 70%, Glycerin, Propylene Glycol, Citric Acid Anhydrous, Disodium Edetate, Sodium Benzoate, Saccharin Sodium, Colour Powder Ponceau 4R, Vanilla and Blackcurrant Flavour, Purified Water.

Nombor MAL

MAL

**Pengilang dan Pemegang Pendaftaran
Produk**

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

14/04/2022

Nombor siri

NPRA (R2) 21/173