

MIOLIV FILM-COATED TABLET

Domperidone (10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mioliv
2. Bagaimana Mioliv berfungsi
3. Sebelum menggunakan Mioliv
4. Cara menggunakan Mioliv
5. Semasa menggunakan Mioliv
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Mioliv
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Mioliv

Mioliv digunakan untuk simptom loya dan muntah.

Bagaimana Mioliv berfungsi

Mioliv adalah ubat antiemetik. Ia berfungsi dengan menghalang penghantaran bahan kimia dalam otak yang menyebabkan rasa loya dan muntah, serta meningkatkan pergerakan atau pengecutan perut dan usus, yang membolehkan makanan bergerak dengan lebih mudah melalui perut.

Sebelum mengambil Mioliv

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika anda:

- mengambil mana-mana ubat berikut: clarithromycin (antibiotik).
- anda alah kepada Mioliv atau sebarang bahan yang disenaraikan di hujung risalah ini.
- anda mempunyai tumor di kelenjar pituitari yang dikenali prolaktinoma, perut dan usus berdarah, tersumbat atau berlubang.
- Digunakan untuk mencegah muntah selepas pembedahan atau untuk penggunaan jangka panjang.

Sebelum mula mengambil

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi sekiranya:

- anda hamil atau bercadang untuk hamil. Ubat ini boleh digunakan semasa hamil hanya jika diperlukan.
- anda mempunyai atau pernah mengalami penyakit hati

Jika mengambil ubat-ubat lain

Sesetengah ubat dan Mioliv boleh bertindak balas antara satu sama lain. Ini termasuk:

- Ubat antikolinergik, yang digunakan untuk merawat kekejangan perut
- Antacids, ubat-ubatan untuk merawat pedih ulu hati
- *Antisecretory medicines*
- Clarithromycin (antibiotik)

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

Cara menggunakan Mioliv

Berapa banyak harus digunakan

Mengambil jumlah Mioliv yang paling rendah yang sesuai untuk anda dan anda tidak boleh mengambilnya lebih lama daripada yang diperlukan. Walaupun jumlah Mioliv yang biasanya anda perlu ambil diterangkan di bawah, doktor anda mungkin melaraskan dos anda mengikut keperluan peribadi anda.

Mioliv paling berkesan jika diambil 15-30 minit sebelum makan.

Dewasa dan remaja (berumur 12 tahun ke atas) dengan berat 35kg atau lebih; kanak-kanak dengan berat 35kg atau lebih:

Ambil 1 biji 3 hingga 4 kali sehari. Jangan ambil lebih daripada 4 biji sehari (40mg/hari).

Bayi dan kanak-kanak berumur kurang daripada 12 tahun dan berat kurang daripada 35kg:

Keberkesanan Mioliv belum diketahui pada bayi dan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dengan berat badan <35kg.

Bila perlu digunakan

Mioliv paling berkesan jika diambil 15 hingga 30 minit sebelum makan.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Jika sudah dekat waktu dos seterusnya, tinggalkan dos yang terlupa dan ambil dos seterusnya mengikut jadual biasa.

Jika tidak, ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat dan kemudian kembali mengambil ubat anda seperti biasa.

Jangan gantikan dos untuk menggantikan dos yang tertinggal. Ini mungkin meningkatkan peluang anda mendapat kesan sampingan yang tidak diingini.

Jika anda sukar mengingat masa untuk mengambil ubat anda, minta petua daripada ahli farmasi anda.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika anda fikir anda atau orang lain mungkin terlebih mengambil Mioliv, hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat atau pergi ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat dengan segera. Ini mesti dilakukan walaupun tiada sebarang tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Sesetengah simptom terlebih dos termasuk:

- rasa cemas
- pergerakan yang tidak terkawal

Semasa menggunakan Mioliv

Perkara yang harus dilakukan

- Beritahu doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang sedang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Mioliv.
- Jika anda akan mula mengambil sebarang ubat baru, beritahu doktor dan ahli farmasi anda bahawa anda sedang mengambil Mioliv.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan memberi Mioliv kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai keadaan yang sama seperti anda.
- Jangan menggunakan Mioliv merawat sebarang masalah lain, melainkan diarah oleh doktor anda
- Jangan menggunakan Mioliv bila anda sedang menyusu anak atau bercadang untuk menyusu anak kecuali manfaat melebihi potensi risiko yang dijangka

MIOLIV FILM-COATED TABLET

Domperidone (10mg)

Perkara yang perlu diberi perhatian

- Berhati-hati semasa memandu dan mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana Mioliv mempengaruhi anda.

Kesan-kesan sampingan

Semua ubat boleh membawa kesan sampingan. Kadang kala kesan sampingan ini serius, tetapi selalunya tidak. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan jika anda mendapat sesetengah kesan sampingan.

Sila dapat nasihat daripada doktor dan ahli farmasi untuk maklumat lanjut.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nptra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

Tablet bulat bersalut lapis, berwarna merah jambu dengan ukiran "XS" pada satu belah dan tanpa garis pada sebelah yang lain.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Domperidone

- Bahan tidak aktif

Lactose, Microcrystalline Cellulose, Starch, Sodium Lauryl Sulphate, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon

Dioxide, HPMC Compound Mix, Colour Pigment Red.

MAL number

MALxxxxxxxAZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

11/07/2024

Nombor siri

NPRA (R2) 23/185