

EPIROZIN OINTMENT 2% W/W

Mupirocin 2% w/w

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan EPIROZIN
2. Bagaimana EPIROZIN berfungsi
3. Sebelum menggunakan EPIROZIN
4. Cara menggunakan EPIROZIN
5. Semasa menggunakan EPIROZIN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan EPIROZIN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan EPIROZIN

EPIROZIN adalah salap antibakteria topikal yang digunakan untuk mencegah atau merawat jangkitan kulit bakteria seperti jangkitan kulit yang menular dengan melepuh dan berkulit yang dikenali sebagai “*impetigo*”, jangkitan folikel rambut yang membentuk jerawat yang mengandungi nanah yang dikenali sebagai “*folliculitis*” dan bisul berulang yang dikenali sebagai “*furunculosis*.”

Bagaimana EPIROZIN berfungsi

EPIROZIN adalah antibiotik yang dihasilkan melalui penapaian oleh *Pseudomonas fluorescens*. Apabila diserap ke dalam kulit, ia menghalang pembentukan protein bakteria dan menghapuskan bakteria apabila digunakan pada bahagian kulit yang dijangkiti

Sebelum menggunakan EPIROZIN

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan gunakan EPIROZIN jika anda alah (hipersensitif) kepada mupirosin atau mana-mana bahan kandungan lain EPIROZIN.

Jika anda rasa anda mungkin alah ataupun mengalami tanda-tanda alahan, jangan gunakan EPIROZIN sehingga anda merujuk kepada doktor anda.

- *Sebelum menggunakannya*

EPIROZIN boleh menyebabkan kerengsaan kulit dan tindak balas alergi.

Salap EPIROZIN tidak sesuai untuk:

- jangkitan mata
- digunakan di dalam hidung
- kulit berhampiran tiub yang dimasukkan ke dalam badan anda untuk penyaluran atau penyingkiran cecair badan (kanula).

Jauhkan salap ini daripada mata. Jika salap terkena mata anda secara tidak sengaja, basuh mata anda dengan air bersih yang banyak.

Salap EPIROZIN mengandungi polyethylene glycol, dimana dalam kuantiti besar boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Beritahu doktor anda jika anda mempunyai masalah buah pinggang. Elakkan penggunaan EPIROZIN pada kawasan-kawasan kulit pecah atau rosak, terutamanya jika anda mempunyai masalah dengan buah pinggang anda.

Mengandung dan menyusukan anak

Maklumat keselamatan penggunaan EPIROZIN untuk wanita hamil adalah terhad. Jika anda hamil, atau anda rasa mungkin hamil atau jika anda merancang untuk hamil, jangan gunakan salap EPIROZIN tanpa merujuk kepada doktor anda.

Resapan ubat ini ke dalam susu ibu masih tidak diketahui. Beritahu doktor jika anda sedang menyusukan bayi anda.

Jika anda menggunakan EPIROZIN pada puting merekah, basuh dengan teliti sebelum penyusuan susu ibu.

- *Jika mengambil ubat-ubat lain*

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, jika anda telah mengambil mana-mana ubat baru-baru ini, atau mula mengambil sebarang ubat yang baru. Ini termasuk ubat anda membeli tanpa preskripsi.

Cara menggunakan EPIROZIN

- *Berapa banyak harus digunakan*
Gunakan EPIROZIN seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi jika anda tidak pasti.

Bagaimana untuk menggunakan EPIROZIN

- Basuh tangan anda sebelum dan selepas menggunakan EPIROZIN.
- Sapukan sedikit salap EPIROZIN pada kawasan terlibat dengan sekeping kapas bersih atau pembalut kasa.
- Selepas menggunakan salap, anda boleh menutup kawasan yang dirawat dengan pembalut steril atau pembalut kasa, melainkan doktor memberitahu anda untuk membiarkannya terdedah.
- Jangan campurkan EPIROZIN dengan losen, krim atau salap lain. Ini boleh mencairkan EPIROZIN dan menjejaskan rawatan anda.

- *Bila perlu digunakan*

Anda harus menyapu EPIROZIN dua atau tiga kali sehari sehingga sepuluh hari, bergantung pada tindak balas.

- *Berapa lama perlu digunakan*

Penggunaan EPIROZIN untuk tempoh yang disarankan adalah penting. Jangan berhenti awal kerana simptom-simptom anda mungkin lega sebelum jangkitan itu dibasmi sepenuhnya.

EPIROZIN OINTMENT 2% W/W

Mupirocin 2% w/w

- Jika anda terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk menggunakan krim anda, sapukan ubat ini sebaik sahaja anda teringat dan sapu dos berikutnya pada waktu biasa.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebi dos)

Bersihkan salap yang berlebihan dengan berhati-hati. Masalah dos berlebihan dengan ubat ini sangat jarang berlaku.

Jika anda tertelan EPIROZIN, hubungi doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat.

Semasa menggunakan EPIROZIN**- Perkara yang perlu dilakukan**

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan EPIROZIN.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jangan memberi EPIROZIN kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jangan guna EPIROZIN pada mata.

Hentikan penggunaan EPIROZIN dan beritahu doktor jika anda mengalami tindak balas alahan (seperti ruam, kesakitan atau bengkak) semasa menggunakan EPIROZIN.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat yang lain, EPIROZIN boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak berlaku pada setiap orang.

Sila beritahu doktor/ahli farmasi/jururawat dengan segera dan berhenti menggunakan EPIROZIN jika salah satu keadaan berikut berlaku.

Kesan sampingan berikut telah diperhatikan semasa rawatan dengan EPIROZIN:

- Ruam kulit yang gatal
- Bengkak, kadang-kadang pada muka atau mulut, menyebabkan kesukaran bernafas
- Pengsan atau kehilangan kesedaran
- Kerengsaan
- Keradangan kulit
- Sensasi membakar

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* or *Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan EPIROZIN**- Penyimpanan**

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan pada suhu di bawah 30°C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan

atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk

melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut**- Rupa dan warna produk**

Salap warna lutsinar, licin dan sekata.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

- *Mupirocin Calcium*

- Bahan tidak aktif

- *Polyethylene Glycol 4000*
- *Polyethylene Glycol 400*

- Nombor MAL

MAL*****

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn. Bhd.
1-5, Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia. Pengilang

Tarikh kemaskini

28/10/2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 25/125