

Adroten Film-Coated Tablet 5mg

Each tablet contains Bisoprolol Fumarate 5mg

In this leaflet:

- *What is Adroten Film-Coated Tablet used for*
- *How Adroten Film-Coated Tablet works*
- *Before you take Adroten Film-Coated Tablet*
- *How to take Adroten Film-Coated Tablet*
- *While you are taking Adroten Film-Coated Tablet*
- *Possible side effects*
- *Storage and Disposal of Adroten Film-Coated Tablet*
- *Product description*

What is Adroten Film-Coated Tablet used for

It is used to treat high blood pressure (hypertension), chest pain (angina pectoris), as well as stable chronic heart failure.

How Adroten Film-Coated Tablet works

This product contains bisoprolol fumarate which belongs to a group of medicines called beta-blockers that slows the heart rate and activity, helping to lower blood pressure and reduce strain on the heart.

Before you use Adroten Film-Coated Tablet

When must not to use it

Do not use this medicine if you:

- are allergic (hypersensitivity) to the bisoprolol fumarate or any other ingredients in this medicine.
- taking intravenous therapy to increase heart contraction.
- have shock caused by heart problems
- have second or third degree heart block.
- have sick sinus syndrome.
- have sinoatrial block.
- have slow heart rate.
- have low blood pressure.
- have severe asthma or lung disease.
- have untreated tumor near the kidney
- suffer from an increased acidity of the blood (metabolic acidosis).

Before start to use it

Tell your doctor or pharmacist if you:

- have asthma or lungs problems, kidneys problem, or get allergic reactions.
- have diabetes, where symptoms of low blood glucose can be masked.
- Have hyperthyroid, where symptoms can be masked.
- undergo general anesthesia.
- have personal or family history of psoriasis (skin disease).
- are pregnant or breast-feeding.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or having recently taken any other medicines. This includes any medicines which you have bought without a prescription.

How to use Adroten Film-Coated Tablet

How much to use

For high blood pressure and chest pain, 5 to 10mg (1 to 2 tablets) taken orally as a single daily dose. The maximum recommended dose is 20mg (4 tablets) daily.

Your doctor or pharmacist will prescribe other doses based on individual conditions.

When to use it

Taken in the morning, with or without food.

How long to use it

Follow the prescription from your doctor or pharmacist.

Do not stop treatment suddenly or change the dose without consulting your doctor first.

If you forget to use it

Take it as soon as you remember, unless it is nearly time for your next dose, skip the missed dose. Then go on as before. Never double up on the next dose to make up for the one missed.

If you use too much

Signs that may occur are a slow heart rate, low blood pressure, asthma, acute heart failure and low blood glucose. See your doctor or visit the nearest emergency department immediately for medical attention.

While you are using Adroten Film-Coated Tablet

Things you must do

Always wash your hands before handling the tablets. Swallow the tablets with water and try to take at the same time each day.

Things you must not do

Do not chew the tablets.
Do not take this medicine by yourself without prescription from your doctor or pharmacist.

Things to be careful of

Tell your doctor or pharmacist if you:

- are allergic to any of the ingredients contained in this medicine.
- are pregnant or breast-feeding.
- have problems with your heart, kidneys, blood circulation and thyroid gland.
- have diabetes.
- have asthma or lung disease.

Possible side effects

- Heart disorder such as slow heart rate.
- Low blood pressure.
- Nausea, vomiting, diarrhea, constipation, dizziness and headache.

Seek immediate medical attention if you experience any side effects or allergic reactions.

Storage and Disposal of Adroten Film-Coated Tablet

Store at room temperature below 30 °C.

Keep out of the reach of children.

Do not use this medicine after expiry date.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.

Product Description

How Adroten Film-Coated Tablet looks like

Yellowish white, round, normal convex film-coated tablet with “XS” marking on one side and plain on reverse in blister strips of 10's in packing of 100 tablets per box.

What Adroten Film-Coated Tablet contains

It contains the active ingredient bisoprolol fumarate 5mg.

The other ingredients are Dibasic Calcium Phosphate (Dihydrate), Microcrystalline Cellulose, Crospovidone, Hydroxypropyl Cellulose, Colloidal Silicone Dioxide, Magnesium Stearate, Ethylene Glycol and Vinyl Alcohol Graft Copolymer, Yellow Iron Oxide, Purified Water.

Manufacturer and Marketed by

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka,
Malaysia.

Adroten Film-Coated Tablet 5mg

Setiap tablet mengandungi Bisoprolol Fumarate 5mg

Apakah yang ada pada risalah ini:

- *Apakah kegunaan Adroten Film-Coated Tablet*
- *Bagaimana Adroten Film-Coated Tablet berfungsi*
- *Sebelum mengambil Adroten Film-Coated Tablet*
- *Cara mengambil Adroten Film-Coated Tablet*
- *Semasa mengambil Adroten Film-Coated Tablet*
- *Kesan-kesan sampingan*
- *Cara penyimpanan dan pelupusan Adroten Film-Coated Tablet*
- *Deskripsi produk*

Apakah kegunaan Adroten Film-Coated Tablet

Adroten Film-Coated Tablet digunakan untuk rawatan tekanan darah tinggi (hypertensi), sakit dada (angina pectoris), serta kegagalan jantung yang stabil dan kronik.

Bagaimana Adroten Film-Coated Tablet berfungsi

Produk ini mengandungi bisoprolol fumarate yang tergolong dalam kategori ubat 'beta-blockers', yang memperlahankan kadar denyutan dan aktiviti jantung, seterusnya mengurangkan tekanan darah dan tekanan pada jantung.

Sebelum mengambil Adroten Film-Coated Tablet

Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika anda:

- Alergi (hypersensitiviti) terhadap bisoprolol fumarate atau bahan-bahan lain yang terkandung dalam ubat ini.
- Menjalani terapi intravena yang meningkatkan pengecutan jantung.
- Mengalami kejutan akibat masalah jantung.
- Mengalami jantung tersumbat tahap kedua dan ketiga.
- Mempunyai sindrom 'sick sinus'.
- Mempunyai sinoatrium tersumbat.
- Mempunyai denyutan jantung yang perlahan.
- Mempunyai tekanan darah rendah.
- Mempunyai lelah dan penyakit peparu yang serius.
- Mempunyai tumbuhan barah berdekatan ginjal yang tidak dirawat.
- Mempunyai darah yang berkepekatan asid tinggi (metabolic acidosis).

Sebelum mula mengambil

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- Mengalami lelah atau masalah peparu, masalah ginjal atau alergi.
- Mempunyai penyakit kencing manis, di mana glukosa darah rendah mungkin terselindung.

- Mempunyai tiroid hiperaktif, di mana simptom-simptom yang ada tidak dapat dikesan.
- Menjalani pembiusan am.
- Hamil atau menyusui.

Jika mengambil ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau kebelakangan ini telah mengambil ubat lain. Ini termasuk sebarang ubat tanpa preskripsi.

Cara mengambil Adroten Film-Coated Tablet

Berapa banyak harus digunakan

Bagi tekanan darah tinggi dan sakit dada, ambil dos 5 hingga 10mg (1 hingga 2 tablet) sekali sehari. Dos maksima yang disarankan ialah 20mg (4 tablet) sehari.

Doktor atau ahli farmasi anda akan mempreskripsikan dos yang lain berdasarkan keadaan individu.

Bila perlu diambil

Ambil pada waktu pagi, sebelum atau selepas sarapan pagi.

Berapa lama perlu diambil

Berdasarkan preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Jangan hentikan pengambilan ubat ini tiba-tiba atau mengubah dos tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jika anda terlupa mengambil

Ambil secepat mungkin apabila anda teringat. Jika dos seterusnya adalah hampir, ambil dos yang seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

Jika mengambil berlebihan

Tanda-tanda yang mungkin terjadi adalah seperti denyutan jantung yang perlahan, tekanan darah rendah, lelah, kegagalan jantung akut dan glukosa darah yang rendah. Jumpa doktor anda atau pergi ke jabatan kecemasan terdekat dengan segera untuk rawatan perubatan.

Semasa mengambil Adroten Film-Coated Tablet

Perkara yang harus dilakukan

Sentiasa cuci tangan sebelum mengambil ubat. Telan ubat ini bersama air dan cuba mengambilnya pada waktu yang sama setiap hari.

Perkara yang tidak harus dilakukan

Jangan kunyah tablet.
Jangan ambil ubat ini tanpa preskripsi doktor atau ahli farmasi.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda:

- Alergi terhadap sebarang bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- Hamil atau menyusui.
- Mempunyai masalah jantung, ginjal, peredaran darah dan kelenjar tiroid.
- Mempunyai penyakit kencing manis.
- Lelah atau mempunyai penyakit peparu.

Kesan-kesan sampingan

- Gangguan jantung seperti denyutan jantung yang perlahan.
- Tekanan darah yang rendah.
- Loya, muntah, cirit-birit, sembelit, pening dan sakit kepala.

Dapatkan rawatan perubatan secepat mungkin jika anda mengalami sebarang kesan sampingan atau masalah alergi.

Cara Penyimpanan dan pelupusan Adroten Film-Coated Tablet

Simpan pada suhu bilik di bawah 30 °C.

Jauhi dari kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput.

Ubat-ubatan tidak seharusnya dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk membuang ubat-ubatan yang tidak dikehendaki.

Deskripsi produk

Rupa dan warna produk

Tablet bersalut lapis, berbentuk bulat cembung serta berwarna kuning putih, berukir "XS" pada satu belah dan tanpa ukiran pada sebelah yang lain. Terdapat dalam pek lepuh 10's di dalam kotak bungkusan 100 tablet.

Bahan-bahan kandungan

Adroten Film-Coated Tablets mengandungi bahan aktif bisoprolol fumarate 5mg.

Bahan-bahan kandungan lain ialah Dibasic Calcium Phosphate (Dihydrate), Microcrystalline Cellulose, Crospovidone, Hydroxypropyl Cellulose, Colloidal Silicone Dioxide, Magnesium Stearate, Ethylene Glycol dan Vinyl Alcohol Graft Copolymer, Yellow Iron Oxide, Purified Water.

Dikilang dan dipasarkan oleh

Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn Bhd
1-5 Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

MAL12065085A

12.12