

BIO-LIFE GLUCOSAMINE 500MG TABLET

Glucosamine sulfate (500 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Bio-Life Glucosamine 500mg
2. Bagaimana Bio-Life Glucosamine 500mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan Bio-Life Glucosamine 500mg
4. Cara menggunakan Bio-Life Glucosamine 500mg
5. Semasa menggunakan Bio-Life Glucosamine 500mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Bio-Life Glucosamine 500mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini

Apakah kegunaan Bio-Life Glucosamine 500mg

Bio-Life Glucosamine 500mg digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit sendi (osteartritis).

Bagaimana Bio-Life Glucosamine 500mg berfungsi

Bio-Life Glucosamine 500mg memberi kelegaan kepada penyakit sendi dengan mengurangkan bengkak sendi dan melegakan kesakitan.

Sebelum menggunakan Bio-Life Glucosamine 500mg

- Bila tidak boleh menggunakan

- Jangan ambil ubat ini jika anda alah kepada glucosamine, dan / atau alah kepada kerang atau eksprien lain.
- Jangan ambil ubat ini selepas tarikh luput yang tercetak pada pek atau bungkusan telah koyak.
- Jika anda tidak pasti sama ada anda patut mula mengambil ubat ini, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum mula menggunakan

- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda ada alahan terhadap apa-apa ubat lain, makanan, pengawet atau pewarna.

- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda hamil, bercadang untuk hamil atau anda sedang menyusukan bayi.
- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil ubat Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug (NSAIDs).

- Jika mengambil ubat-ubat lain

- Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda dapat tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai suplemen kesihatan.
- Individu yang menghidap diabetes harus mengambil glucosamine di bawah pengawasan doktor atau ahli farmasi.

Cara menggunakan Bio-Life Glucosamine 500mg

Ikut semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti.

- Berapa banyak harus digunakan

Simptom ringan hingga sederhana: Ambil 1 tablet dua kali sehari, 15 minit sebelum makan selama sekurang-kurangnya enam minggu (atau mengikuti preskripsi perubatan).

Gejala osteoartritis yang teruk:

Terapi awal: Ambil 1 tablet tiga kali sehari, 15 minit sebelum makan selama sekurang-kurangnya lapan minggu.

Terapi susulan:

Terapi jangka panjang harus diikuti selama 3-4 bulan (atau mengikuti preskripsi perubatan) dengan pengambilan 1 tablet dua kali sehari, 15 minit sebelum makan. Rawatan perlu diulang setiap 6 bulan atau kurang mengikuti preskripsi perubatan.

- Bila perlu digunakan

Ambil ubat mengikut arahan doktor atau ahli farmasi dan harus mengambil ubat ini dengan makanan.

- Berapa lama perlu digunakan

Jumpa doktor atau ahli farmasi jika gejala tidak bertambah baik atau gejala baru muncul.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Dapatkan nasihat perubatan jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah mengambil Bio-Life Glucosamine 500mg secara berlebihan.

Semasa menggunakan Bio-Life Glucosamine 500mg

- Perkara yang perlu dilakukan

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika simptom anda tidak bertambah baik.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan ambil Bio-Life Glucosamine 500mg untuk merawat sebarang masalah lain kecuali jika diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan beri ubat anda kepada orang lain walaupun mereka mengalami masalah yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu kesan Bio-Life Glucosamine 500mg terhadap anda.

Kesan-kesan sampingan

- Bio-Life Glucosamine 500mg secara umumnya diterima dengan baik oleh orang ramai, bagaimanapun, kesan sampingan yang berikut jika berlaku, biasanya bersifat ringan dan sementara: mengantuk, sakit kepala, tidak dapat tidur, loya, muntah, cirit-birit, gangguan pencernaan, sembelit, pedih uluhati, kulit kemerahan, gatal-gatal, bengkak pada bahagian bawah anggota badan dan peningkatan kadar degupan jantung.

BIO-LIFE GLUCOSAMINE 500MG TABLET

Glucosamine sulfate (500 mg)

- Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Bio-Life Glucosamine 500mg

- Penyimpanan

- Simpan ubat anda di dalam bekas asal sehingga masa untuk diambil.
- Simpan ubat anda di tempat yang sejuk dan kering di mana suhu berada di bawah 30°C.
- Jangan simpan ubat di bilik mandi atau berhampiran sinki. Jangan biarkan ubat di tingkap atau dalam kereta. Haba dan kelembapan boleh merosakkan ubat.
- Simpan di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

- Pelupusan

Tanya ahli farmasi anda apa yang perlu dilakukan dengan baki ubat, atau jika ubat telah luput tarikh.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berbentuk bujur dan berwarna putih.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Glucosamine sulfate 2KCl 699.00mg
equivalent to:
Glucosamine sulfate 500 mg

- Bahan-bahan tidak aktif:

Calcium hydrogen phosphate,
microcrystalline cellulose, sodium
starch glycolate, Opadry II (85) White,
magnesium stearate, Aerosil 200.

- Nombor MAL:

MAL08080865XC

Pengilang

Unison Nutraceuticals Sdn. Bhd.
No. 13, Jalan TTU 52, Taman Tasik
Utama, 75450 Ayer Keroh, Melaka,
Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Bio-Life Marketing Sdn. Bhd.
B-28-02, The Ascent, Paradigm. No.1,
Jalan SS7/26A, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

Tarikh kemaskini

25/10/2021

Nombor Siri

NPRA(R4/1)240820/00127