

FEPRIL SYRUP 120MG/5ML

Paracetamol (120mg /5mL)

Apakah yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Fepril Syrup 120mg/5ml
2. Bagaimana Fepril Syrup 120mg/5ml berfungsi
3. Sebelum menggunakan Fepril Syrup 120mg/5ml
4. Cara menggunakan Fepril Syrup 120mg/5ml
5. Semasa menggunakan Fepril Syrup 120mg/5ml
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Fepril Syrup 120mg/5ml
8. Maklumat Lanjut
9. Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah Kegunaan Fepril Syrup 120mg/5ml

Fepril Syrup 120mg/5ml digunakan untuk melegakan demam dan kesakitan ringan hingga sederhana yang berkaitan dengan keadaan akibat sakit kepala, selsema dan gejala selsema, sakit gigi, sakit telinga dan tindak balas selepas vaksinasi.

Bagaimana Fepril Syrup 120mg/5ml berfungsi

Fepril Syrup 120mg/5ml mempunyai ciri-ciri untuk melegakan kesakitan dan bertindak sebagai anti-demam. Ia berfungsi dengan menghalang impuls kesakitan dan meningkatkan ketahanan sakit. Ia juga meningkatkan aliran darah di seluruh kulit, kehilangan haba dan berpeluh bagi mengurangkan kesakitan.

Sebelum mengguna Fepril Syrup 120mg/5ml

-Bila tidak boleh menggunakan

Anda dilarang mengambil ubat ini dan mesti merujuk doktor atau ahli farmasi anda jika:

- Anda alah kepada Paracetamol atau Acetaminopen atau pada mana-mana bahan yang terkandung di dalam ubat ini.
- Anda tidak pasti sama ada untuk menggunakan ubat ini atau pun tidak.

Kehamilan dan Menyusu

Jangan menggunakan ubat ini jika anda hamil, merancang untuk hamil, atau sedang menyusu bayi anda. Sentiasa rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang jenis ubat.

-Sebelum mula mengguna

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami keadaan seperti di bawah:

- Jika anda alah terhadap aspirin.
- Jika anda pernah mengalami tindak balas kulit yang serius kerana paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang serius yang boleh membawa maut.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau telah mengambil ubat-ubat lain, termasuk yang tidak mempunyai preskripsi dari farmasi, kedai ubat, atau dari sumber lain.

Kesan-kesan beberapa ubat-ubatan mungkin terjejas sekiranya ubat-ubatan lain digunakan pada masa yang sama.

Produk ini mengandungi PARACETAMOL. Jangan ambil ubat-ubatan lain yang mengandungi Paracetamol pada masa yang sama.

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan ubat ini dengan kombinasi yang berikut:

- Alkohol, ubat pencetus enzim hati dan ubat-ubatan yang boleh merosakkan hati.
- Ubat antikoagulan (ubat pencair darah).
- Ubat antivirus
- Ubat yang digunakan untuk mencegah atau mengurangkan simptom sawan epilepsi atau lain-lain sawan.
- Pil mencegah kehamilan.

Cara menggunakan Fepril Syrup 120mg/5ml

Sentiasa mengambil ubat ini sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Baca arahan pada label dengan teliti. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya tidak memahami arahan tersebut.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan.

-Berapa banyak harus digunakan

Doktor atau ahli farmasi anda akan menasihati anda berapa banyak perlu diambil setiap hari, dan berapa lama anda perlu mengambilnya. Ini bergantung kepada keadaan anda dan sama ada anda mengambil atau tidak mana-mana ubat-ubatan lain.

Untuk dos yang tepat, timbang berat anak anda dan berikan dos berdasarkan pada 15mg Paracetamol untuk setiap kg berat badan.

Cth: Jika berat anak anda 20kg:

$$20 \times 15\text{mg} = 300\text{mg} = (300\text{mg} / 120\text{mg} \times 5\text{mL}) = 12.5\text{mL}$$

Contoh dos mengikut berat:

Berat (kg)	Purata umur (tahun)	Dos (mg)	Dos (mL)
9-14	1-3	135-210	5.5-9 mL
15-20	4-6	255-300	9-12.5mL

-Bila perlu digunakan

Dos ini boleh diberikan setiap 4 hingga 6 jam jika perlu sehingga maksimum 4 dos dalam 24 jam atau ikut arahan label dengan teliti dan seperti yang diarahkan oleh anda doktor atau ahli farmasi.

-Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini untuk tempoh masa yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Jika terlupa mengambil

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya seperti biasa. Jangan gantikan dos anda untuk menggantikan dos yang tertinggal. Ini boleh meningkatkan peluang anda mendapat kesan-kesan sampingan yang tidak diingini.

FEPRIL SYRUP 120MG/5ML

Paracetamol (120mg /5mL)

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, jika anda atau orang lain mengambil dos yang berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan yang segera.

Simptom-simptom akibat pengambilan Fepril Syrup 120mg/5ml secara berlebihan:

- Pucat
- Loya
- Muntah
- Anoreksia
- Sakit perut
- Tekanan darah rendah
- Berpeluh
- Hilang selera makan
- Ketidaknormalan metabolisme glukosa dan asidosis metabolik boleh berlaku.

Ketika keracunan yang teruk, kegagalan hati boleh menyebabkan kerosakan atau kegagalan fungsi otak, koma dan kematian. Kegagalan buah pinggang akut dengan kerosakan pada sel tubul buah pinggang boleh berlaku walaupun tanpa kerosakan hati yang teruk. Denyutan jantung yang tidak teratur juga pernah dilaporkan.

Semasa menggunakan Fepril Syrup 120mg/5ml

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor atau ahli farmasi yang sedang merawat anda jika anda sedang menggunakan Fepril Syrup 120mg/5ml.

Maklumkan kepada doktor anda jika anda hamil semasa sedang menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti ambil ubat ini kecuali atas nasihat doktor atau ahli farmasi anda. Jangan berikan ubat ini kepada orang lain walaupun mereka mempunyai masalah yang sama dengan anda. Jangan ambil dos yang besar kecuali atas nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Amaran Alahan : Paracetamol boleh menyebabkan alahan kulit yang teruk. Gejala termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan atau dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Fepril Syrup 120mg/5ml boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini. Kesan-kesan sampingan ubat ini biasanya tidak serius, walaupun tindak balas darah pernah dilaporkan. Tindak balas hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, bengkak, *Stevens Johnson Syndrome / Toxic Epidermal Necrolysis* telah dilaporkan.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas boleh berlaku pada sesetengah pesakit. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati apa-apa yang membuat anda berasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers Reporting Side Effect Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Fepril Syrup 120mg/5ml

-Penyimpanan

Jauhkan semua ubat daripada penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

Simpan di dalam bekas yang ditutup rapat di tempat kering di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang diterterakan pada pek bungkusan. Tarikh luput adalah merujuk kepada hari terakhir dalam bulan tersebut.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Sirap jernih berwarna merah jambu, dengan rasa raspberi.

-Bahan bahan kandungan

Bahan aktif :

- Paracetamol

Bahan tidak aktif:

- Sodium Methyl Paraben
- Sodium Propyl Paraben
- Propylene Glycol
- Saccharin Sodium
- Sugar Granular (Sucrose)
- Liquid Sorbitol 70%
- Xanthan Gum
- Citric Acid Monohydrate
- Sodium Citrate
- Colour Carmoisine
- Raspberry Flavour
- Purified Water

- Nombor MAL:

MAL19912158XZ

Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd
(661901-P/200401023395)
Lot 24 & 25, Jalan Perusahaan Lapan,
Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

04/03/2022

Nombor Siri:

NPRA(R2/1) 220224/840