

# MIST. CARMINATIVE (ADULT)

Light Magnesium Carbonate / Sodium Bicarbonate (150mg/ 250mg)

## Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mist. Carminative (Adult)
2. Bagaimana Mist. Carminative (Adult) berfungsi
3. Sebelum menggunakan Mist. Carminative (Adult)
4. Cara menggunakan Mist. Carminative (Adult)
5. Semasa mengambil Mist. Carminative
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Mist. Carminative (Adult)
8. Maklumat Lanjut
9. Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

## Apakah kegunaan Mist. Carminative (Adult)

Antasid diambil untuk melegakan pedih ulu hati, perut tidak selesa, dan kembung perut.

## Bagaimana Mist. Carminative (Adult) berfungsi

Magnesium karbonat dan natrium bikarbonat meneutralkan asid perut yang berlebihan. Magnesium karbonat bertindak balas dengan asid perut untuk membentuk larutan magnesium klorida dan karbon dioksida di dalam perut.

## Sebelum mengambil Mist. Carminative (Adult)

### -Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ubat ini sekiranya anda:

- Alah kepada mana-mana bahan yang terkandung dalam ubat ini.
- Mempunyai masalah hati atau buah pinggang.

### Hamil dan menyusukan bayi:

- Jangan ambil Mist. Carminative (Adult) jika anda hamil, sedang merancang untuk hamil atau mungkin akan hamil.
- Jangan ambil ubat ini jika anda sedang menyusukan bayi. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

## -Sebelum mula menggunakan Mist. Carminative (Adult)

- Beritahu ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan terhadap mana-mana ubat-ubatan lain.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil atau merancang untuk hamil atau sedang menyusukan bayi. Doktor atau ahli farmasi anda boleh berbincang dengan anda mengenai manfaat dan risiko yang terlibat.

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi jika anda:

- mempunyai masalah hati atau buah pinggang.
- mempunyai tekanan darah yang tinggi atau penyakit jantung.

Pesakit warga tua yang mempunyai masalah buah pinggang yang teruk atau masalah hati perlu berbincang dengan doktor mereka sebelum mengambil ubat ini. Pesakit ini perlu berhati-hati apabila mengambil ubat ini.

## -Jika mengambil ubat-ubatan lain

Jangan mengambil Mist. Carminative (Adult) dalam masa dua hingga empat jam sebelum atau selepas mengambil ubat-ubatan lain. Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan lain, termasuklah:

- Ubat sedatif (ubat yang digunakan untuk merawat keresahan dan ketegangan).
- Ubat *salicylates* (digunakan untuk melegakan kesakitan dan keradangan, untuk mengurangkan demam, dan untuk mengelakkan pembekuan darah berlebihan seperti aspirin).
- Ubat hipertensi (digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi seperti ACE inhibitors).
- Ubat antiretroviral (digunakan untuk merawat HIV/AIDS).
- Ubat antibiotik (digunakan untuk merawat jangkitan bakteria).

- Ubat *bisphosphonates* (digunakan untuk membantu dan merawat tulang).
- Ubat anti-malaria (digunakan untuk mencegah dan merawat jangkitan malaria).
- Ubat steroid (digunakan untuk mengurangkan keradangan dalam badan).
- Ubat kegagalan jantung (digunakan untuk merawat kegagalan jantung).
- Ubat rawatan kanser (digunakan untuk merawat kanser paru-paru dan kanser pankreas).
- Ubat antihistamin (digunakan untuk melegakan gejala alergi seperti mata berair, hidung berair, mata gatal/hidung, bersin, gatal-gatal, dan gatal-gatal).
- Ubat antikonvulsan (digunakan untuk mencegah dan mengawal sawan).
- Ubat antifungal (digunakan untuk orang dewasa untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh kulat).
- *Proton pump inhibitors* (digunakan untuk mengurangkan asid perut).
- Ubat hormon tiroid (digunakan untuk merawat kelenjar tiroid yang tidak aktif).
- Ejen *antimanic* (digunakan untuk merawat gangguan bipolar).
- Ejen imunosupresif (digunakan untuk membantu mencegah penolakan organ pemindahan).
- Ejen *chelating* (digunakan untuk merawat penyakit Wilson [keadaan yang diwarisi yang menyebabkan tembaga membina dalam badan dan boleh mengakibatkan gejala-gejala yang serius] dan cystinuria [keadaan yang diwarisi yang boleh menyebabkan batu ginjal]).
- Ubat antipsikotik (digunakan untuk mengurangkan halusinasi dan khayalan yang berkaitan dengan psikosis).
- *Statins* (ubat yang digunakan untuk merawat kolesterol tinggi).

## Cara menggunakan Mist. Carminative (Adult)

Goncang botol sebelum mengambil Mist. Carminative.

Patuhi semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor atau ahli farmasi dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung di dalam risalah ini.

# MIST. CARMINATIVE (ADULT)

Light Magnesium Carbonate / Sodium Bicarbonate (150mg/ 250mg)

Jika anda tidak memahami arahan pada botol preskripsi anda, minta ahli farmasi, jururawat, atau doktor untuk menerangkan arahan itu kepada anda.

## -Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan menasihati jumlah dos yang diperlukan setiap hari, dan tempoh anda perlu mengambil Mist. Carminative (Adult). Dos yang biasa diambil adalah 10 hingga 20 ml tiga hingga empat kali sehari.

## -Bila perlu digunakan

Ambil ubat ini selepas makan.

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

## -Berapa lama perlu digunakan

Terus mengambil ubat ini mengikut arahan doktor anda. Sekiranya simptom berlarutan, segeralah berjumpa dengan doktor anda.

## -Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa mengambil ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada waktu biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

## -Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, jika mengambil dos yang berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Gejala pengambilan ubat berlebihan:

- Loya
- Muntah-muntah
- Kulit kemerahan
- Dahaga
- Mengantuk
- Hipotensi
- Sukar bernafas

- Hyporeflexia (otot kurang responsif terhadap rangsangan).
- Peripheral vasodilatation (pelebaran saluran darah).
- Bradycardia (degupan jantung rendah)
- Serangan jantung
- Koma
- Perubahan mood
- Kepenatan
- Sesak nafas
- Kelemahan otot
- Degupan jantung tidak teratur
- Hypertonicity (ketegangan otot)
- Twitching (kontraksi otot kecil di dalam badan)
- Tetany (kejang otot tangan dan kaki)

## **Semasa mengambil Mist. Carminative (Adult)**

### -Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Mist. Carminative.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom anda tidak berkurangan. Ahli farmasi atau doktor anda akan memeriksa keadaan anda dan akan memberitahu sama ada anda perlu meneruskan pengambilan ubat ini atau tidak.

### -Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Mist. Carminative (Adult) dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama dengan anda.

### -Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan daripada mengambil alkohol. Jika anda mendapati ubat ini

mengganggu perut anda, pengambilan ubat ini ketika atau selepas makan boleh membantu.

## **Kesan-kesan Sampingan**

Seperti ubat-ubatan lain, Mist. Carminative (Adult) boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Kesan-kesan sampingan adalah seperti berikut.

- Cirit-birit
- Kejang perut
- Kembung perut
- Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan kewujudan batu karang berasaskan silika (kehadiran silika di buah pinggang).
- Penggunaan berterusan mengakibatkan penghasilan asid perut yang berlebihan dan berbalik.

Beberapa kesan sampingan mungkin berlaku yang biasanya tidak memerlukan rawatan perubatan. Kesan-kesan sampingan ini mungkin hilang semasa rawatan kerana badan anda mula menyesuaikan diri dengan ubat ini.

Selain itu, pakar kesihatan anda mungkin boleh memberitahu anda tentang cara-cara untuk mencegah atau mengurangkan kesan-kesan sampingan. Hubungi pakar kesihatan anda jika apa-apa kesan sampingan yang berikut berterusan atau mengganggu atau jika anda mempunyai sebarang soalan mengenainya.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan juga boleh berlaku kepada sesetengah pesakit. Jika anda mengalami sebarang kesan lain, hubungi doktor anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web [npra.gov.my](http://npra.gov.my) [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

# MIST. CARMINATIVE (ADULT)

Light Magnesium Carbonate / Sodium Bicarbonate (150mg/ 250mg)

---

## Cara Penyimpanan dan Pelupusan Mist. Carminative (Adult)

### -Penyimpanan

- Simpan semua ubat daripada penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.
- Simpan di bawah 30°C. Lindungi dari cahaya.
- Jangan simpan ubat di dalam bilik mandi, berdekatan dengan sinki atau tingkap.
- Jangan tinggalkan ubat ini di dalam kereta ketika cuaca panas. Kepanasan dan kelembapan akan merosakkan sesetengah ubat.
- Jangan ambil ubat ini sekiranya telah melepasi tarikh luput yang dicetak pada bungkusannya.

### -Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

## Maklumat Lanjut

### -Rupa dan warna produk

Cecair likat berwarna kuning pucat berperisa buah pelaga.

### -Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Setiap 5ml mengandungi Light Magnesium Carbonate 150mg dan Sodium Bicarbonate 250mg.

Bahan tidak aktif:

- *Aromatic Cardamon Tincture*
- *Chloroform*
- *Ethyl Alcohol 96%*
- *Carmellose Sodium*
- *Purified water*
- *Hydrochloric Acid*
- *Sodium Hydroxide*

### -Nombor MAL

MAL19912224X

## Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd  
(200401023395)

Lot 24 & 25, Jalan Perusahaan Lapan,  
Bakar Arang Industrial Estate, 08000  
Sungai Petani, Kedah Darul Aman  
Malaysia.

## Tarikh Kemaskini RiMUP

06/04/2020

## Nombor Siri:

NPRA(R4/1)160120/00010