

CORBETA TABLET 40MG

Propanolol Hydrochloride (40mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Corbета Tablet
2. Bagaimana Corbета Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Corbета Tablet
4. Cara Penggunaan Corbета Tablet
5. Semasa Penggunaan Corbета Tablet
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Corbета Tablet
8. Perihal Produk
9. Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang
10. Tarikh Kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

• Merokok atau minum alkohol

Kehamilan dan Laktasi

Keselamatan kepada kehamilan masih belum ditetapkan. Ia tidak disyorkan pada ibu-ibu yang menyusui kecuali jika penggunaannya melebihi potensi risiko yang bakal dialami oleh ibu-ibu yang menyusui.

Maklumkan doktor anda jika anda mengandung atau menyusui anak, atau mungkin hamil atau merancang untuk hamil.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan pada label dengan berhati-hati dan seperti yang diarahkan oleh doktor dan ahli farmasi anda.

Ambil Corbета Tablet sebelum makan. Jika anda mengambil antasid dengan aluminium di dalamnya, ambil sekurang-kurangnya 2 jam selepas mengambil Corbета Tablet.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil dos, ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya hampir waktu untuk pengambilan dos anda yang seterusnya, tunggu sahaja untuk pengambilan dos tersebut dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan gantikan dos bagi menggantikan pengambilan dos yang tertinggal.

-Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Segera hubungi doktor anda atau pergi ke jabatan kecemasan di hospital terdekat jika anda atau orang lain telah mengambil ubat ini secara berlebihan.

Contoh-contoh simptom pengambilan ubat yang berlebihan adalah pening-pening, sesak nafas, bengkak tangan/ pergelangan kaki/ kaki, dan kadar jantung yang perlahan.

Semasa menggunakan Corbета Tablet

-Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat ini seperti yang telah ditetapkan oleh doktor anda.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Semasa anda mengambil ubat ini, jangan lakukan tindakan berikut:

- Jangan berhenti secara tiba-tiba mengambil ubat ini
- Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan
- Anda dinasihatkan untuk mengelakkan pengambilan alkohol untuk menggunakan produk ini
- Jangan memandu atau mengendalikan mesin jika terdapat gangguan penglihatan, halusinasi, keletihan, kebingungan, pening-pening atau keletihan selepas mengambil ubat.
- Sekiranya anda diberitahu bahawa anda tidak bertoleransi terhadap gula,

Apakah kegunaan Corbета Tablet

Corbета Tablet digunakan untuk:

- Mengubati tekanan darah tinggi
- Mengubati sakit dada yang teruk
- Mengawal denyut jantung yang cepat atau tidak teratur dan gejala yang disebabkan oleh kelenjar tiroid
- Mengurangkan serangan migrain
- Menenangkan orang yang cemas dan bimbang
- Mencegah pendarahan perut pada pesakit darah tinggi dalam hati mereka atau pembuluh darah bengkak di tekak

Bagaimana Corbета Tablet berfungsi

Corbета Tablet berfungsi dengan melambatkan jantung dan menurunkan darah yang dipam keluar. Hal ini membantu untuk menurunkan tekanan darah, jantung mengepam lebih cekap dan mengurangkan beban kerja pada jantung.

Sebelum menggunakan Corbета Tablet

- Bila ubat ini tidak boleh digunakan

Jangan gunakan Corbета Tablet di dalam keadaan berikut:

- Alahan terhadap mana-mana bahan untuk ubat ini
- Sindrom sinus sakit
- Kejutan Kardiogenik
- Asma Bronkial
- Kanak-kanak dengan diabetes dan kegagalan jantung

Jika anda tidak pasti sama ada anda boleh menggunakan ubat ini, sila rujuk dengan doktor atau ahli farmasi anda terlebih dahulu.

-Sebelum mula menggunakan

Maklumkan doktor anda jika anda mempunyai:

- Masalah jantung yang lain
- Sejarah reaksi alergi
- Penyakit ginjal atau hati
- Sindrom 'Wolff-Parkinson-White'

Doktor atau ahli farmasi anda akan menasihati anda jika anda boleh menggunakan Corbета Tablet semasa hamil atau semasa anda menyusui.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Corbета Tablet tidak boleh digunakan dengan Verapamil, Clonidine dan Mibefradil.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda menggunakan apa-apa ubat lain, termasuk yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, dewan perubatan atau mana-mana sumber lain.

Cara Penggunaan Corbета Tablet

Sentiasa gunakan ubat ini seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda. Baca arahan pada label dengan berhati-hati. Tanya dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai sebarang kebimbangan tentang cara menggunakan ubat ini.

-Berapa banyak harus digunakan

Doktor atau ahli farmasi anda akan menasihati anda berapa banyak yang perlu digunakan setiap hari dan berapa lama anda perlu menggunakannya.

Sentiasa ambil dos seperti mana yang diberitahu oleh doktor anda.

Dos Orang Dewasa:

Tekanan darah tinggi: Julat dos biasa yang berkesan adalah 40-320mg sehari
Angina pectoris: Dos optimum purata adalah 160mg sehari.

Migrain: Dos awal ialah 80mg/ hari, boleh meningkat sehingga 160-240mg/ hari.

Dos kanak-kanak:

Dos ditentukan menggunakan berat badan

CORBETA TABLET 40MG

Propranolol Hydrochloride (40mg)

hubungi doktor anda sebelum mengambil ubat ini.

Simpan di bawah 30°C di tempat sejuk yang kering. Lindungi dari cahaya dan kelembapan.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Memandu dan menggunakan mesin
Propranolol boleh menyebabkan gangguan visual, halusinasi, keletihan, kekeliruan mental, pening atau keletihan. Pastikan anda tidak terjejas sebelum anda memandu atau mengendalikan mesin.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan. Langkah-langkah ini boleh membantu melindungi alam sekitar.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubat lain, Corbeta Tablet juga boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya. Maklumkan doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Bersih, seragam, bulat, rata, tablet berbetuk bulat dan berwarna merah jambu.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Propranolol Hydrochloride

- Bahan tidak aktif:

- Ponceau 4R
- Lactose
- Maize Starch
- Magnesium Stearate

Maklumkan doktor anda jika anda mengalami kesan-kesan sampingan berikut:

- Denyut jantung yang lambat
- Tekanan darah rendah yang menyebabkan pening, ringan kepala, pengsan atau kabur penglihatan
- Reaksi alergi seperti gatal, kesulitan bernafas dan bengkak di wajah, bibir, tekak atau lidah

-Nombor MAL

MAL19860175AZ

Kesan-kesan sampingan lain yang mungkin berlaku adalah kegagalan jantung kongestif, penyakit Raynaud, halusinasi, mimpi buruk, lemah, keletihan, gangguan penglihatan dan bronkospasma.

Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd
(200401023395)
Lot 24, Jalan Perusahaan Lapan, Bakar Arang Industrial Estate,
08000, Sungai Petani,
Kedah Darul Aman, Malaysia.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak tersenarai diatas mungkin berlaku kepada sesetengah pesakit. Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk menjawab soalan anda.

Tarikh kemaskini RiMUP

26/10/2023

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*]

Nombor Siri:

NPRA(R2/1)191226/313

Cara penyimpanan dan pelupusan Corbeta Tablet

-Penyimpanan

Jauhkan semua ubat dari penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang tertera di kotak.