

ENCLOR EAR DROPS 5% W/V

Chloramphenicol (5% w/v)

Apakah yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Enclor Ear Drops 5% w/v
2. Bagaimana Enclor Ear Drops 5% w/v berfungsi
3. Sebelum mengguna Enclor Ear Drops 5% w/v
4. Cara menggunakan Enclor Ear Drops 5% w/v
5. Semasa menggunakan Enclor Ear Drops 5% w/v
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Enclor Ear Drops 5% w/v
8. Maklumat Lanjut
9. Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Enclor Ear Drops 5% w/v

Enclor Ear Drops 5% w/v adalah ubat titis telinga digunakan untuk merawat jangkitan bakteria pada bahagian luar telinga.

Bagaimana Enclor Ear Drops 5% w/v berfungsi

Enclor Ear Drops 5% w/v tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dikenali sebagai antibiotik. Ia berfungsi dengan menghentikan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengambil Enclor Ear Drops 5% w/v

-Bila tidak boleh mengambil

Anda tidak boleh mengambil ubat ini dan mesti merujuk doktor atau ahli farmasi anda jika:

- Anda alergic kepada Chloramphenicol atau bahan-bahan dalam kandungan ubat ini.

Kehamilan dan Menyusu

Jangan menggunakan ubat ini jika anda hamil, merancang untuk hamil, atau sedang menyusu bayi anda. Sentiasa rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini.

-Sebelum mula mengambil Enclor Ear Drops 5% w/v

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai masalah perubatan lain.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau baru-baru ini mengambil ubat-ubat lain, termasuk yang tidak memerlukan preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau dari sumber lain.

Kesan beberapa ubat-ubatan mungkin terjejas jika ubat-ubatan lain digunakan pada masa yang sama.

Cara menggunakan Enclor Ear Drops 5% w/v

Sentiasa menggunakan ubat ini sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Baca arahan pada label dengan teliti. Sila bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda sekiranya tidak memahami arahan tersebut.

-Berapa banyak harus digunakan

2 – 3 titik ubat dititiskan ke dalam telinga, 3 kali sehari.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan label dengan teliti dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil ubat ini selagi doktor anda atau ahli farmasi mengesyorkan.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya seperti biasa. Jangan gantikan dos anda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika terlebih ubat dititiskan ke dalam telinga, ia perlu dikeluarkan dengan menyengetkan kepala dan basuh telinga dengan menggunakan air suam.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, jika anda atau orang lain mengambil dos yang berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada

sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan Enclor Ear Drops 5% w/v

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda yang sedang merawat anda jika anda sedang menggunakan Enclor Ear Drops 5% w/v.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti ambil ubat ini kecuali atas nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan beri ubat kepada orang lain walaupun mereka mempunyai keadaan atau simptom yang sama dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika kerengsaan atau reaksi alahan berlaku, hentikan penggunaan dan maklumkan kepada doktor anda.

Penggunaan yang berpanjangan dalam sesetengah kes boleh mengakibatkan jangkitan lain termasuk kulat.

Kesan-kesan Sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Enclor Ear Drops 5% w/v juga boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Antara kesan-kesan sampingan yang mungkin berlaku:

- Kerengsaan seperti pedih, gatal-gatal
- Keradangan kulit

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas boleh berlaku pada sesetengah orang. Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda merasa kurang sihat selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui

ENCLOR EAR DROPS 5% W/V

Chloramphenicol (5% w/v)

laman web npra.gov.my [Consumers
→ Reporting Side Effects to Medicines
(ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Enclor Ear Drops 5% w/v

-Penyimpanan

Simpan ke dalam bekas yang tertutup
rapat di tempat yang kering. Simpan
pada suhu 2°C-8°C. Lindungi dari
cahaya dan kebekuan.

Lupuskan ubat ini selepas 30 hari dari
tarikh ia dibuka.

Simpan semua ubat daripada
penglihatan dan jangkauan kanak-
kanak.

Jangan guna ubat ini sekiranya telah
melewati tarikh tamat tempoh yang
dicetak pada bungkusannya. Tarikh
luput merujuk kepada hari terakhir
bulan itu.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air
buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan
maklumat daripada ahli farmasi anda
mengenai cara yang betul untuk
melupuskan ubat yang tidak diperlukan
lagi. Langkah-langkah ini dapat
membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair jernih yang boleh mengalir,
bebas daripada bendasing. Warna: tidak
berwarna atau berwarna sedikit kuning.

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

- Setiap ml mengandungi
Chloramphenicol 50mg

Bahan tidak aktif:

- Propylene Glycol

-Nombor MAL:

MAL19860033AZ

Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang

Idaman Pharma Manufacturing Sdn
Bhd (200401023395)
Lot 24 & 25, Jalan Perusahaan Lapan,
Bakar Arang Industrial Estate, 08000
Sungai Petani,
Kedah Darul Aman, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

23/07/2019

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)300519/00146