

IDAMAN PHARMA PENICILLIN V TABLET

Phenoxymethylpenicillin (125mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan PENICILLIN V TABLET
2. Bagaimana PENICILLIN V TABLET berfungsi
3. Sebelum mengambil PENICILLIN V TABLET
4. Cara menggunakan PENICILLIN V TABLET
5. Semasa menggunakan PENICILLIN V TABLET
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan PENICILLIN V TABLET
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan PENICILLIN V TABLET

Ubat ini boleh digunakan untuk merawat jangkitan:

- hidung, tekak atau telinga
- paru-paru
- saluran kencing

Penicilin juga digunakan untuk pencegahan demam reumatik (penyakit radang yang boleh menyebabkan kerosakan kepada kulit, sendi, otak atau jantung) dan pencegahan terhadap jangkitan selepas penyingkiran tonsil dan pengekstrakan gigi

Ia tidak berfungsi menentang jangkitan yang disebabkan oleh virus, seperti demam selesema.

Bagaimana PENICILLIN V TABLET berfungsi

Ia adalah antibiotik yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan yang dipanggil *penicilin*. Antibiotik ini berfungsi dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum mengambil PENICILLIN V TABLET

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil PENICILLIN V TABLET jika anda mengalami reaksi alahan kepada:-

- Phenoxymethylpenicillin
- Ubat *penicillin* lain
- Mana-mana bahan yang disenaraikan pada akhir risalah ini.

Jangan ambil PENICILLIN V TABLET sekiranya anda mempunyai masalah akut yang serius.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor jika anda mengalami atau pernah mengalami sebarang masalah kesihatan terutamanya masalah buah pinggang.

Kebarangkalian kepekaan silang berlaku dengan ubat beta-laktam yang lain. Sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda jika anda diperlukan untuk mengambil PENICILLIN V TABLET dengan ubat beta-laktam antibiotik yang lain.

Sila beritahu doktor anda sekiranya anda mengalami sejarah reaksi hipersensitiviti terhadap penicillin, cephalosporins, carbapenems, atau beta-laktam antibiotik.

Jika anda tidak pasti sama ada perkara-perkara di atas ada kaitan dengan anda, sila bincang dengan doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil ubat PENICILLIN V TABLET.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda sedang mengambil sebarang ubat lain termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Pengambilan PENICILLIN V TABLET bersama ubat lain/makanan/ alat diagnostik mungkin mengakibatkan interaksi. Ini termasuk:

- antibiotik lain
- ubat untuk merendahkan paras urik asid dalam darah (probenecid, sulfapyrazone)
- methotrexate, neomycin
- guar gum
- ubat oral gumpalan darah dan ubat oral pencegah kehamilan
- nadolol and propranolol
- alat diagnostik (Coombs test, Guthrie test, dan lain-lain).

Cara menggunakan PENICILLIN V TABLET

-Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan doktor atau ahli farmasi dengan teliti. Ia mungkin berbeza daripada maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat, sila dapat bantuan daripada doktor atau ahli farmasi.

Dos dewasa biasa:

Oral -1 hingga 4 tablet setiap enam hingga lapan jam.

Dos boleh diberikan sehingga 7.2gm.

Dos Biasa untuk bayi dan kanak-kanak sehingga usia 12 tahun:

- 2.5 hingga 9.3mg setiap kg berat badan setiap 4 jam;
- 3.75 hingga 14mg setiap kg berat badan setiap 6 jam;
- 5.0 hingga 18.7 mg setiap kg berat badan setiap 8 jam.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan sepertimana diberi oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Tablet perlu ditelan bersama air sekurang-kurangnya 30 minit sebelum makan atau 2 jam sesudah makan.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan pengambilan PENICILLIN V TABLET untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Gejala dos berlebihan seperti loya dan muntah yang teruk, cirit birit, sakit perut, kekeliruan, mengantuk dan mungkin mengalami kejang. Dos tinggi juga boleh menyebabkan paras kalium darah tinggi.

IDAMAN PHARMA PENICILLIN V TABLET

Phenoxymethyl Penicillin (125mg)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat jika anda ataupun orang lain terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan dengan segera.

Semasa menggunakan PENICILLIN V TABLET

-Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya perlu mendapat rawatan lain, pastikan semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi dimaklumkan bahawa anda sedang mengambil PENICILLIN V TABLET.

Anda perlu maklumkan doktor anda jika anda turut mengambil ubat/ diuretik yang mengandungi potassium apabila anda diarahkan oleh doktor untuk mengambil PENICILLIN V TABLET melebihi seperti yang disarankan dalam risalah ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali atas arahan doktor.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi.

Jangan beri PENICILLIN V TABLET kepada sesiapa walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Hamil dan menyusukan bayi

Sila rujuk kepada doktor anda sebelum anda mengambil PENICILLIN V TABLET jika anda hamil, sedang merancang untuk hamil atau mungkin hamil.

Dapatkan nasihat doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat jika anda menyusukan bayi.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, PENICILLIN V TABLET boleh menyebabkan kesan sampingan tetapi bukan semua orang mengalaminya.

PENICILLIN V TABLET mungkin mengakibatkan masalah alahan dan reaksi kulit yang serius.

Berhenti mengambil PENICILLIN V TABLET dan dapatkan perhatian perubatan dengan segera jika anda mengalami simptom yang berikut:

- kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak dan iritasi mata.

Jumpa doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan yang di bawah selepas mengambil ubat ini:

- cirit-birit yang teruk dan keradangan pada lidah, sakit mulut
- *haemolytic anaemia*
- pergerakan yang tidak teratur disebabkan oleh pergerakan otot yang tidak terkawal dan sensasi kulit yang tidak normal
- radang/jangkitan pada vagina.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)* / *Vaccine (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan PENICILLIN V TABLET

-Penyimpanan

Pastikan bekas tertutup rapat di tempat yang kering.

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak. Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jangan mengambil PENICILLIN V TABLET selepas tarikh tamat tempoh seperti yang dicetak pada label.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Tablet berwarna putih, bersih, kering, bulat, seragam, tidak bersalat, dwicembung, mempunyai garisan belahan di satu permukaan.

-Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Setiap tablet mengandungi 125mg of Phenoxymethyl Penicillin.

- Bahan tidak aktif:

Povidone, Maize Starch, Magnesium Stearate, Lactose

-Nombor MAL

MAL19860070AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Idaman Pharma Manufacturing Sdn. Bhd,
Lot 120, Taman Farmaseutikal,
32610 Bandar Seri Iskandar,
Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

25/08/2021

Nombor Siri

NPRA(R4/1)280519/00139