

AMPICILLA POWDER FOR ORAL SUSPENSION

125MG/5ML

Ampicillin (125mg/5mL)

Apakah yang ada pada risalah Ini

1. Apakah kegunaan Ampicilla Powder for Oral Suspension
2. Bagaimana Ampicilla Powder for Oral Suspension berfungsi
3. Sebelum mengambil Ampicilla Powder for Oral Suspension
4. Cara menggunakan Ampicilla Powder for Oral Suspension
5. Semasa menggunakan Ampicilla Powder for Oral Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ampicilla Powder for Oral Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Ampicilla Powder for Oral Suspension

Ampicilla Powder for Oral Suspension mengandungi ampicillin yang digunakan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Bagaimana Ampicilla Powder for Oral Suspension berfungsi

Ampicilla Powder for Oral Suspension bertindak dengan cara membunuh bakteria penyebab jangkitan dengan menghentikan sistesis penghasilan dinding sel bakteria.

Sebelum mengambil Ampicilla Powder for Oral Suspension

-Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Ampicilla Powder for Oral Suspension jika anda alah kepada Ampicillin atau antibiotik yang mengandungi *beta-lactam* dan mana-mana bahan yang terkandung di dalam risalah ini.

Hamil dan menyusukan bayi

Jangan ambil Ampicilla Powder for Oral Suspension jika anda hamil, sedang merancang untuk hamil atau mungkin hamil tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Ampicilla Powder for Oral Suspension hanya boleh diambil sekiranya diperlukan secara jelas.

Jangan ambil Ampicilla Powder for Oral Suspension jika anda sedang menyusukan bayi. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

-Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai alahan kepada Ampicillin, Penisilin atau mana-mana antibiotik lain.

Sebelum anda mengambil Ampicilla Powder for Oral Suspension doktor anda perlu tahu jika anda mempunyai masalah hati atau kerosakan buah pinggang.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain termasuklah ubat-ubatan yang tidak memerlukan preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan. Sesetengah ubatan mungkin menyebabkan interaksi apabila diambil bersama. Ini termasuk:

- *Uricosurics* (ubat untuk merawat gout)
- *Chloroquine* (ubat anti-malaria)
- *Anti-coagulants* (ubat untuk mencairkan darah)
- Vaksin
- Sitotoksik

Cara menggunakan Ampicilla Powder for Oral Suspension

Sentiasa mengambil ubat ini sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Baca arahan pada label dengan teliti. Periksa dengan doktor atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti.

Cara penyediaan Ampicilla Powder for Oral Suspension:

Tambah sedikit air dan goncang botol sehingga serbuk sedikit larut. Tambah air perlahan-lahan sehingga paras yang dikehendaki dan goncang dengan baik. Simpan larutan ubat di dalam peti sejuk dan gunakan dalam tempoh 7 hari.

Goncang bekas dengan baik setiap kali sebelum digunakan.

-Berapa banyak harus digunakan

Ikut semua arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk bantuan daripada doktor atau ahli farmasi.

Ampicilla Powder for Oral Suspension berkesan dalam bentuk pelbagai dos rejimen. Cadangan yang disyorkan di sini adalah sukatan yang biasa digunakan.

Kanak-kanak dua tahun: 2.5 ml ke 5 ml empat kali sehari.

Kanak-kanak 2 hingga 10 tahun: 5 ml ke 10 ml empat kali sehari.

-Bila perlu digunakan

Ampicilla Powder for Oral Suspension perlu diambil semasa perut kosong sebaik-baiknya setengah ke satu jam sebelum makan untuk penyerapan yang lebih baik. Ambil ubat ini pada jangka masa yang tetap dan perlu dihabiskan walaupun anda sudah merasa sihat. Ikut arahan seperti yang ditetapkan di label.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa mengambil ubat ini.

AMPICILLA POWDER FOR ORAL SUSPENSION

125MG/5ML

Ampicillin (125mg/5mL)

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos yang seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada waktu biasa. Jangan ambil dos yang berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengambil berlebihan (terlebi dos)

Muntah, mual dan cirit birit ialah antara tanda-tanda lebih dos. Ia boleh dikeluarkan melalui haemodialisis.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital terdekat, jika mengambil dos yang berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Ampicilla Powder for Oral Suspension

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Ampicilla.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda telah hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Ampicilla Powder for Oral Suspension dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Penggunaan berterusan mungkin mengakibatkan pertumbuhan organisma yang rentan. Sekiranya superinfeksi berlaku, produk ini harus dihentikan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Ampicilla Powder for Oral Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi dengan kadar segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Sila berjumpa dengan doktor dengan segera jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang berikut:

- Tindak balas alahan yang teruk seperti ruam kulit, *pruritus*, dan *urticaria*. Ampicilla Powder for Oral Suspension mungkin menyebabkan alahan yang teruk dan reaksi kulit yang serius.
- Kesukaran atau ketidakselesaan untuk membuang air kencing, terdapat darah di dalam air kencing atau sakit bahagian belakang (mungkin tanda radang pada buah pinggang).
- Cirit-birit yang teruk (mungkin mengandungi darah atau mukus).
- Pendarahan yang berlarutan dan dalam tempoh yang panjang.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas boleh berlaku di sesetengah pesakit. Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati apa-apa yang membuat anda rasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.moh.gov.my

(Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF)/ Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan semua ubat daripada penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang diterterakan pada pek bungkusan.

Simpan di bawah 30°C, jauhkan dari cahaya.

Serbuk kering tidak memerlukan penyejukan sehingga pembancuhan. Selepas pembancuhan, simpan di dalam peti sejuk dan gunakan dalam tempoh 7 hari.

Produk perlu dilarutkan dalam masa 90 hari dari pembukaan kantung aluminium bagi produk di dalam HDPE bersama kantung aluminium.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna produk

Serbuk halus putih, yang menjadi larutan suspensi merah jambu dan bau strawberi selepas dibancuh.

-Bahan bahan kandungan

-Bahan aktif:

Setiap 5 ml larutan suspensi Ampicillin Trihydrate mengandungi 125 mg Ampicillin.

AMPICILLA POWDER FOR ORAL SUSPENSION

125MG/5ML

Ampicillin (125mg/5mL)

-Bahan tidak aktif:

Castor sugar, Sodium
carboxymethylcellulose, Sodium
citrate, Colloidal silicone dioxide,
Sodium benzoate, Sodium saccharine,
Strawberry powder and FDC Red.

-Nombor MAL

MAL19890408AZ

**Pengilang dan Pemegang
Pendaftaran Produk**

Idaman Pharma Manufacturing Sdn
Bhd,
Lot 120, Taman Farmaseutikal, 32610,
Bandar Seri Iskandar, Perak, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

20/01/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/1)210609/694