

IDAMAN PHARMA CHLORPROMAZINE TABLET 100MG

Chlorpromazine Hydrochloride (100mg)

Apakah yang ada dalam risalah ini

1. Apakah kegunaan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg
2. Bagaimana Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg berfungsi
3. Sebelum menggunakan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg
4. Cara Penggunaan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg
5. Semasa Penggunaan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg
6. Kesan-kesan Sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg
8. Perihal Produk
9. Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg

Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg mengandungi Chlorpromazine Hydrochloride. Ia digunakan untuk rawatan gangguan tingkah laku. Ia juga digunakan untuk rawatan jangka pendek untuk keresahan, pergolakan dan tingkah laku ganas atau impulsif. Ubat ini juga digunakan untuk sendu berterusan, loya dan muntah yang berkaitan dengan gangguan otak.

Bagaimana Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg berfungsi

Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg dijangka berfungsi dengan menyekat tindakan zat kimia yang dipanggil dopamine yang bertindak di sistem saraf dalam otak.

Sebelum menggunakan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg

- Bila ubat ini tidak boleh digunakan

Anda tidak boleh menggunakan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg jika anda mempunyai:

- Alahan terhadap chlorpromazine
- Mengandung atau menyusu
- Sejarah masalah darah
- Penyakit jantung yang teruk
- Rasa deria seperti rasa mengantuk atau tidak teratur, penglihatan yang kabur, percakapan yang tidak jelas atau kurang kesedaran tentang persekitaran anda

Jika anda tidak pasti sama ada anda boleh menggunakan ubat ini, sila rujuk dengan doktor atau ahli farmasi anda terlebih dahulu.

Kehamilan dan Laktasi

Jika anda hamil atau menyusu anak atau mungkin hamil atau merancang untuk hamil, rujuk doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg.

Cara Penggunaan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa mengambil Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg tepat seperti arahan doktor anda. Jika anda tidak pasti dengan arahan pada label, minta doktor atau ahli farmasi anda untuk jelaskan arahan kepada anda.

Dos:

Pesakit boleh mengambil ubat bermula dengan dos yang rendah, bermula dari 25-50mg tiga kali sehari dan ditingkatkan jika perlu. Dos biasa ialah 25-100mg 3 kali sehari.

Pesakit psikotik mungkin memerlukan dos 1g atau lebih sehari.

Dalam rawatan pengambilan alkohol ringan, pesakit yang teruk dapat diberikan 25 hingga 50 mg dua kali sehari melalui mulut. Pesakit dengan gejala yang kurang teruk boleh diberikan 30 hingga 75 mg setiap hari dalam dos dibahagikan dengan mulut.

Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg tidak perlu diberikan kepada pesakit 'stoporous'

Penggunaan untuk kanak-kanak adalah tidak digalakkan.

- Bila ianya perlu digunakan

Telan ubat ini dengan air. Jika anda mengambil antacid, anda perlu sekurang-kurangnya 2 jam selepas mengambil chlorpromazine.

Ikut arahan pada label dengan berhati-hati dan seperti yang diarahkan oleh doktor dan ahli farmasi anda.

- Berapa lama ianya boleh digunakan

Jangan ambil lebih daripada 8 tablet dalam tempoh 24 jam atau 8 tablet dalam sehari selama lebih dari 2 minggu kecuali di bawah nasihat dan pengawasan doktor dan ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakannya

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi anda mengenai apa yang anda perlu lakukan jika anda terlupa untuk menggunakannya.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya hampir waktu untuk pengambilan dos anda yang seterusnya, tunggu sahaja untuk pengambilan dos tersebut dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan gandakan dos bagi menggantikan pengambilan dos yang tertinggal.

- Jika terlebih dos

Jika anda mengambil lebih daripada dos yang ditetapkan, rujuk doktor anda dengan serta-merta. Tanda-tanda terlebih dos termasuk:

- Nafas yang cepat dan pendek
- Suhu badan yang rendah
- Tekanan darah rendah
- Kegelisahan
- Sawan
- Tekanan jantung yang luar biasa
- Koma

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Bahagian Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda menganggap anda atau sesiapa mungkin mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa Penggunaan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat ini dengan tepat seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Maklumkan kepada doktor dan ahli farmasi yang merawat anda yang anda mengambil Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg.

Maklumkan segera kepada doktor and ajika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali jika dinasihatkan oleh doktor anda. Jangan mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor anda. Jangan beri Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg kepada orang lain walaupun mereka mempunyai gejala atau keadaan yang sama seperti anda.

IDAMAN PHARMA CHLORPROMAZINE TABLET 100MG

Chlorpromazine Hydrochloride (100mg)

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Pengambilan tinggi aluminium yang mengandungi antacid pada pesakit tua tidak disyorkan secara amnya kerana ia boleh menyebabkan penyakit Alzheimer.

Risiko dan manfaat perlu dipertimbangkan apabila masalah perubatan berikut wujud:

- Penyakit Alzheimer
- Apendik atau simptom-simptom apendik
- Pendarahan usus atau dubur yang tidak di diagnosis, kolitis ulseratif (keradangan di kolon)
- Sembelit
- Impak bowel (Sembelit kronik)
- Cirit-birit kronik
- Halangan usus (usus tersumbat yang menghalang kandungan usus)
- Masalah buah pinggang

Kesan-kesan Sampingan

Seperti semua ubat, Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg biasanya boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan yang biasa terjadi adalah:

- Mengantuk
- Kering mulut
- Hidung tersumbat
- Hipotensi postural
- Suhu badan rendah
- Tachycardia
- Aritmia
- Pergolakan
- Insomnia
- Kemurungan
- Miosis dan mydriasis
- Kekejangan
- Photosensitivity
- Ruam kulit
- Perencatan ejakulasi

Ini bukan senarai lengkap kesan-kesan sampingan. Anda perlu menghubungi doktor atau ahli farmasi jika anda mengalami apa-apa kesan sampingan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara Penyimpanan dan Pelupusan Idaman Pharma Chlorpromazine Tablet 100mg

- Penyimpanan

Simpan semua ubat-ubatan dari penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

Simpan ubat-ubat di bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Jangan simpan di dalam bilik mandi atau berdekatan dengan sinki, atau di atas jendela.

Jangan tinggalkan di dalam kereta pada hari panas. Haba dan kelembapan boleh merosakkan sesetengah ubat.

Jangan guna ubat ini selepas tarikh luput yang tertera di kotak. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan. Langkah-langkah ini boleh membantu melindungi alam sekitar.

Perihal Produk

- Rupa produk

Bersih, kering, bulat, seragam, dwicembung, sekata sisinya, tablet film bersalut dan berwarna putih bersih.

- Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Chlorpromazine Hydrochloride

Bahan tidak aktif:

- *Lactose Monohydrate*
- *Corn Starch (Maize Starch)*
- *Dioctyl sodium Sulphosuccinate*
- *Plasdone K30*
- *Ethyl Alcohol 96%*
- *Talc Powder*
- *Magnesium Stearate*
- *Sodium Starch Glycolate*
- *Opadry White 85F18422*
- *Purified Water*

- Nombor MAL:

MAL19880027AZ

Pemegang Pendaftaran Produk & Pengilang

InspiraPharma Sdn Bhd
(200401023395)
Lot 24 & 25, Jalan 8,
Kawasan Perusahaan Bakar Arang,
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

08/07/2026

Nombor Siri

NPRA(R2/1)200902/521