

SYNAMOX CAPSULES

Amoxicillin (250mg, 500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Synamox Capsules
2. Bagaimana Synamox Capsules berfungsi
3. Sebelum mengambil Synamox Capsules
4. Cara pengambilan Synamox Capsules
5. Semasa mengambil Synamox Capsules
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Synamox Capsules
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh Kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Synamox Capsules

Synamox Capsules mengandungi Amoxicillin sebagai bahan aktif. Amoxicillin tergolong dalam kelas antibiotik “penisilin”. Ubat ini digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria yang sensitif terhadap Amoxicillin termasuk:

- Jangkitan telinga, hidung dan tekak
- Jangkitan ginekologi dan saluran kencing
- Gonorea
- Jangkitan kulit dan tisu lembut

Bagaimana Synamox Capsules berfungsi

Amoxicillin dalam Synamox Capsules melawan bakteria dan menghentikan tumbesaran bakteria dengan menghalang kekuatan dan ketekalan dinding sel. Ini membunuh bakteria dan menolong merawat jangkitan.

Sebelum mengambil Synamox Capsules

- Bila tidak boleh diambil

Anda dilarang mengambil Synamox Capsules dan mesti rujuk doktor atau ahli farmasi jika anda:

- alah terhadap penisilin, antibiotik jenis penisilin termasuk antibiotik kumpulan beta-lactam atau bahan lain yang terkandung dalam produk ini seperti yang tersenarai di bahagian bawah risalah ini
- mengalami masalah buah pinggang dimana anda mungkin memerlukan dos yang lebih rendah
- mempunyai sejarah penyakit gastrousus terutama sekali kolitis ulceratif atau kolitis disebabkan oleh antibiotik (radang usus besar)
- mempunyai penyakit lain seperti leukemia atau jangkitan HIV dimana keadaan ini akan menyebabkan anda lebih berkemungkinan untuk mendapatkan ruam kulit

Hamil dan menyusukan bayi

Jika anda hamil, menyusukan bayi atau merancang untuk hamil, sila rujuk doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil apa-apa ubat.

Synamox Capsules hanya boleh digunakan apabila kelebihan melebihi risiko pengambilannya.

Amoxicillin boleh terbias ke dalam susu ibu dalam kuantiti yang sedikit. Synamox Capsules boleh diambil oleh ibu yang menyusukan bayi jika disarankan oleh doktor.

- Sebelum anda mula mengambil

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda mempunyai:

- Alahan kepada ubat-ubat lain, makanan, bahan pengawet atau pencelup
- Mana-mana penyakit yang tersenarai di atas

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi jika anda sedang atau telah

mengambil ubat-ubat lain, termasuk yang tidak mempunyai preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat-ubatan mungkin menyebabkan interaksi apabila diambil bersama Synamox Capsules termasuk:

- Antibakteria lain (antibiotik)
- Ubat probenecid dan allopurinol (ubat gout)
- Methotrexate (agen kemoterapi)
- Vaksin typhoid (vaksin demam kepialu)

Cara pengambilan Synamox Capsules

Sentiasa ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda berkaitan pengambilan Synamox Capsules. Jika anda musykil dengan arahan pada label, rujuk dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Ianya perlu diambil pada selang waktu yang tetap bergantung kepada arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak yang harus digunakan

Ikuti semua arahan doktor atau ahli farmasi dengan betul. Arahan mereka mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat pada risalah ini.

Jika anda musykil dengan arahan pada label, rujuk doktor atau ahli farmasi anda.

Dos bergantung kepada jangkitan dan keadaan jangkitan, sila rujuk sisip bungkusan Synamox Capsules untuk maklumat lanjut. Dos yang direkomendasikan adalah seperti berikut:

- **Dewasa:**
 - 250 mg setiap 8 jam; 500 mg setiap 8 atau 12 jam; 875 mg setiap 12 jam.

- **Kanak-kanak lebih tiga bulan:**
 - 25 mg/kg/hari dalam dos berbahagi setiap 12 jam.

- 20 mg/kg/hari dalam dos berbahagi setiap 8 jam.
- 40 mg/kg/hari dalam dos berbahagi setiap 8 jam.
- 45 mg/kg/hari dalam dos berbahagi setiap 12 jam.

• **Kanak-kanak/ bayi kurang tiga bulan:**

- 30 mg/kg/hari dalam dos berbahagi setiap 12 jam.

Bagi orang yang mempunyai penyakit jangkitan seksual (*Gonorrhoea*) perlu mendapatkan nasihat dari doktor atau ahli farmasi untuk pengambilan Synamox Capsules dengan ubat probenecid.

Dos untuk orang yang mempunyai masalah buah pinggang perlu disuakan mengikut tahap keseriusan penyakit. Sila dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda.

Perlu diingatkan bahawa antibiotik mesti dihabiskan walaupun anda telah merasa sihat. Ini adalah perlu bagi menghalang bakteria daripada membina ketahanan antibiotik. Jika anda tidak menhabiskan antibiotik, jangkitan mungkin berulang dan lebih payah untuk diubati.

- Bila perlu diambil

Ambil seperti mana arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Synamox Capsules boleh diambil semasa perut kosong atau perut penuh.

- Berapa lama perlu diambil

Ambil ubat ini selama mana arahan doktor atau ahli farmasi anda. Jika tiada perubahan, sila berjumpa doktor anda.

- Jika terlupa mengambilnya

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda ingat. Jika ianya sudah hampir waktu untuk pengambilan seterusnya, tunggu sahaja untuk pengambilan tersebut dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan

gandakan dos bagi menggantikan pengambilan yang tertinggal.

- Jika mengambil dos berlebihan

Antara simptom dos berlebihan ialah mual, muntah, cirit-birit dan pergerakan otot luar kawalan.

Amoxicillin yang diambil berlebihan juga boleh mengakibatkan *crystalluria* (urin keruh) dan mengakibatkan kegagalan buah pinggang.

Dos berlebihan boleh dirawat dengan pengambilan cecair, air dan bendalir yang mencukupi.

Jika anda atau orang lain telah ambil terlebih dos, dapatkan rawatan perubatan di Bahagian Kecemasan hospital berdekatan dengan segera.

Semasa mengambil Synamox Capsules

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat seperti mana arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Sekiranya anda ingin mendapatkan rawatan perubatan lain, maklumkan kepada semua doktor, doktor pergigian dan ahli farmasi yang anda sedang mengambil Synamox Capsules.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti ambil Synamox Capsules kecuali atas nasihat doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Synamox Capsules kepada orang lain walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti mana ubat-ubat lain, Synamox Capsules boleh menyebabkan kesan sampingan kepada sesetengah pengguna.

Kesan sampingan mungkin berbeza untuk setiap individu bergantung kepada keadaan medikal. Simptom-simptom termasuk:

- Cirit birit, mual, muntah
- Ruam kulit, gatal-gatal dan reaksi kulit
- Jangkitan kulat yang boleh mengakibatkan keradangan selepas pengambilan antibiotik
- Kurang sel darah putih dan darah merah dan pendarahan yang berpanjangan
- Alergi reaksi yang serius dan hipersensitiviti
- Kejang otot, pening dan pergerakan otot luar kawalan
- Hepatitis, halangan dalam perembesan hempedu
- Masalah buah pinggang dan urin keruh.

Synamox Capsules mungkin menyebabkan masalah alergi dan reaksi kulit yang teruk.

Berhenti pengambilan Synamox Capsules dan segera hubungi doktor anda jika anda mengalami simptom yang berikut:

- Reaksi alahan yang serius termasuk Reaksi Ubat bersama *Eosinophilia* dan simptom sistemik (DRESS). Permulaan simptom DRESS seperti simptom seakan-akan selsema dengan ruam di muka diikuti dengan ruam berpanjangan, suhu yang tinggi dan pembesaran kelenjar limfa.
- Kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak dan kerengsaan mata.

Maklumkan kepada doktor atau ahli farmasi dengan segera jika anda mengalami kesan sampingan lain selepas mengambil ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada

Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web nppra.moh.gov.my (Consumers → Reporting → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) /Vaccine (AEFI)).

Kapsul berwarna ungu dan putih legap, saiz no.0, berbau seakan penicillin. Serbuk kasar di dalam kapsul berwarna putih kekuningan.

**Cara penyimpanan dan pelupusan
Synamox Capsules**

- Penyimpanan

Simpan semua ubat-ubatan dari penglihatan dan jangkauan kanak-kanak.

Simpan ubat-ubatan di tempat yang kering dan dingin dan bersuhu di bawah 30°C.

Jauhi dari cahaya.

Jangan guna ubat ini selepas tarikh luput yang tertera di kotak. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir pada bulan tersebut.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan. Langkah-langkah ini boleh membantu melindungi alam sekitar.

- Bahan-bahan kandungan

Synamox Capsules 250mg

Bahan aktif:

Amoxicillin trihydrate

- Bahan tidak aktif

Sodium Lauryl Sulphate, Lactose, Magnesium Stearate, Talc.

Synamox Capsules 500mg

Bahan aktif:

Amoxicillin trihydrate

- Bahan tidak aktif

Sodium Lauryl Sulphate, Magnesium Stearate, Talc.

- Nombor MAL:

Synamox Capsules 250mg

MAL19890331AZ

Synamox Capsules 500mg

MAL198900332AZ

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Synamox Capsules 250mg

Kapsul yang bersih, kering, berbentuk seakan teleskop, bersinar, tidak comot atau melekat dengan kapsul lain. Tertera perkataan 'SYNAMOX 250mg'.

Kapsul berwarna ungu dan kelabu legap, saiz no.2, berbau seakan penicillin. Serbuk kasar di dalam kapsul berwarna putih kekuningan.

Pengilang

InspiraPharma Sdn Bhd (200401023395)

Lot 120, Taman Farmaseutikal,

32610 Bandar Seri Iskandar,

Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

InspiraPharma Sdn Bhd (200401023395)

Lot 24 & 25, Jalan 8, Kawasan

Perusahaan Bakar Arang,

08000 Sungai Petani,

Kedah Darul Aman, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

03/09/2026

Synamox Capsules 500mg

Kapsul yang bersih, kering, berbentuk seakan teleskop, bersinar, tidak comot atau melekat dengan kapsul lain. Tertera perkataan 'SYNAMOX 500mg'.

Nombor Siri

NPRA(R2/2)260828/00128