

PHARMANIAGA CO-AMOXICLAV SUSPENSION 228MG

Amoxycillin Trihydrate/Clavulanic acid (200mg/28.5mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension
2. Bagaimana Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension berfungsi
3. Sebelum menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension
4. Cara menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension

Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension digunakan pada kanak-kanak untuk merawat jangkitan bakteria berikut:

- jangkitan saluran pernafasan
- jangkitan kulit dan tisu lembut
- jangkitan saluran kencing
- jangkitan tulang dan sendi

Bagaimana Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension berfungsi

Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension mengandungi dua bahan aktif iaitu amoxicillin trihydrate dan clavulanic acid. Kedua-duanya adalah antibiotik yang berfungsi membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- anak anda mempunyai alahan atau pernah mengalami reaksi alahan yang teruk terhadap amoxicillin, clavulanic acid, antibiotic jenis penicilin atau cephalosporins atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- anak anda pernah mengalami masalah hati atau jaundis (kekuningan pada kulit dan/atau

putih mata) semasa mengambil ubat antibiotik.

- Sebelum mengambil Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika:

- anak anda menghadapi masalah hati atau buah pinggang
- mempunyai sejarah cirit-birit semasa atau selepas mengambil antibiotik
- anak anda kurang kencing

Jika anda tidak pasti sama ada anak anda mengalami mana-mana masalah tersebut, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anak anda sebelum mengambil Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anak anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anak anda mengambil ubat-ubatan berikut kerana ia boleh bertindak balas dengan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension:

- probenecid dan allopurinol (untuk merawat gout)
- perancang keluarga jenis oral
- ubat cair darah (seperti warfarin)
- mycophenolate mofetil (digunakan untuk mengelakkan penolakan selepas pemindahan organ)
- methotrexate (ubat digunakan untuk merawat kanser atau penyakit berkaitan sendi)

Cara menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension

- Berapa banyak harus diambil

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anak anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Untuk diambil secara oral sahaja.

Dos harian yang disyorkan:

Kanak-kanak lebih daripada 2 tahun

Jangkitan ringan hingga sederhana:

- i. 2 hingga 6 tahun (13 – 21kg) - 5mL Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension 2 kali sehari
- ii. 7 hingga 12 tahun (22 – 40kg) - 10mL Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension 2 kali sehari

Jangkitan serius:

2 hingga 6 tahun (13 – 21kg) - 5mL Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension 2 kali sehari

Kanak-kanak <2 tahun

Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension tidak disyorkan untuk kanak-kanak <2 bulan.

Bayi dengan fungsi buah pinggang yang belum matang

Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension tidak disyorkan untuk bayi yang mempunyai fungsi buah pinggang yang tidak matang.

Masalah buah pinggang

Bagi kanak-kanak dengan GFR >30mL/min, tiada pelarasan dos diperlukan. Bagi kanak-kanak dengan GFR <30mL / min, Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension tidak disyorkan.

Masalah hati

Jika anak anda mempunyai masalah hati, anak anda mungkin menjalani ujian darah yang lebih kerap untuk memeriksa bagaimana hati anda berfungsi. Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension tidak disyorkan bagi kanak-kanak dengan masalah hati.

- Bila perlu diambil

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Arahan untuk campuran:

Goncang botol sehingga serbuk terlerai. Tambah sedikit air masak yang telah disejukkan dan goncang dengan sekata. Tambahkan air sehingga mencecah ke paras isipadu seperti yang dinyatakan pada label.

PHARMANIAGA CO-AMOXICLAV SUSPENSION 228MG

Amoxycillin Trihydrate/Clavulanic acid (200mg/28.5mg)

Gunakan suspensi yang telah dibancuh dalam masa 7 hari. Simpan di dalam peti sejuk. Lengkapkan kursus yang ditetapkan.

- Berapa lama perlu diambil

Ambil ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Tempoh rawatan biasanya sehingga 14 hari. Jika keadaan anak anda bertambah teruk atau tiada perubahan dilihat, sila berjumpa doktor semula.

Ambil Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension sehingga rawatan selesai walaupun anak anda seperti telah pulih.

- Jika anda terlupa mengambil

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anak anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Penggunaan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension secara berlebihan mungkin menyebabkan ketidakselesaan perut, ketidakseimbangan elektrolit, pembentukan kristal dalam air kencing, masalah buah pinggang atau sawan.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anak anda bahawa anak anda sedang menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension.

Gunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anak anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika sebarang tindak balas kulit berlaku semasa mengambil ubat ini, berhenti mengambilnya dan jumpa doktor dengan segera.

Jika anak anda mengalami cirit-birit semasa mengambil ubat ini, atau selepas menghabiskan antibiotik, berhenti mengambilnya dan jumpa doktor dengan segera.

Ujian darah dan air kencing

Jika anak anda perlu menjalani ujian Coomb (ujian status sel darah merah), beritahu doktor atau jururawat bahawa anak anda sedang mengambil Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension, kerana ubat ini boleh menjejaskan keputusan ujian tersebut.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Berhenti menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension dan dapatkan bantuan perubatan jika anda mengalami simptom berikut:

- reaksi alahan yang serius seperti *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms* (DRESS). DRESS muncul pada mulanya sebagai simptom selesema dengan

ruam di muka dan merebak, suhu tinggi dan nodus limfa yang bengkak.

Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension boleh menyebabkan alahan yang teruk dan reaksi kulit yang serius. Berhenti menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala berikut:

- alahan yang teruk: kesukaran bernafas, pening, bengkak kulit atau ruam
- reaksi kulit yang teruk: kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Kesan sampingan yang sangat biasa dan biasa:

- cirit
- rasa loya
- muntah
- jangkitan kulat

Kesan sampingan yang tidak biasa:

- pening
- sakit kepala
- ketidakhadaman
- enzim hati meningkat
- ruam kulit
- kegatalan
- geligata

Kesan sampingan yang jarang dan sangat jarang berlaku:

- bacaan darah putih, darah merah dan platelet yang rendah
- bengkak kulit (*angioedema*)
- keradangan saluran darah yang mungkin kelihatan seperti tompok-tompok merah atau ungu yang timbul pada kulit (*hypersensitivity vasculitis*)
- terlebih aktif
- sawan
- lidah menjadi hitam dan berbulu
- keradangan hati dan jaundis (kekuningan kulit dan putih mata)
- keradangan tiub di buah pinggang
- kristal dalam air kencing

PHARMANIAGA CO-AMOXICLAV SUSPENSION 228MG

Amoxicillin Trihydrate/Clavulanic acid (200mg/28.5mg)

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anak anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Suspension

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Gunakan suspensi yang telah dibancuh dalam masa 7 hari. Goncang dahulu setiap kali sebelum digunakan.

Pastikan bekas ditutup dengan baik. Simpan di bawah suhu 30°C di tempat kering yang dingin. Lindungi daripada cahaya dan kelembapan. Simpan di dalam peti sejuk selepas dibancuh (2°C hingga 8°C).

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk berwarna putih hingga kekuningan dan menjadi suspensi berwarna putih hingga kekuningan dengan rasa buah-buahan setelah dilarutkan dengan air.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap 5mL mengandungi:

- amoxicillin trihydrate bersamaan dengan amoxicillin 200mg

- potassium clavulanate bersamaan dengan clavulanic acid 28.50mg

- Bahan tidak aktif

Succinic acid, xanthum gum, aspartame (powder), tutti frutti flavour, precipitated silicon dioxide and sucrose (castor).

- Nombor MAL
MAL20021372AZ

Pengilang

INSPIRAPHARMA SDN BHD
(200401023395)
Lot 120, Taman Farmaseutikal,
32610 Bandar Seri Iskandar,
Perak, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

INSPIRAPHARMA SDN BHD
(200401023395)
Lot 24 & 25, Jalan 8, Kawasan
Perusahaan Bakar Arang, 08000
Sungai Petani, Kedah Darul
Aman, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

10/03/2026

Nombor Siri

NPRA(R4/1)191118/00338