

PHARMANIAGA CO-AMOXICLAV TABLET

Amoxicillin Trihydrate/Clavulanic acid (500mg/125mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet
2. Bagaimana Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet
4. Cara menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet
5. Semasa menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet

Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet digunakan untuk merawat jangkitan bakteria berikut:

- jangkitan saluran pernafasan
- jangkitan kulit dan tisu lembut
- jangkitan saluran kencing
- jangkitan tulang dan sendi

Bagaimana Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet berfungsi

Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet mengandungi dua bahan aktif iaitu amoxicillin trihydrate dan clavulanic acid. Kedua-duanya adalah antibiotik yang berfungsi membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda mempunyai alahan atau pernah mengalami reaksi alahan yang teruk terhadap amoxicillin, clavulanic acid, antibiotik jenis penicillin atau cephalosporin atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Maklumat lanjut).
- anda pernah mengalami masalah hati atau jaundis (kekuningan pada kulit dan/atau putih mata) semasa mengambil ubat antibiotik.

- Sebelum mengambil Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika:

- anda menghidap masalah hati atau buah pinggang
- mempunyai sejarah cirit-birit semasa atau selepas mengambil antibiotik
- anda kurang kencing

Jika anda tidak pasti sama ada anda mengalami mana-mana masalah tersebut, rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat-ubatan berikut kerana ia boleh bertindak balas dengan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet:

- probenecid dan allopurinol (untuk merawat gout)
- perancang keluarga jenis oral
- ubat cair darah (seperti warfarin)
- mycophenolate mofetil (digunakan untuk mengelakkan penolakan selepas pemindahan organ)
- methotrexate (ubat digunakan untuk merawat kanser atau penyakit berkaitan sendi)

Cara menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet

- Berapa banyak harus diambil

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Untuk diambil secara oral sahaja.

Dewasa dan kanak-kanak berumur lebih daripada 12 tahun

Jangkitan ringan hingga sederhana: Satu tablet diambil dua kali sehari.

Masalah buah pinggang dan hati

Jika anda mempunyai masalah buah pinggang, doktor anda akan melaraskan kekerapan dos anda. Jika anda mempunyai masalah hati, anda mungkin memerlukan ujian darah yang lebih kerap untuk memeriksa fungsi hati anda.

- Bila perlu diambil

Ambil 2 kali sehari atau seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Telan tablet dengan segelas air sejurus sebelum anda mula makan. Jangan kunyah atau potong tablet tersebut.

- Berapa lama perlu diambil

Ambil ubat ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Tempoh rawatan biasanya sehingga 14 hari. Jika keadaan anda bertambah teruk atau tiada perubahan dilihat, sila berjumpa doktor semula.

Ambil Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet sehingga rawatan selesai, walaupun anda rasa seperti telah pulih.

- Jika anda terlupa mengambil

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

PHARMANIAGA CO-AMOXICLAV TABLET

Amoxycillin Trihydrate/Clavulanic acid (500mg/125mg)

Penggunaan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan ketidakselesaan perut, ketidakseimbangan elektrolit, pembentukan kristal dalam air kencing, masalah buah pinggang atau sawan.

Semasa menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengandung semasa mengambil ubat ini.

Gunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet hanya dengan preskripsi doktor.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera
Berhati-hati semasa memandu atau menggunakan jentera sehingga anda mengetahui tentang kesan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet terhadap anda.

Jika sebarang tindak balas kulit berlaku semasa mengambil ubat ini, berhenti mengambilnya dan jumpa doktor dengan segera.

Jika anda mengalami cirit-birit semasa mengambil ubat ini, atau selepas menghabiskan antibiotik, berhenti mengambilnya dan jumpa doktor dengan segera.

Ujian darah dan air kencing

Jika anda perlu menjalani ujian Coomb (ujian status sel darah merah), beritahu doktor atau jururawat bahawa anda sedang mengambil Pharmaniaga

Co-Amoxiclav Tablet, kerana ubat ini boleh menjejaskan keputusan ujian tersebut.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Berhenti menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet dan dapatkan bantuan perubatan jika anda mengalami simptom berikut:

- reaksi alahan yang serius seperti *Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms* (DRESS). DRESS muncul pada mulanya sebagai simptom selesema dengan ruam di muka dan merebak, suhu tinggi dan nodus limfa yang bengkak.

Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet boleh menyebabkan alahan yang teruk dan reaksi kulit yang serius. Berhenti menggunakan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala berikut:

- alahan yang teruk: kesukaran bernafas, pening, bengkak kulit atau ruam
- reaksi kulit yang teruk: kulit kemerahan, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata

Kesan sampingan yang sangat biasa dan biasa:

- cirit
- rasa loya
- muntah
- jangkitan kulat

Kesan sampingan yang tidak biasa:

- pening
- sakit kepala
- ketidakhadaman
- enzim hati meningkat
- ruam kulit
- kegatalan
- geligata

Kesan sampingan yang jarang dan sangat jarang berlaku:

- bacaan darah putih, darah merah dan platelet yang rendah
- bengkak kulit (*angioedema*)
- keradangan saluran darah yang mungkin kelihatan seperti tompok-tompok merah atau ungu yang timbul pada kulit (*hypersensitivity vasculitis*)
- terlebih aktif
- sawan
- lidah menjadi hitam dan berbulu
- keradangan hati dan jaundis (kekuningan kulit dan putih mata)
- keradangan tiub di buah pinggang
- kristal dalam air kencing

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Pharmaniaga Co-Amoxiclav Tablet

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C dan simpan baki tablet dalam pembungkusan asal selepas dibuka. Gunakan dalam masa 30 hari selepas pembungkusan dibuka.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bersalut filem berwarna putih atau putih pudar, dengan bentuk bujur yang kosong pada satu sisi dan diukir dengan "RMB" pada sisi lain.

PHARMANIAGA CO-AMOXICLAV TABLET

Amoxicillin Trihydrate/Clavulanic acid (500mg/125mg)

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Setiap tablet mengandungi:

- amoxicillin trihydrate bersamaan dengan amoxicillin 500mg
- potassium clavulanate bersamaan dengan clavulanic acid 125mg

- Bahan tidak aktif

Microcrystalline cellulose, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, plasdone, croscarmellose sodium dan opadry white.

- Nombor MAL

MAL20013767AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd
Lot 120, Taman Farmaseutikal, 32610
Bandar Sri Iskandar, Perak Darul
Ridzuan, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

8/8/2024

Nombor Siri

NPRA(R4/1)070824/00105