

CLOXACILLA POWDER FOR SYRUP 125MG/5ML

Cloxacillin (125mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Cloxacilla PFOS
2. Bagaimana Cloxacilla PFOS berfungsi
3. Sebelum menggunakan Cloxacilla PFOS
4. Cara menggunakan Cloxacilla PFOS
5. Semasa menggunakan Cloxacilla PFOS
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Cloxacilla PFOS

Cloxacillin adalah dari satu kumpulan antibiotik yang dipanggil penisilin. Cloxacilla PFOS mengandungi bahan aktif, Cloxacillin. Ia digunakan untuk merawat jangkitan Staphylococci yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap benzylpenisilin. Ia juga digunakan untuk jangkitan kulit yang mempunyai daya ketahanan yang tinggi terhadap penicillin seperti jangkitan *Streptococcal* dan *Staphylococcal*.

Bagaimana Cloxacilla PFOS berfungsi

Cloxacilla PFOS bertindak dengan menghalang proses sintesis dinding sel bakteria dan seterusnya membunuh bakteria tersebut.

Sebelum menggunakan Cloxacilla PFOS

-Bila tidak boleh menggunakan

Jangan menggunakan Cloxacilla PFOS jika:

- anda alah kepada cloxacillin atau mempunyai sejarah alahan terhadap kumpulan ubat penisillin atau cephalosporin.

-Sebelum mula menggunakan Cloxacilla PFOS

Beritahu doktor anda sebelum mengambil Cloxacilla PFOS jika anda mengalami keadaan-keadaan yang berikut:

- Reaksi hipersensitiviti terhadap penisillin, cephalosporin,

carbapenem atau ubat kumpulan beta-lactam.

- masalah buah pinggang dan hati
- asma
- sejarah masalah kekejangan
- gangguan *Phenylketonuric*

Mengandung dan menyusukan bayi

Cloxacilla PFOS perlu digunakan dengan berhati-hati bagi bayi, ibu yang mengandung dan ibu yang menyusukan bayi.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor jika anda sedang atau telah mengambil ubat-ubat lain, termasuk yang tidak mempunyai preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat dan Cloxacilla PFOS boleh bertindak balas satu sama lain. Ini termasuklah:

- *aminoglycosides*, *tetracycline*, dan ubat antimikrobial yang lain
- ubat oral pencegahan kehamilan
- ubat probenecid
- ubat untuk mencegah barah beku
- methotrexate (ubat anti-reumatik)
- mycophenolate (ubat untuk mencegah penolakan pemindahan organ)
- suntikan BCG dan vaksin typhoid
- sodium picosulfate (julat)
- *entecavir*, *pemetrexed*, *proguanil*
- *guar gum*
- *sodium iodide I-123 & I-131*

Cara menggunakan Cloxacilla PFOS

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa mengambil Cloxacilla PFOS seperti yang disarankan oleh doktor anda. Ianya mungkin berbeza dengan maklumat yang terdapat dalam risalah ini. Dapatkan bantuan daripada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti mengenai arahan yang terdapat di dalam label.

Dos bagi kanak-kanak sehingga umur 2 tahun: 62.5 -125 mg pada setiap 6 jam.

Dos bagi kanak-kanak antara umur 2 -10 tahun: 125 – 250 mg pada setiap 6 jam.

Arahan untuk penyediaan Cloxacilla PFOS:

Masukkan sedikit air dan goncang sehingga larut. Perlahan-lahan masukkan air sehingga tanda pada botol/label dan goncang sehingga larut.

-Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi.

Cloxacilla PFOS perlu diambil ketika perut kosong, setengah atau sejam sebelum makan.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan Cloxacilla PFOS untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda. Sila rujuk doktor anda sekiranya tiada penambahbaikan dari penggunaan Cloxacilla PFOS.

-Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Gejala dos berlebihan adalah termasuk simptom neurotoksik (seperti myoclonia, sawan dan hilang sedar), gangguan saluran gastrousus, fungsi hati dan buah pinggang terjejas, cirit-birit dan kepekatan air kencing.

Jika anda merasakan anda atau orang lain telah ambil berlebihan dos, hubungi doktor anda dengan segera dan dapatkan rawatan perubatan di Bahagian Kecemasan hospital berdekatan dengan segera. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Cloxacilla PFOS

-Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat mengikut arahan doktor atau ahli farmasi.

Jika anda memerlukan rawatan perubatan yang lain, maklumkan kepada doktor, doktor gigi atau ahli farmasi yang ada mengambil Cloxacilla PFOS.

Beritahu doktor dengan segera jika anda mempunyai apa-apa alahan apabila mengambil Cloxacilla PFOS.

Teruskan penggunaan ubat untuk tempoh yang ditetapkan walaupun anda telah berasa sembuh. Jika jangkitan anda menjadi lebih teruk atau anda tidak sembuh dalam masa beberapa hari atau jangkitan baru berlaku, berjumpa dengan doktor anda.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan berkongsi Cloxacilla PFOS dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda hamil, cuba untuk hamil atau sedang menyusukan bayi, anda tidak disarankan mengambil Cloxacilla PFOS tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Cloxacilla PFOS mungkin memberi kesan kepada kemampuan anda untuk memandu atau menggunakan jentera. Jika anda merasa tidak sihat, pening, penat atau sakit kepala, jangan memandu atau menggunakan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Cloxacilla PFOS mungkin mengakibatkan alahan reaksi yang teruk dan reaksi kulit yang serius. Berhenti menggunakan Cloxacilla PFOS dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami simptom yang berikut: kemerahan kulit, lepuh, ruam, demam, sakit tekak atau kerengsaan mata.

Berhenti mengambil Cloxacilla PFOS and hubungi doktor anda dengan segera jika anda mengalami reaksi alahan yang serius seperti *Drug Reaction with Eosinophillia and Systemic Symptoms*

(DRESS). DRESS pada mulanya muncul seperti simptom selsema dengan kehadiran ruam pada muka dan ruma merebak, suhu yang tinggi dan pembesaran nod limpa.

Sesetengah pengguna mungkin akan mengalami mana-mana kesan sampingan berikut walaupun tidak semua mendapatkannya:

- reaksi hipersensitiviti seperti eosinophilia, gatal-gatal kulit yang teruk, reaksi alahan seperti ruam, kegatalan pada kulit, berdehit, dan bersin
- sel darah merah rendah (*haemolytic anaemia*), Sel darah putih rendah (*leukopenia*, *transient neutropenia* *granulocytopenia* dan *agranulocytosis*), rendah kiraan platelet (*thrombocytopenia*)
- keradangan buah pinggan (*nephritis*) dan kadar urea yang tinggi dalam darah (*azotemia*)
- fungsi hati yang terjejas (*intrahepatic cholestasis*)
- gangguan gastrousus seperti mual dan muntah, ketidakselesaan epigastrik, kembung perut, najis yang tidak normal.

Jika mana-mana kesan sampingan menjadi lebih serius, atau jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan yang tidak disenaraikan di dalam risalah ini, beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan

-Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Serbuk Cloxacilla PFOS tidak perlu disejukkan dalam peti sejuk sehingga ianya dibancuh. Setelah ia dibancuh, simpan di peti sejuk dan habiskan dalam masa 7 hari.

Jauhkan ubat daripada kanak-kanak.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh tamat tempoh seperti yang dicetak pada pek pembungkusan.

-Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Rujuk kepada ahli farmasi mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Serbuk seakan merah jambu sehingga merah pudar dan setelah dibancuh menjadi cecair sirap bewarna oren beserta aroma buah oren dan nenas.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif:

Setiap 5 ml bancuhan mengandungi Cloxacillin Sodium bersamaan dengan Cloxacillin 125mg.

-Bahan tidak aktif:

Castor Sugar, Disodium EDTA, Aspartame, Sodium Citrate, Povidone K30, Orange Flavour, Pineapple Flavour & Sunset Yellow.

- Nombor MAL

MAL06111328AZ

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk

Idaman Pharma Manufacturing Sdn. Bhd (200401023395), Lot 120, Taman Farmaseutikal, 32610 Bandar Seri Iskandar, Perak, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

17/05/2022

Nombor Siri

NPRA(R2/2)200601/448