

IDAMOL TABLET 500MG

Paracetamol (500mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan IDAMOL
2. Bagaimana IDAMOL berfungsi
3. Sebelum mula mengambil IDAMOL
4. Cara menggunakan IDAMOL
5. Semasa menggunakan IDAMOL
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara Penyimpanan dan Pelupusan IDAMOL
8. Maklumat lanjut
9. Pemegang Pendaftaran Produk dan Pengilang
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan IDAMOL

IDAMOL digunakan untuk melegakan kesakitan ringan dan sederhana. Ini termasuk sakit kepala, sakit gigi, sakit tekak dan sakit perut. Ia juga boleh digunakan untuk mengurangkan demam.

Bagaimana IDAMOL berfungsi

Paracetamol berfungsi sebagai ubat penahan sakit dengan menjejaskan bahan kimia di dalam badan yang dipanggil prostaglandin. Prostaglandin adalah bahan yang dikeluarkan untuk bertindak balas terhadap penyakit atau kecederaan. Paracetamol menghalang pengeluaran prostaglandin dan membuat badan kurang peka terhadap sakit atau cedera. Paracetamol dapat mengurangkan suhu dengan bertindak di kawasan otak yang bertanggungjawab dalam mengawal suhu.

Sebelum mula mengambil IDAMOL

- Bila tidak boleh mengambil

Tidak boleh diambil untuk orang yang mempunyai alahan terhadap *paracetamol* atau bahan-bahan lain yang disenaraikan di akhir risalah ini.

Tidak boleh diambil kepada yang mempunyai penyakit hati yang kritikal dan teruk.

Mengandung dan menyusukan anak

Sila dapatkan nasihat daripada doktor anda sebelum mengambil IDAMOL jika anda mengandung atau mungkin mengandung. Ianya boleh dipertimbangkan sebagai pilihan analgesik ketika mengandung dan ianya

dikategorikan selamat walaupun mampu melepasi plasenta.

Sila rujuk kepada ahli farmasi anda jika anda menyusukan bayi memandangkan paracetamol mampu dirembeskan kedalam susu ibu.

Dapatkan nasihat daripada doktor anda atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat-ubatan.

- Sebelum mula mengambil

Perhatian perlu diambil sekiranya anda mempunyai kebergantungan terhadap alkohol, masalah hati dan buah pinggang yang kronik semasa mengambil IDAMOL.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat-ubatan lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat-ubatan mungkin mempunyai interaksi jika diambil bersama IDAMOL. Ini termasuk:

- Warfarin (ubat untuk mencegah pembekuan darah)
- Ubat antikoagulan yang lain termasuk Coumarin.

Cara menggunakan IDAMOL

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi :

Dos:

Dewasa: 1 hingga 2 tablet diambil setiap 4 ke 6 jam, maksima 8 tablet sehari.

Kanak-kanak (6-11 tahun): ½ hingga 1 tablet diambil setiap 4 ke 6 jam bila diperlukan.

Maksimum had harian: 600 mg/kg dalam dos berbahagi 10-15 mg/kg dalam masa 24 jam.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa untuk menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan berlebihan mungkin mengakibatkan kerosakan hati yang serius.

Semasa menggunakan IDAMOL

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mula megambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi IDAMOL dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

Persediaan ini mengandungi 'PARACETAMOL'. Jangan mengambil ubat-ubatan lain yang mengandungi *paracetamol* pada masa yang sama.

Paracetamol (500mg)

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Jika anda hamil atau sedang menyusukan bayi, jangan ambil IDAMOL tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Amaran alahan: Paracetamol boleh menyebabkan alahan kulit yang teruk. Gejala boleh termasuk kulit kemerahan, lepuh atau ruam.

Ini boleh menjadi tanda-tanda keadaan serius. Jika tindak balas ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan segera.

Kesan-kesan Sampingan

Kesan sampingan selalunya jarang dan tidak serius, walaubagaimanapun reaksi hematologi dilaporkan.

Tindak balas hipersensitiviti kulit termasuk ruam kulit, angioedema, Steven Johnson Syndrome/ Toxic Epidermal Necrolysis telah dilaporkan.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my (*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan IDAMOL

- Penyimpanan

Simpan di tempat yang kering, bawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet bersih, kering, berbentuk bulat dengan tanda belahan pada satu permukaanya dan berwarna putih.

- Bahan bahan kandungan

Bahan aktif :

Paracetamol 500mg

Bahan tidak aktif:

Corn starch

Pregelatinized starch

Povidone

Sodium carboxymethyl starch

Stearic acid

Nombor MAL

MAL20036150XZ

Pemegang Pendaftaran Produk dan Pengilang

InspiraPharma Sdn Bhd (200401023395)

Lot 24 & 25, Jalan 8,

Kawasan Perusahaan Bakar Arang,

08000 Sungai Petani,

Kedah Darul Aman, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

06/07/2026

Nombor Siri

NPRA (R2) 19/211