

ACTIMOL SUSPENSION 250MG/5ML

Paracetamol (250mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ActiMol Suspension
2. Bagaimana ActiMol Suspension
3. Sebelum menggunakan ActiMol Suspension
4. Cara menggunakan ActiMol Suspension
5. Semasa menggunakan ActiMol Suspension
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ActiMol Suspension
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan ActiMol Suspension

ActiMol Suspension digunakan untuk melegakan demam termasuk demam selepas vaksinasi, selain merawat sakit kepala dan gejala selesema dan selesema. Selain itu, ia juga mengurangkan kesakitan sakit gigi dan ketidakselesaan gigi.

Bagaimana ActiMol Suspension berfungsi

ActiMol Suspension berfungsi sebagai analgesik (melegakan kesakitan) dan antipiretik (anti-demam) dengan sifat anti-radang yang minimum.

Sebelum menggunakan ActiMol Suspension

Ubat ini mengandungi PARACETAMOL.
Dilarang mengambil ubatan lain yang mengandungi PARACETAMOL dalam masa yang sama.

Amaran alergi: Paracetamol boleh menyebabkan reaksi kulit yang teruk. Gejala mungkin termasuk kemerahan kulit, lepuh atau ruam. Ini mungkin tanda-tanda keadaan serius. Sekiranya reaksi ini berlaku, hentikan penggunaan dan dapatkan bantuan perubatan dengan segera.

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ActiMol Suspension dan berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika:

- anda alah kepada Paracetamol atau bahan lain di dalamnya
- anda tidak pasti jika anda perlu mula mengambil ubat ini.

-Sebelum mula menggunakan ActiMol Suspension

Beritahu doktor jika:

- anda alah kepada Paracetamol.
- anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati.

ActiMol Suspension perlu diberikan dengan berhati-hati kepada pesakit dengan masalah buah pinggang atau hati. ActiMol Suspension juga perlu diberikan dengan berhati-hati kepada pesakit yang mengambil ubat-ubatan lain yang memberi kesan kepada hati.

Mengandung dan menyusukan anak

Produk ini adalah untuk digunakan pada kanak-kanak.

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan bayi sebelum mengambil ubat ini.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda ubat-ubatan yang anda ambil termasuklah semua ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan lain. Kesan-kesan beberapa ubat-ubatan mungkin terjejas sekiranya ubat-ubatan lain digunakan pada masa yang sama.

Jangan mengambil ubat-ubatan lain yang mengandungi Paracetamol pada masa yang sama.

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan ActiMol Suspension dengan kombinasi ubat yang berikut:

- Ubat antikoagulan (menghalang darah beku) seperti *warfarin* dan *coumarin*.
- Ubat pencetus enzim hati seperti *barbiturates*, antidepresen trisiklik dan alkohol.
- *Metoclopramide* atau *domperidone* (untuk merawat dan mengelakkan loya dan muntah).
- Ubat antiviral (untuk merawat jangkitan virus), *cholestyramine* (untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah).
- Antikonvulsan (untuk merawat serangan epilepsi) dan pil perancang (pil kawalan kelahiran).

Cara menggunakan ActiMol Suspension

Sentiasa mengambil ubat ini sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Baca arahan pada label dengan teliti. Periksa dengan doktor atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan.

- Berapa banyak harus digunakan

ACTIMOL SUSPENSION 250MG/5ML

Paracetamol (250mg/5ml)

Doktor anda akan menasihati anda tentang berapa banyak yang harus digunakan untuk setiap satu hari dan untuk berapa lama anda perlu menggunakannya. Ini bergantung kepada keadaan anda dan bergantung jika anda ada mengambil ubat-ubatan yang lain atau tidak.

Berikut merupakan dos yang digalakkan untuk digunakan:

Untuk dos yang tepat, timbang berat anak anda dan tentukan dos yang akan diberikan berdasarkan 15 mg Paracetamol untuk setiap kg berat badan.

Untuk ActiMol Suspension 250mg/5ml, Dos:

$$\frac{\text{BW (kg)} \times 15 \text{ mg} \times 5 \text{ ml}}{250 \text{ mg}}$$

Contoh dos mengikut berat:

BERAT (kg)	DOS (ml)
12 – 13 kg	3 ml
14 – 16 kg	4 ml
17 – 19 kg	5 ml
20 -23 kg	6 ml
24 – 26 kg	7 ml
27- 29 kg	8 ml
30 – 33 kg	9 ml
34 – 39 kg	10 ml
40 – 42 kg	12 ml

Tidak digalakkan untuk kanak-kanak di bawah 1 bulan.

Bagi kanak-kanak di bawah 3 bulan, jika demam berterusan lebih daripada 24 jam (4 dos), dapatkan nasihat perubatan. Ini adalah untuk memastikan bahawa demam yang mungkin disebabkan oleh jangkitan yang serius dapat didiagnosis dengan segera.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan pada label dengan berhati-hati dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan mengambil ubat lebih dari 4 kali dalam masa 24 jam dan jangan melebihi dos melainkan ditetapkan oleh doktor atau ahli farmasi.

- Berapa lama perlu digunakan

Ikut arahan pada label dengan berhati-hati dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Tanya doktor atau ahli farmasi anda mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa mengambil ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan ambil ubat itu pada masa yang dijadualkan seterusnya.

Jangan mengambil ubat tambahan untuk menggantikan dos yang tertinggal. Ini boleh meningkatkan peluang anda mendapat kesan-kesan sampingan yang tidak diingini.

- Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Dapatkan bantuan perubatan kecemasan jika anda fikir anda telah mengambil ubat ini terlalu banyak walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan yang segera.

Gejala pengambilan ActiMol Suspension yang berlebihan

termasuklah muntah, sakit perut, tekanan darah rendah, pucat dan berpeluh. Kesan yang paling serius dari pengambilan yang berlebihan akut adalah kegagalan organ hati yang boleh menyebabkan kematian.

Semasa menggunakan ActiMol Suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat ini mengikut arahan doktor.

- Beritahu doktor dan ahli farmasi jika anda alah kepada Paracetamol.
- Beritahu doktor anda dan ahli farmasi apa ubat-ubatan preskripsi dan bukan preskripsi yang anda ambil.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil ActiMol Suspension.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda telah hamil semasa mengambil ubat ini.
- Anda seharusnya menghubungi doktor atau ahli farmasi anda jika simptom berlarutan (jika kesakitan itu berlarutan sehingga lebih 10 hari, jika terdapat kemerahan atau demam yang berlarutan sehingga 3 hari).

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berkongsi ActiMol Suspension dengan orang lain, walaupun tanda-tanda mereka kelihatan serupa dengan anda.

Jangan mengambil ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

ACTIMOL SUSPENSION 250MG/5ML

Paracetamol (250mg/5ml)

Jangan mengambil minuman beralkohol dengan ActiMol Suspension.

Elakkan penggunaan yang berpanjangan dengan dos yang tinggi.

Memandu dan mengendalikan mesin: ActiMol Suspension tidak memberikan kesan signifikan pada keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan mesin. Jika ubat ini menyebabkan anda sakit, rasa pening atau kesakitan kepala, jangan memandu atau mengendalikan mesin. Hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ActiMol Suspension boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda mungkin ada.

Kesan-kesan sampingan ActiMol Suspension biasanya tidak serius, walaupun reaksi hematologi pernah dilaporkan.

Kesan penting seperti kiraan platelet rendah, sel darah putih yang rendah, kiraan neutrofil yang rendah, sel darah merah dan putih yang rendah serta kiraan platelet, menghasilkan jumlah methemoglobin yang tidak normal, sel darah putih yang sangat rendah dan bengkak di permukaan bawah kulit.

Sementara itu, kesan sampingan yang jarang berlaku ialah tekanan darah rendah dan degupan jantung yang cepat. Untuk kesan sampingan pada gangguan perut dan usus adalah loya, muntah dan sembelit.

Untuk kesan sampingan pada gangguan sistem saraf adalah sakit kepala. Untuk kesan sampingan pada gangguan psikiatri adalah masalah tidur. Untuk kesan sampingan pada gangguan kulit dan tisu bahagian bawah kulit adalah kemerahan kulit dan kulit gatal. Untuk kesan sampingan yang berpotensi membawa maut adalah kerosakan hati dan kecederaan buah pinggang.

Reaksi hipersensitiviti kulit yang lain termasuklah ruam kulit, bengkak di permukaan bawah kulit (angioedema) dan sindrom *Stevens Johnson / Toxic Epidermal Necrolysis* juga telah dilaporkan.

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas boleh berlaku pada sesetengah pesakit. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati apa-apa yang membuat anda berasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan ActiMol Suspension

- Penyimpanan

Jauhi ubat-ubatan dari jangkauan kanak-kanak.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang diterterakan pada pek bungkusan.

Simpan dalam bekas yang tertutup rapat di tempat yang kering, di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya.

Buang selepas 2 bulan pertama pembukaan.

- Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair likat berwarna oren dengan rasa manis dan masam oren.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif:

Setiap 5ml mengandungi Paracetamol 250mg.

- Bahan tidak aktif:

Methylparaben, Propylparaben, Saccharin Sodium, Xanthan Gum, Sugar Granular, Glycerin, Propylene Glycol, Color FDC Yellow, Orange Flavour Sol. Sweet, Carboxymethylcellulose Sodium, Microcrystalline Cellulose, Sorbitol, Menthol Crystal, Citric Acid Monohydrate, Sodium Citrate, dan Purified Water.

ACTIMOL SUSPENSION 250MG/5ML

Paracetamol (250mg/5ml)

- Nombor MAL:

MAL20046151XZ

Pengilang

Idaman Pharma Manufacturing Sdn
Bhd (661901-P)
Lot 24 & 25, Jalan Perusahaan Lapan,
Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani, Kedah Darul
Aman, Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk

Idaman Pharma Manufacturing Sdn
Bhd (200401023395)
Lot 24 & 25, Jalan Perusahaan Lapan,
Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani, Kedah Darul
Aman, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

02/10/2023

Nombor Siri

NPRA (R2) 19/216