CITREX COUGH SYRUP 100MG/5ML

Guaifenesin (100mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Citrex Cough Syrup
2. Bagaimana Citrex Cough Syrup berfungsi
3. Sebelum menggunakan Citrex Cough Syrup
4. Cara menggunakan Citrex Cough Syrup
5. Semasa menggunakan Citrex Cough Syrup
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Citrex Cough Syrup
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang & Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RIMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan Citrex Cough Syrup

Citrex Cough Syrup digunakan untuk melegakan batuk yang menyesakkan dada, mengurangkan kahak dan menipiskan rembesan di bronkial.

Bagaimana Citrex Cough Syrup berfungsi

Citrex Cough Syrup berfungsi sebagai ekspektoran yang mengganggu lapisan membran mukus di bahagian perut dan seterusnya, merangsang rembesan di saluran pernafasan. Dengan meningkatkan kandungan air kahak, ianya akan mengurangkan ketebalan rembesan bronkial.

Sebelum menggunakan Citrex Cough Syrup

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Citrex Cough Syrup jika anda alah kepada Guaifenesin.

Jangan ambil Citrex Cough Syrup jika anda hamil, sedang merancang untuk hamil atau mungkin hamil tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Jangan ambil Citrex Cough Syrup jika anda sedang menyusukan bayi.

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi terlebih dahulu sebelum mengambil ubat ini.

- Sebelum mula menggunakan Citrex Cough Syrup

Beritahu doktor jika anda alah kepada Guaifenesin.

Doktor anda perlu tahu jika anda mempunyai masalah buah pinggang atau hati. Citrex Cough Syrup perlu diberikan dengan berhati-hati kepada pesakit dengan masalah buah pinggang atau hati.

Selain itu, bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil ubat ini jika perkara berikut berlaku:

- Batuk berterusan selama lebih dari 7 hari atau batuk yang berlaku berulang kali atau disertai oleh demam, ruam atau sakit kepala yang berterusan.
- Batuk berterusan yang mungkin disebabkan oleh asma.
- Batuk yang membawa banyak lendir.

Bincang dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang hamil atau menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda ubat-ubatan yang anda ambil termasuklah semua ubat-ubatan yang anda beli tanpa preskripsi dari kedai farmasi, supermarket, atau kedai makanan kesihatan lain. Kesan-kesan beberapa ubat-ubatan mungkin terjejas sekiranya ubat-ubatan lain digunakan pada masa yang sama.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil Guaifenesin dengan kombinasi ubat penahan batuk lain pada masa yang sama.

Guaifenensin telah terbukti menghasilkan gangguan warna dalam makmal klinikal bagi penentuan ujian air kencing (asid 5-hydroxyindoleacetic (5-HIAA) dan asid vanillylmandelic (VMA)). Selain itu, ia juga boleh mengganggu diagnosis sindrom carcinoid (tumor yang berkembang secara perlahan).

Cara menggunakan Citrex Cough Syrup

Sentiasa mengambil ubat ini sepertimana yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda. Baca arahan pada label dengan teliti. Periksa dengan doktor atau ahli farmasi sekiranya anda tidak pasti.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disyorkan.

- Berapa banyak harus digunakan

Doktor anda akan menasihatkan dos yang diperlukan setiap hari dan tempoh pengambilan ubat ini. Ini bergantung kepada keadaan anda dan sama ada atau tidak anda mengambil mana-mana ubat-ubatan lain.

Kanak-Kanak: Bawah dari 2 tahun: Tidak digalakkan;
Kanak-Kanak: 2 tahun hingga 6 tahun: 2.5mL;
Kanak-Kanak: 6 tahun hingga 12 tahun: 5mL;
Dewasa dan Kanak-Kanak berumur lebih dari 12 tahun: 10 mL.

Ianya perlu diambil tidak melebihi 4 kali sehari.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan pada label dengan berhati-hati dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Ikut arahan pada label dengan berhati-hati dan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika terlupa menggunakan

Tanya doktor atau ahli farmasi anda mengenai apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa mengambil ubat ini.

CITREX COUGH SYRUP 100MG/5ML

Guaifenesin (100mg/5ml)

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Jika ia hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan ambil ubat itu pada masa yang dijadualkan seterusnya.

Jangan mengambil ubat tambahan untuk menggantikan dos yang tertinggal. Ini boleh meningkatkan peluang anda mendapat kesan-kesan sampingan yang tidak diingini.

- *Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)*

Dapatkan bantuan perubatan kecemasan jika anda fikir anda telah mengambil ubat ini terlalu banyak walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan yang segera.

Kesan dari ketoksikan akut Guaifenesin termasuklah ketidakselesaan perut dan usus, keinginan yang kuat untuk muntah, mengantuk, lesu dan juga, muntah. Apabila diambil secara berlebihan, Guafesin juga boleh menyebabkan penyakit batu karang.

Semasa menggunakan Citrex Cough Syrup

- *Perkara yang perlu dilakukan*

Ambil ubat ini mengikut arahan doktor.

- Beritahu doktor dan ahli farmasi jika anda alah kepada Guaifenesin.
- Beritahu doktor anda dan ahli farmasi apa ubat-ubatan preskripsi dan bukan preskripsi yang anda ambil.
- Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil Citrex Cough Syrup.
- Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa mengambil ubat ini.

- *Perkara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berkongsi Citrex Cough Syrup dengan orang lain, walaupun tanda- tanda mereka kelihatan serupa dengan anda.

Jangan mengambil ubat ini untuk merawat sebarang aduan lain melainkan jika diarahkan oelh doktor atau ahli farmasi anda.

- *Perkara yang perlu diberi perhatian* Jika anda hamil atau sedang menyusukan bayi, jangan ambil Citrex Cough Syrup tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda terlebih dahulu.

Citrex Cough Syrup tidak mempengaruhi atau mempunyai pengaruh yang kecil dalam keupayaan memandu atau mengendalikan jentera. Walau bagaimanapun, jika pesakit berasa tidak sihat, jangan memandu atau menggunakan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Citrex Cough Syrup boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil ubat ini.

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk menjawab apa-apa soalan yang anda mungkin ada.

Kesan sampingan Guaifenesin yang tidak sering dilaporkan apabila digunakan dalam dos yang tinggi adalah ketidakselesaan perut dan uss, keinginan yang kuat untuk muntah dan muntah.

Di samping itu, ia juga termasuklah pening, cirit-birit, sakit kepala dan ruam (termasuk kulit bengkak, kulit gatal dan hipersensitiviti).

Kesan-kesan sampingan lain yang tidak disenaraikan di atas boleh berlaku pada sesetengah pesakit. Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mendapati apa-apa yang mebuat anda berasa tidak sihat.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my *[Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]*.

Cara penyimpanan dan pelupusan Citrex Cough Syrup

- *Penyimpanan*

Jauhi ubat-ubatan dari jangkauan kanak-kanak.

Jangan mengambil ubat ini selepas tarikh tamat tempoh yang diterterakan pada pek bungkusan.

Simpan dalam bekas yang tertutup rapat di tempat yang kering, di bawah 30℃. Jangan gunakan jika dapati penutup pembukaan telah rosak atau hilang.

- *Pelupusan*

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah- langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*

Cecair jernih yang berwarna oren dengan bau yang manis dan menyenangkan.

- *Bahan-bahan kandungan*

- Bahan aktif:

Setiap 5ml mengandungi Guaifenesin 100mg.

CITREX COUGH SYRUP 100MG/5ML

Guaifenesin (100mg/5ml)

- Bahan tidak aktif:
Liquid Glucose, Carboxymethylcellulose Sodium, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Sodium Citrate, Citric Acid Anhydrous, Menthol Crystal, Color FDC Yellow No. 6, Orange Flavour Sol. Sweet No. 1, Purified Water, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide.

- Nombor MAL:
MALxxxx

Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
Idaman Pharma Manufacturing Sdn Bhd (200401023395)
Lot 24 & 25, Jalan Perusahaan Lapan, Bakar Arang Industrial Estate, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
07/04/2020

Nombor Siri
NPRA (R2) 20/043