

SAFFID CAPSULE 300MG

Gemfibrozil 300mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Saffid Capsule 300mg
2. Bagaimana Saffid Capsule 300mg berfungsi
3. Sebelum mengambil Saffid Capsule 300mg
4. Cara menggunakan Saffid Capsule 300mg
5. Semasa menggunakan Saffid Capsule 300mg
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Saffid Capsule 300mg
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Saffid Capsule 300mg

Saffid Capsule 300mg digunakan bagi merawat masalah hiperlipidemia (kandungan lemak tinggi dalam darah) dan bagi mengelakkan penyakit jantung dalam pesakit yang mengalami hiperlipidemia.

Saffid Capsule 300mg membantu mengurangkan kolesterol dan trigliserida (asid lemak) dalam darah. Paras kolesterol dan trigliserida yang tinggi dalam darah akan meningkatkan risiko untuk mendapat arteriosklerosis (pengerasan salur darah/arteri).

Saffid Capsule 300mg juga digunakan bagi mengurangkan risiko strok, serangan jantung, atau komplikasi jantung yang lain pada pesakit yang mempunyai paras kolesterol dan trigliserida yang tinggi yang tidak dapat dibantu melalui kaedah diet atau Langkah-langkah pencegahan yang lain.

Bagaimana Saffid Capsule 300mg berfungsi

Gemfibrozil tergolong dalam kelas ubat-ubatan yang dikenali sebagai fibrates. Ia berfungsi dengan mengurangkan tahap kandungan sesetengah jenis lemak dan kolesterol terutamanya jenis yang dikenali sebagai trigliserida.

Sebelum mengambil Saffid Capsule 300mg

Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil Saffid Capsule 300mg sekiranya anda:

- mengalami alahan kepada *gemfibrozil*
- mengalami alahan kepada *fenofibrate* atau ubat-ubatan lain dalam kelas fibrat (seperti *clofibrate*, *bezafibrate*)
- sedang menyusukan bayi
- sedang hamil
- mengalami masalah hati, buah pinggang atau pundi hempedu yang teruk

Sebelum mula mengambil

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda ada alergi/alah terhadap sebarang ubat, makanan, pengawet atau pewarna.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil atau sedang menyusukan bayi. Doktor atau ahli farmasi anda akan membincangkan tentang risiko dan faedah yang terlibat. Sebelum mengambil ubat ini, beritahu doktor anda semua masalah kesihatan anda.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu ahli farmasi anda ubat-ubatan yang anda ambil termasuklah semua ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan lain.

Sekiranya anda menagmbil lebih dari satu ubat, ianya mungkin akan berinteraksi antara satu sama lain.

Pada masa tersebut, doktor anda mungkin akan mempertimbangkan samada anda perlu meneruskan pengambilan ataupun tidak.

Keputusan untuk samada anda perlu meneruskan pengambilan ubat-ubatan tersebut bergantung kepada keadaan anda. Doktor anda akan meminta anda meneruskan pengambilan ubat-ubatan tersebut sekiranya faedah pengambilannya melebihi risiko dari mengambilnya.

Dalam keadaan ini, sekiranya ubat-ubatan and aitu perlu diambil Bersama-sama dengan *Gemfibrozil* walaupun ada kemungkinan berlakunya interaksi/tindakbalas, doktor anda akan mengubah dos ubat anda dan memantau keadaan anda dengan lebih terperinci.

Beritahu doktor anda kesemua ubat yang sedang anda ambil supaya mereka boleh mempertimbangkan sebarang interaksi/tindakbalas yang mungkin berlaku. Ini termasuklah ubat-ubatan yang didapati dari klinik swasta, hospital, doktor gigi, jururawat, penasihat kesihatan, atau ahli farmasi. Anda juga perlu memberitahu doktor anda ubat-ubatan yang dibeli di kaunter tanpa memerlukan preskripsi doktor.

Ubat-ubatan berikut boleh berinteraksi/bertindakbalas dengan *Gemfibrozil*:

- *Anticoagulants*, *Coumarin*, *Indandione derivative*
Pengambilan Bersama boleh meningkatkan kesan pencairan darah ubat ini, doktor anda mungkin perlu melakukan beberapa ujian darah untuk menyesuaikan dos untuk pencairan darah.
- *Chenodiol or ursodiol* (digunakan untuk merawat batu hempedu)

SAFFID CAPSULE 300MG

Gemfibrozil 300mg

Kesan mungkin berkurang apabila diambil serentak dengan gemfibrozil.

- Lovastatin (ejen penurunan kadar kolesterol)
Pengambilan Bersama mungkin boleh dikaitkan dengan peningkatan dalam kepekatan kreatina kinase (CK) dan mioglobinuri (kehadiran mioglobin dalam air kencing). Ini boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang akut yang boleh dikesan seawal 3 minggu atau selewat-lwatnya beberapa bulan selepas terapi gabungan digunakan.

Sekiranya anda mengambil Gemfibrozil dan mana-mana ubat tersebut di atas, pastikan anda memberitahu doktor yang merawat anda.

Sediaan komplementari dan vitamin

Ubat-ubatan juga boleh berinteraksi atau bertindakbalas dengan sediaan komplementari dan vitamin. Secara amnya, tiada banyak maklumat yang boleh diperoleh berkenaan dengan interaksi antara ubat-ubatan dan sediaan komplementari atau vitamin.

Sekiranya anda merancang untuk mengambil atau anda sememangnya sedang mengambil sediaan komplementari atau vitamin, anda haruslah bertanya kepada doktor anda sebarang interaksi/tindakbalas yang mungkin berlaku antara gemfibrozil dan sediaan komplementari atau vitamin yang sedang anda ambil.

Doktor anda akan menasihatkan anda samada perlu atau tidak anda meneruskan pengambilannya sekiranya diketahui ada berlakunya interaksi/tindakbalas sekiranya diambil bersama-sama. Doktor anda juga akan membincangkan kesan-kesan sediaan komplementari atau vitamin terhadap keadaan anda.

Sekiranya anda mengalami kesan yang luar biasa semasa mengambil ubat ini bersama-sama dengan sediaan komplementari atau vitamin, anda haruslah memberitahu doktor anda.

Cara menggunakan Saffid Capsule 300mg

Ikuti segala arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Arahan tersebut mungkin berbeza dari risalah ini.

Sekiranya anda tidak memahami arahan pada label ubat tersebut, bertanyalah pada ahli farmasi, jururawat atau doktor anda bagi menjelaskan arahan tersebut.

Berapa banyak harus diambil

Dos dewasa biasa:

Telan 4 kapsul (1.2g) sehari dalam 2 dos yang terbahagikan tiga puluh minit sebelum makan.

Bila perlu diambil

Ubat ini diambil tiga puluh minit sebelum makan pagi dan malam

Berapa lama perlu diambil

Teruskan mengambil ubat ini selama mana doktor anda mengarahkannya. Amatlah penting untuk meneruskan pengambilan ubat ini walaupun anda sudah berasa sihat.

Berhenti mengambil ubat ini secara tiba-tiba boleh menyebabkan keadaan anda kembali kepada asal. Oleh itu, anda perlu berbincang dengan doktor anda sekiranya anda mengalami masalah semasa mengambil ubat ini.

Doktor anda mungkin menghentikan rawatan Saffid Capsule 300mg sekiranya selepas 3 bulan, kesannya didapati tidak memuaskan atau sekiranya keputusan ujian fungsi hati menunjukkan keabnormalan yang ketara.

Jika terlupa mengambil

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambil dos ini dengan segera sebaik sahaja teringat. Walau bagaimanapun, jika sudah menghampiri waktu untuk dos berikutnya, biarkan sahaja dos yang terlupa tadi dan teruskan dengan dos yang berikutnya mengikut jadual pengambilan ubat. Jangan gandakan dos untuk menggantikan dos yang terlupa diambil itu.

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda atau pergi ke hospital yang berdekatan dengan segera. Jangan memandu sekiranya anda sudah terlebih ambil ubat ini.

Semasa menggunakan Saffid Capsule 300mg

Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya simptom anda tidak berkurangan. Ahli farmasi atau doktor anda akan memeriksa keadaan anda dan akan memberitahu samada anda perlu meneruskan atau tidak pengambilan ubat ini.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengambil Saffid Capsule 300mg untuk merawat masalah lain kecuali atas arahan ahli farmasi atau doktor anda.

Jangan beri ubat anda kepada orang lain walaupun mereka mengalami masalah yang sama seperti anda.

Jangan mengambil lebih daripada dos yang disarankan kecuali atas arahan ahli farmasi atau doktor anda.

Perkara yang perlu diberi perhatian

Berhati-hati semasa memandu atau mengendalikan jentera sehingga anda mengetahui kesan Saffid Capsule 300mg terhadap anda.

Jangan meminum arak semasa pengambilan ubat ini.

SAFFID CAPSULE 300MG

Gemfibrozil 300mg

Kesan-kesan sampingan

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda berrasa tidak sihat semasa mengambil Saffid Capsule 300mg.

Ubat ini membantu kebanyakan orang tetapi ianya berkemungkinan memberikan kesan sampingan pada sesetengah orang.

Semua ubat-ubatan akan menghasilkan kesan sampingan.

Kadang-kadang kesan sampingan ini serius, kadang-kadang ianya tidak. Anda mungkin memerlukan rawatan segera sekiranya anda mengalami kesan-kesan sampingan tersebut.

Jangan bimbang dengan senarai kesan sampingan berikut. Anda mungkin tidak akan mengalaminya.

Bertanya dengan ahli farmasi atau doktor anda sekiranya anda ada sebarang pertanyaan.

Reaksi setiap orang terhadap ubat ini berbeza-beza. Sukar untuk meramalkan kesan sampingan yang bakal berlaku terhadap anda atau anda mungkin langsung tidak akan mengalami sebarang kesan sampingan. Apa yang penting, anda haruslah memberitahu doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda mengalami masalah dengan ubat ini.

Kesan sampingan yang dilaporkan adalah:

- sakit perut, angina tau pedih ulu hati
- cirit-birit
- mual atau muntah-muntah
- ruam-ruam pada kulit
- keletihan
- pengurangan sel darah merah atau pengurangan sel darah putih (batuk atau serak; demam atau berasa seram sejuk, sakit pada bahagian pinggang dan sisi, kesakitan atau kesukaran untuk kencing
- batu karang pada pundi hempedu (sakit perut yang teruk berserta loya dan muntah)

- keradangan tisu otot (sakit otot, keletihan atau kelesuan)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers*→*Reporting Side Effects to Medicines (ConsSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan Pelupusan Saffid Capsule 300mg

Penyimpanan

Pastikan semua ubat tidak dapat dilihat dan dicapai oleh kanak-kanak.

Jangan ambil ubat ini sekiranya telah melewati tarikh tamat tempoh yang dicetak pada bungkusannya.

Simpan di tempat yang bersuhu bawah 30°C. Lindungi daripada pancaran cahaya.

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak seharusnya dilupuskan melalui sistem air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi tentang bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Kapsul berwarna merah hati dan putih, berbentuk '0' memanjang yang mengandungi serbuk putih.

Bentuk Dosej: *Oral Solid*

Saiz Pek:

Dalam blister mempunyai 3 x 10 kapsul

Bahan-bahan kandungan:

Bahan aktif:

Saffid Capsule 300mg mengandungi Gemfibrozil 300mg.

Bahan-bahan tidak aktif:

Microcrystalline Cellulose (101), Pregelatinized Starch, Croscarmellose Sodium, Colloidal Silicaon Dioxide (Aerosil 200) dan Magnesium Stearate.

Nombor MAL:

MAL22106021AZ

Pengilang:

InspiraPharma Sdn Bhd

(200401023395),

Lot 24 & 25, Jalan 8,

Kawasan Perusahaan Bakar Arang,

08000 Sungai Petani,

Kedah Darul Aman,

Malaysia.

Pemegang Pendaftaran Produk:

InspiraPharma Sdn Bhd

(200401023395),

Lot 24 & 25, Jalan 8,

Kawasan Perusahaan Bakar Arang,

08000 Sungai Petani,

Kedah Darul Aman,

Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP:

06/07/2026

Nombor Siri:

NPRA (R2) 22/026