

UNI-PAIN LINIMENT

Methyl Salicylate (25% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan UNI-PAIN
2. Bagaimana UNI-PAIN berfungsi
3. Sebelum menggunakan UNI-PAIN
4. Cara menggunakan UNI-PAIN
5. Semasa menggunakan UNI-PAIN
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan UNI-PAIN
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan UNI-PAIN

Ia digunakan untuk melegakan kesakitan otot dan sendi.

Bagaimana UNI-PAIN berfungsi

UNI-PAIN mengandungi methyl salicylate yang mempunyai sifat mengurangkan kesakitan dan kerengsaan.

Sebelum menggunakan UNI-PAIN

-Bila tidak boleh menggunakan

Ia tidak boleh digunakan jika anda hipersensitif kepada sebarang komponen dari formulasi ini.

-Sebelum menggunakan ubat ini

Mengandung dan menyusukan anak
Berbincang dengan doktor anda sebelum menggunakan ubat ini jika anda mengandung, mungkin mengandung atau menyusukan anak.

-Jika mengguna ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan ubat ini, termasuk mana-mana yang anda dapatkan tanpa preskripsi dari kedai farmasi, pasaraya atau kedai makanan kesihatan anda.

Cara menggunakan UNI-PAIN

-Berapa banyak harus digunakan

Sapukan sedikit cecair pada kulit yang terlibat dan urut perlahan-lahan. Untuk digunakan 3-4 kali sehari.

-Bila perlu digunakan

Guna seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

-Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan UNI-PAIN seperti yang dicadangkan oleh doktor anda. Jika gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor anda.

-Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Guna dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, tunggu sehingga sampai masa untuk menggunakan dos seterusnya dan abaikan dos yang tertinggal. Jangan guna dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

-Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda atau sesiapa telah terguna dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan UNI-PAIN

-Perkara yang perlu dilakukan

Maklumkan kepada doktor mengenai ubat-ubatan yang anda guna.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

- Jangan guna dos lebih daripada yang disarankan melainkan diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan guna sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi UNI-PAIN dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

- Hentikan penggunaan dan dapatkan nasihat doktor jika gejala berterusan selama lebih daripada 7 hari.
- Jangan sapukan pada luka atau kulit yang rosak.
- Jangan sapukan pada bahagian besar badan atau tempat yang berbalut.

- Produk ini mengandungi methyl salicylate dan apabila digunakan atau disapu pada kulit, boleh diserap melalui kulit ke dalam darah. Bagi pesakit yang menggunakan warfarin, penggunaan berlebihan pada kulit untuk sakit otot atau sendi boleh meningkatkan peluang pendarahan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, UNI-PAIN boleh menyebabkan kesan sampingan seperti kerengsaan pada kulit, kemerahan atau bengkak, rasa terbakar atau pedih. Jika kesan-kesan sampingan berterusan, rujuk kepada doktor.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan UNI-PAIN

-Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C, di tempat yang kering, jauh daripada cahaya matahari. Jauhi ubat daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Ubat tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Dapatkan maklumat daripada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

-Rupa dan warna produk

Cecair bewarna kuning dengan bau karakteristik.

-Bahan-bahan kandungan

-Bahan aktif
Methyl salicylate

-Bahan-bahan tidak aktif
Menthol, Methyl paraben, Alcohol denatured dan palm oil.

-Nombor MAL

MAL06021263XC

UNI-PAIN LINIMENT

Methyl Salicylate (25% w/v)

Pemegang Pendaftaran Produk

UNIMED SDN. BHD.

53, Jalan Tembaga SD 5/2B,

Bandar Sri Damansara,

52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Pengilang

KCK Pharmaceutical Industries Sdn.
Bhd.

No. 5 & 7 Hala Beringin, Diamond

Valley Industrial Park, 11960

Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia

Tarikh kemaskini RiMUP

24/06/2024

Nombor Siri

NPRA(R2/1)240621/1292