

VINODINE SPRAY

Povidone - Iodine (5% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Vinodine Spray
2. Bagaimana Vinodine Spray berfungsi
3. Sebelum menggunakan Vinodine Spray
4. Cara menggunakan Vinodine Spray
5. Semasa menggunakan Vinodine Spray
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Vinodine Spray
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Vinodine Spray

Vinodine Spray digunakan sebagai antiseptik untuk merawat dan mencegah jangkitan pada luka termasuk ulser, melecur, terhiris dan kecederaan ringan yang lain.

Bagaimana Vinodine Spray berfungsi

Vinodine Spray merawat luka kecil dengan membunuh bakteria.

Sebelum menggunakan Vinodine Spray

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Vinodine Spray:

- Jika anda alah terhadap iodine atau bahan lain yang disenaraikan pada hujung risalah ini.
- Tidak boleh digunakan dalam rongga serous (rongga serous merangkumi beberapa rongga badan, di mana mereka mengeluarkan cecair pelincir yang mengurangkan geseran dari pergerakan otot.)
- Jika anda kerap mengalami gangguan tiroid
- Menerima terapi litium serentak (ubat psikiatri)
- Pada kanak-kanak di bawah umur dua tahun

Kehamilan dan penyusuan

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Vinodine Spray jika anda mengandung, cuba untuk mengandung atau mungkin mengandung atau menyusukan anak.

- Sebelum menggunakan Vinodine Spray

Goncang botol dengan sekata sebelum menyembur pada kulit yang terluka.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor khususnya jika anda ada mengambil:

- Terapi litium serentak
- Ujian fungsi tiroid
- Ujian untuk mengesan 'occult blood' (ujian untuk kehadiran darah secara mikroskopik atau darah yang tidak kelihatan) dalam najis atau darah dalam air kencing.

Cara menggunakan Vinodine Spray

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk kegunaan luaran sahaja.

Dewasa dan kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas:

Sembur kawasan yang perlu dari jarak 15-25cm (6-10 inci) sehingga serbuk debu terkumpul. Jika perlu, kawasan yang dirawat itu boleh ditutup dengan pembalut.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Tanya doktor anda berapa lama and perlu menggunakan ubat semburan ini. Jika simptom-simptom tidak berkurangan selepas itu, jumpa doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda terlupa menggunakannya.

Jika hamper tiba masa untuk dos seterusnya, tunggu dan guna dos seterusnya.

Jangan guna dos dua kali ganda bagi menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Iodine berlebihan boleh menyebabkan beguk, *hypothyroidism* atau *hyperthyroidism*. Penyerapan iodine secara sistemik selepas beberapa kali penggunaan *povidone iodine* pada permukaan luka yang besar boleh menyebabkan beberapa kesan sampingan: rasa logam di dalam mulut, air liur meningkat, melecur atau sakit tekak atau mulut, keradangan dan bengkak mata, edema pulmonari, tindak balas kulit, kecacatan gastrousus dan cirit-birit, asidosis metabolik, *hipernatraemia* dan gangguan buah pinggang.

Rawatan: Dalam kes tertelan Vinodine dalam kuantiti yang besar, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, simptomatik dan rawatan tambahan perlu diberikan dengan memberi perhatian khusus terhadap keseimbangan elektrolit badan dan fungsi buah pinggang dan tiroid.

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan.

Semasa menggunakan Vinodine Spray

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda mengalami ketidakselesaan atau berasa sensitive pada permukaan kulit yang disemur, berhenti menggunakan semburan ini dan jumpa doktor anda.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Vinodine Spray adalah untuk penggunaan luaran sahaja. Jangan menelan produk ini.

Jangan menyedut atau menyembur ke dalam mata.

Jangan berkongsi Vinodine Spray dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Elakkan penggunaan jika anda mempunyai masalah buah pinggang. Perhatian khusus perlu diberikan semasa penggunaan berkala pada kulit yang terluka jika anda sedia ada mempunyai masalah buah pinggang.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Vinodine Spray boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami ketidakselesaan berpanjangan seperti kepedihan atau kepanasan yang tidak dialami sebelum mula menggunakan ubat ini, atau jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan lain termasuk yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat secara terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835549, atau laman web npra.moh.gov.my

Consumers→Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Vinodine Spray

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C dan dijauhkan dari cahaya.

Jangan guna ubat ini selepas tarikh yang dicetak sebagai “EXP”, walaupun telah disimpan secara betul.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Semburan cecair berwarna coklat gelap yang diisi di dalam bekas aluminium bertekanan yang dilengkapi dengan injap.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Povidone-Iodine

- Bahan lain

Hydrocarbon Propellant dan Isopropyl Alcohol

- Nombor MAL

MAL08010737XZ

Pengilang

M/s. Midas Care
Pharmaceuticals Pvt. Ltd.,
B-16, MIDC, Waluj,
431 136,
India

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn Bhd
No 53, Jalan Tembaga SD 5/2B, Bandar
Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini RiMUP

07/09/2019

Nombor Siri

NPRA(R4/1)200919/00268