

METROGYL SUSPENSION

Benzoyl Metronidazole (200mg/ 5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan MetrogyL
2. suspension
3. Bagaimana MetrogyL suspension berfungsi
4. Sebelum menggunakan MetrogyL suspension
5. Cara menggunakan MetrogyL suspension
6. Semasa menggunakan MetrogyL suspension
7. Kesan-kesan sampingan
8. Cara penyimpanan dan pelupusan MetrogyL suspension
9. Maklumat lanjut
10. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan MetrogyL suspension

MetrogyL suspension digunakan untuk merawat jangkitan-jangkitan tertentu yang disebabkan oleh bakteria dan organisma organisma lain di bahagian - bahagian berlainan pada badan.

Bagaimana MetrogyL suspension berfungsi

MetrogyL suspension adalah antibiotic yang tergolong dalam kumpulan ubat ubatan yang dipanggil *nitroimidazoles*. Ubat ini berfungsi dengan membunuh atau menghentikan pertumbuhan bakteria dan organisma lain yang menyebabkan jangkitan ini.

Sebelum menggunakan MetrogyL suspension

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil MetrogyL suspension jika:

- Anda pernah mempunyai tindak balas alergi terhadap *Metronidazole* atau mana-mana *nitroimidazole*.

Mengandung dan menyusukan anak

Sila rujuk kepada doktor anda sebelum mula menggunakan MetrogyL suspension jika anda mengandung, merancang untuk mengandung, menyusukan anak dan berniat untuk menyusukan anak. Doktor anda akan mempertimbangkan risiko

pengambilan MetrogyL suspension terhadap faedah yang mereka harapkan untuk anda.

- Sebelum menggunakan MetrogyL suspension

Anda perlu memberitahu doktor anda jika anda mempunyai sebarang alergi kepada mana-mana ubatan lain atau mana-mana bahan lain seperti pengawet atau pewarna makanan.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai atau pernah mempunyai mana-mana masalah kesihatan/ keadaan perubatan termasuk:

- Penyakit hati yang teruk
- Penyakit otak, saraf tunjang atau Saraf

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat boleh terjejas dengan MetrogyL suspension atau mungkin boleh menjejaskan keberkesannya. Ini termasuk:

- Alkohol
- *Disulfiram*, ubat yang digunakan untuk merawat pergantungan alcohol yang kronik.
- *Warfarin* atau ubat-ubatan lain yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah.
- *Phenytoin*, ubat yang digunakan untuk merawat sawan.
- *Lithium*, ubat untuk merawat kemurungan manic atau jenis-jenis kemurungan yang lain.

Cara menggunakan MetrogyL suspension

Selalu menggunakan MetrogyL suspension seperti yang dinasihatkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Pengambilan oral sahaja

Kanak-kanak:

35 hingga 50 mg / kg / 24 jam, dibahagikan kepada tiga dos, secara oral selama 10 hari.

- Bila perlu digunakan

Doktor anda akan menentukan sekiranya anda perlu mengambil MetrogyL suspension.

- Berapa lama perlu digunakan

Rujuk dengan doktor atau ahli farmasi anda untuk tempoh rawatan. Teruskan mengambil MetrogyL suspension selagi doktor anda mengesyorkan.

Jangan berhenti mengambil ubat ini, walaupun anda berasa lebih baik selepas beberapa hari, kecuali atas nasihat doctor anda. Jangkitan anda mungkin belum pulih sepenuhnya jika anda berhenti mengambil ubat ini terlalu awal.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda lupa menggunakan MetrogyL suspension pada masa yang sesuai, gunakannya sebaik sahaja anda mengingati, kemudian lakukan seperti sebelumnya. Jangan menggandakan dos untuk mengejar.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Dinasihatkan supaya hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika anda mengambil MetrogyL suspension berlebihan

Semasa menggunakan Metrogyl suspension

- Perkara yang perlu dilakukan

Jika anda bersedia untuk memulakan penggunaan ubat baru yang lain, maklumkan ahli farmasi atau doktor anda yang anda sedang menggunakan Metrogyl suspension.

Ambil Metrogyl suspension mengikut dos yang disarankan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan lebih daripada dos yang disarankan melainkan dibenarkan oleh doktor anda.

Jangan ambil Metrogyl suspension lebih daripada frekuensi yang dicadangkan dalam satu hari.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Hentikan penggunaan jika berlaku kerengsaan atau sensitiviti.

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Metrogyl suspension boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mengalaminya. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana simptom berikut selepas mengambil ubat ini kerana simptom ini boleh memudaratkan.

Rasa ganjil di dalam mulut

- Lidah dijangkiti fungi
- Radang mulut
- Masalah darah
- Masalah hati
- Sawan
- Pening

- Penyelarasan yang lemah
- Kekeliruan
- Rasa marah
- Kemurungan
- Rasa lemah
- Kesukaran tidur
- Hidung tersumbat
- Mulut kering, kekeringan mulut (atau faraj atau vulva)
- Demam
- Pembuangan air kecil yang luar biasa (contohnya kesukaran untuk buang air)

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui No. Tel: 03-78835490, atau laman web npra.moh.gov.my (*Public → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Metrogyl suspension

- Penyimpanan

Simpan di bawah suhu 30°C di tempat yang sejuk

Lindungi dari cahaya

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Suspension pekat berwarna oren lembut yang mempunyai ciri-ciri rasa buah-buahan dengan rasa manis.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Benzoyl Metronidazole

- Bahan tidak aktif

Warna Sunset Yellow FC, Essence Mix Fruit Inhouse, Guar B.P, Sucrose BP, Essence Peppermint Inhouse, Sodium propyl hydroxybenzoate, Sodium methyl hydroxybenzoate, Sorbitol solution 70%, Sorbic acid, Purified water BP, dan Polysorbate 80 BP.

- Nombor MAL

MAL19872154AZ

Pengilang

Unique Pharmaceutical Laboratories (A Division J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited)
Plot No. 215,216, G.I.D.C. Industrial Area, Panoli: 394 116, Dist. Bharuch, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn Bhd
53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

24/10/2019

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)280219/00067