

METROGYL GEL

(Metronidazole) (10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Metrogyl Gel
2. Bagaimana Metrogyl Gel berfungsi.
3. Sebelum mengambil Metrogyl Gel
4. Cara menggunakan Metrogyl Gel
5. Semasa menggunakan Metrogyl Gel
6. Kesan- kesan sampingan.
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Metrogyl Gel
8. Maklumat lanjut.
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk.
10. Tarikh kemaskini RiMUP.

Apakah kegunaan Metrogyl Gel

Metrogyl Gel digunakan sebagai aplikasi topikal untuk merawat jerawat, pustula (bintik) dan kemerahan yang berkembang dengan keadaan rosacea

Bagaimana Metrogyl Gel Berfungsi

Metrogyl Gel mengandungi bahan aktif metronidazole yang bertindak terhadap mikroorganisma berbahaya untuk membantu mengawal jangkitan dan keradangan pada kulit akibat rosacea.

Sebelum mengambil Metrogyl Gel

- Bila tidak boleh mengambil

Metrogyl Gel tidak boleh digunakan pada individu yang mempunyai sejarah hipersensitiviti kepada metronidazole, paraben, atau bahan-bahan lain dalam formulasi

- Sebelum mula mengambil

Metrogyl Gel telah dilaporkan bahawa menyebabkan mata berair. Oleh itu, bersentuhan dengan mata harus dielakkan. Jika kerengsaan tempatan berlaku, pesakit harus diarahkan untuk menggunakan kurang kerap, hentikan penggunaan buat sementara waktu atau hentikan penggunaan sehingga arahan selanjutnya.

- Jika mengambil ubat- ubat lain

Metrogyl Gel dijangka mempunyai interaksi yang minimum dengan ubat lain. Individu yang menerima rawatan antikoagulan harus memaklumkan

kepada doktor mereka, kerana penyerapan metronidazole ke dalam aliran darah boleh meningkatkan kesan antikoagulan (penipisan darah) ubat tersebut.

Cara menggunakan Metrogyl Gel

- Berapa banyak harus digunakan

Sapukan dan gosok filem nipis Metrogyl Gel dua kali sehari, pagi dan petang, ke seluruh kawasan yang terjejas selepas cuci kawasan tersebut

- Bila perlu digunakan

Sapukan dua kali sehari, pagi dan petang. Kosmetik boleh digunakan selepas penggunaan Metrogyl Gel.

- Berapa lama perlu digunakan

Penambahbaikan harus diperhatikan dalam masa tiga minggu. Doktor anda akan memutuskan berapa lama anda perlu menggunakan Metrogyl Gel untuk memastikan rosacea anda terkawal.

- Jika terlupa menggunakan

Walaupun gel ini berfungsi dengan baik apabila anda menggunakannya dengan kerap seperti yang diarahkan, jangan risau jika anda terlupa menggunakan gel anda pada masa yang betul.

Apabila anda ingat, gunakan semula dengan cara yang sama seperti sebelumnya

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Produk ini untuk digunakan pada kulit sahaja. Jangan telan. Jika anda tertelan secara tidak sengaja, dapatkan nasihat doktor.

Semasa menggunakan Metrogyl Gel

- Perkara yang perlu dilakukan

Kawasan yang akan dirawat perlu dibersihkan dan dikeringkan sebelum menggunakan Metrogyl Gel. Sentiasa gunakan ubat ini sama seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan ambil Metrogyl Gel jika anda alah kepada metronidazole atau mana-

mana bahan lain ubat ini. Reaksi alahan mungkin termasuk ruam atau gatal-gatal.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

- Jika anda mengalami sebarang gangguan darah, jangan gunakan Metrogyl Gel melainkan doktor anda memberitahu anda boleh.
- Produk ini tidak boleh digunakan pada kanak-kanak.
- Menggunakan Metrogyl Gel boleh mengganggu ubat yang digunakan untuk menipiskan darah (antikoagulan) seperti warfarin dan dicoumarin. Hubungi doktor anda untuk mendapatkan nasihat jika anda mengambil ubat untuk menipiskan anda darah, atau jika anda mengalami sebarang gangguan darah lain.
- Jika anda hamil atau menyusui, mungkin tidak digalakkan untuk menggunakan produk ini, melainkan doktor anda menganggapnya penting.

Kesan- kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Metrogyl Gel boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mendapatnya.

Kesan sampingan yang dilaporkan termasuk kerengsaan kulit, kekeringan, kemerahan, mata rasa terbakar dan mata berair (koyak).

Sekiranya kerengsaan kulit berlaku sama ada gunakan gel dengan lebih jarang atau berhenti menggunakannya sehingga kerengsaan mereda. Dapatkan nasihat perubatan daripada doktor atau ahli farmasi anda jika perlu.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]”

Cara penyimpanan dan pelupusan Metrogyl Gel

- Penyimpanan

METROGYL GEL

(Metronidazole) (10mg)

- Jauhkan ubat ini daripada pandangan dan capaian kanak-kanak.
- Simpan di tempat yang sejuk, di bawah 30°C. Lindungi daripada cahaya

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

- Rupa produk

Metrogyl Gel adalah gel tidak berwarna kepada gel licin kuning pucat.

Bahan- bahan kandungan

Bahan Aktif:

Metronidazole

Bahan Tidak Aktif:

methyl hydroxy benzoate, propyl hydroxy benzoate, disodium edetate bp, sodium hydroxide, carbomer-940, propylene glycol, purified water.

Nombor MAL

MAL19972495AZ

Pengilang

UNIQUE PHARMACEUTICAL
LABORATORIES

(A Division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited) Plot No. 304-308, G.I.D.C, Industrial Area, Panoli, 394 116, INDIA.

Pemegang pendaftaran produk

Unimed Sdn Bhd
No 53, Jalan Tembaga
SD 5/2B, Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur

Tarikh kemaskini RiMUP

01/10/2024

Nombor siri

NPRA(R2/2)240926/1350