

AMCARDIA TABLETS

Amlodipine Besilate (5mg, 10mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Amcardia Tablet
2. Bagaimana Amcardia Tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan Amcardia Tablet
4. Cara menggunakan Amcardia Tablet
5. Semasa menggunakan Amcardia Tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Amcardia Tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Amcardia Tablet

Amcardia Tablet digunakan untuk rawatan hipertensi dan sakit dada. Ia boleh digunakan secara bersendirian atau digabungkan dengan ubat antihipertensi dan antianginal (merawat sakit dada) yang lain.

Bagaimana Amcardia Tablet berfungsi

Amcardia mengandungi bahan aktif, Amlodipine Besilate yang termasuk dalam kelas ubat-ubatan yang dikenali sebagai penyekat saluran kalsium. Amlodipine menghalang kalsium dari memasuki tisu dan arteri tertentu. Ini memudahkan mereka untuk berehat supaya darah dapat mengalir lebih mudah ke jantung yang kemudian membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangkan risiko serangan jantung atau strok.

Sebelum menggunakan Amcardia Tablet

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Amcardia Tablet jika:

- Anda sensitif kepada amlodipine atau bahan-bahan lain dari produk ini.

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Amcardia Tablet jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil Amcardia Tablet jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum

mengambil sebarang ubat. Adalah disyorkan bahawa penyusuan dihentikan semasa Amcardia diambil.

- Sebelum menggunakan Amcardia Tablet

Jangan ambil Amcardia Tablet jika anda mempunyai:

- Kegagalan jantung
- Kegagalan hati
- Mengambil / mengambil ubat yang mengurangkan tekanan darah anda

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Amcardia Tablet

- Berapa banyak harus digunakan

Dos permulaan adalah 5mg sekali sehari yang boleh meningkat kepada dos maksimum 10mg bergantung kepada tindak balas individu.

Warga Emas:

Rawatan dos biasa adalah disyorkan. Amcardia Tablet, yang digunakan pada dos yang sama untuk warga tua atau individu yang lebih muda, juga diterima dengan baik.

Individu dengan Fungsi Hati terjejas:

Seperti semua antagonis kalsium, separuh hayat amlodipine berpanjangan dalam individu dengan fungsi hati terjejas dan saranan dos tidak dinyatakan. Oleh itu, ubat harus diberikan dengan berhati-hati kepada golongan ini.

Penggunaan Individu dengan Kegagalan Buah Pinggang:

Amlodipine boleh digunakan pada individu sedemikian pada dos biasa.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan ubat ini secara berlebihan mungkin menyebabkan

Semasa menggunakan Amcardia Tablet

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Amcardia Tablet

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Amcardia Tablet dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Amcardia Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan berikut selepas menggunakan ubat ini.

Paling biasa:

- sakit kepala
- bengkak

Kardiovaskular:

- degupan jantung tidak teratur
- kadar denyut jantung lebih perlahan daripada biasa
- sakit dada
- tekanan darah rendah
- kekurangan pengedaran darah kepada anggota badan
- kehilangan kesedaran sementara
- kadar denyutan jantung yang cepat atau tidak teratur
- masalah keseimbangan

- tekanan darah jatuh ketika tiba-tiba berdiri dari posisi baring atau duduk

Sistem Saraf Pusat dan Periferal:

- kekurangan rasa sentuhan atau sensasi
- sensasi kebakaran atau berduri
- gerakan yang tidak sengaja atau gemetar
- sensasi pening berputing

Gastro-usus:

- anoreksia (gangguan makan)
- sembelit
- ketakcernaan
- kesukaran menelan
- cirit-birit
- kentut
- muntah
- peningkatan saiz gusi

Umum:

- kelemahan
- sakit belakang
- rasa panas seperti demam yang mendadak
- keresahan
- kesakitan
- kerengsaan teruk dengan kegigilan melampau
- berat badan meningkat

Sistem Muskuloskeletal:

- sakit sendi
- haus dan luka pada sendi
- kekejangan otot
- sakit otot

Psikiatri:

- disfungsi seksual (lelaki dan perempuan)
- kesukaran tidur
- rasa cemas
- kemurungan
- mimpi yang tidak normal
- kebimbangan
- rasa terpisah daripada fikiran, perasaan, dan badan seseorang

Sistem pernafasan:

- sesak nafas
- hidung berdarah

Kulit dan Tambahannya:

- kulit gatal yang teruk
- ruam

- kemerahan kulit atau membran mukus
- benjolan merah rata atau naik pada kulit

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (*Consumers* → *Reporting Side Effects to Medicines* (*ConSERF*) or *Vaccines* (*AEFI*)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Amcardia Tablet

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu 30°C. Lindungi daripada cahaya.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet berwarna keputihan, bulat dan rata dengan garis pecah di satu bahagian.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Amlodipine Besilate
- Bahan tidak aktif
Colloidal Anhydrous Silica, Magnesium Stearate, Maize Starch, Microcrystalline Cellulose and Purified Water.

- Nombor MAL

Amcardia Tablet 5mg
MAL08111770AZ

Amcardia Tablet 10mg
MAL08111771AZ

Pengilang

Unique Pharmaceutical Laboratories
Plot No. 215-219, GIDC. Industrial Area
Panoli, Dist. Bharuch 394116, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn. Bhd.
53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

07/06/2024

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)220719/00202