

SPIZEF TABLETS

(Cefuroxime Axetil (250mg, 500mg))

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan SPIZEF
2. Bagaimana SPIZEF berfungsi
3. Sebelum menggunakan SPIZEF
4. Cara menggunakan SPIZEF
5. Semasa menggunakan SPIZEF
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan SPIZEF
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan SPIZEF

Doktor telah mempreskripsikan ubat ini kerana anda menghadapi jangkitan di:

- Tekak, hidung ataupun telinga.
- Paru-paru ataupun dada.
- Saluran kencing.
- Kulit dan tisu lembut.
- Penyakit kelamin disebarkan oleh hubungan seks.

Bagaimana SPIZEF berfungsi

Produk ini tergolong dalam kumpulan antibiotic yang dipanggil cephalosporins". SPIZEF berfungsi dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

Sebelum menggunakan SPIZEF

- Bila tidak boleh menggunakan
Jangan ambil ubat ini jika:

- Anda alergi (hipersensitif) kepada bahan aktif cefuroxime, mana-mana antibiotik cephalosporin lain atau mana-mana bahan-bahan lain.
- Anda pernah mengalami tindak balas alergi (hipersensitif) yang teruk kepada mana-mana antibiotik β -lactam (penicillins, monobactams dan carbapenems).
- Sebelum menggunakannya
Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum menggunakan Spizef jika anda:

- Jika anda mempunyai penyakit *Lyme's* (disebarkan oleh kutu yang dijangkiti)
- Jika mengambil ubat-ubat lain
Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya, atau kedai makanan Kesihatan, terutamanya:
 - Pengambilan SPIZEF boleh mengganggu sesetengah ujian perubatan termasuk yang digunakan untuk menentukan tahap gula dalam darah anda. Jika anda dijangka mempunyai ujian perubatan, pastikan doktor anda mengetahui yang anda telah mengambil SPIZEF sebelum ujian. Jika anda memantau kandungan glukosa dalam darah atau kencing (contohnya diabetik) berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda untuk mengetahui adakah ubat anda boleh menjejaskan keputusan ujian perubatan
 - Jika anda telah mengambil ubat untuk gout (probenecid).
 - Penggunaan cefuroxime boleh menyebabkan keputusan positif ujian antibodi (ujian Coombs) yang palsu.
 - Cefuroxime boleh mengurangkan kesan pil pencegah kehamilan.

Mengandung dan menyusukan anak

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan ubat ini. Anda tidak boleh mengambil SPIZEF jika anda hamil atau beranggapan mungkin hamil.

Cara menggunakan SPIZEF

Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda

tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

Dewasa: Dos yang disyorkan untuk SPIZEF adalah 125 mg hingga 500 mg sehari, bergantung kepada tahap dan jenis jangkitan

Kanak-Kanak: Kebanyakan Jangkitan: 125 mg sehari, maksimum 250 mg setiap hari.

Kanak-kanak berumur 2 tahun dan keatas: Otitis Media (jangkitan telinga tengah) atau mana yang sesuai, dengan Jangkitan Lebih teruk: 250 mg sehari, maksimum 500 mg setiap hari.

Tablet SPIZEF tidak boleh dihancurkan. Oleh itu, ianya tidak sesuai untuk kanak-kanak yang berumur di bawah 3 bulan, kerana keselamatan dan keberkesannya tidak diketahui dalam kumpulan umur ini.

- Bila perlu digunakan

Dua kali sehari atau mengikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

Ambil SPIZEF selepas makanan. Ini akan membantu menjadikan rawatan lebih berkesan. Pengambilan tablet pada masa yang hampir sama setiap hari adalah disyorkan.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan SPIZEF Tablet untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor.

Tempoh terapi biasa adalah untuk 7 hari (dalam lingkungan 5 hingga 10 hari). Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

Ia adalah penting untuk anda menghabiskan rawatan walaupun anda mula berasa lebih sihat selepas beberapa hari. Jika anda berhenti mengambil cefuroxime terlalu awal jangkitan anda tidak boleh sembuh sepenuhnya dan jangkitan boleh kembali atau keadaan anda boleh menjadi lebih teruk. Bakteria

yang menyebabkan jangkitan anda ada rintangan daya tahan terhadap cefuroxime

- Jika anda terlupa menggunakan

Jangan ambil dos yang terlepas sama sekali.

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlupa. Sebaliknya, teruskan dos biasa anda.

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya.

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan gejala yang diterangkan dalam bahagian kesan sampingan.

Semasa menggunakan SPIZEF

- Perkara yang perlu dilakukan

Tablet cefuroxime adalah untuk kegunaan oral. Anda harus menelan keseluruhan tablet dengan segelas air.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan SPIZEF.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan kongsi SPIZEF Tablet kepada orang lain

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Memandu dan menggunakan jentera

SPIZEF Tablet boleh membuat anda berasa pening, loya atau letih. Oleh itu ada kemungkinan SPIZEF Tablet boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu kereta atau mengendalikan mesin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, SPIZEF Tablet boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Berhenti mengambil SPIZEF Tablet dengan serta-merta dan hubungi doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan berikut selepas menggunakan ubat ini.

Ubat ini juga boleh menjejaskan keputusan beberapa ujian darah.

SPIZEF mungkin menyebabkan alergi dan reaksi kulit yang serius. Berhenti menggunakan SPIZEF dan dapatkan rawatan perubatan segera jika mengalami gejala yang berikut:

- Kemerahan kulit, lepuh kulit, ruam, demam, sakit tekak atau kegatalan mata

Kesan sampingan yang sangat biasa:

- Jangkitan kulat. Ubat-ubatan seperti SPIZEF boleh menyebabkan penumbuhan yis (Candida) yang cepat dalam badan yang boleh membawa kepada jangkitan kulat (seperti seriawan). Kesan sampingan ini lebih berkemungkinan jika anda mengambil SPIZEF untuk masa yang lama.
- Eosinofilia (peningkatan eosinofil dalam darah)
- Sakit kepala.
- Pening.
- Kenaikan tahap enzim hati sementara.

- Gangguan perut dan usus, termasuk cirit-birit, loya dan sakit abdomen.

Kesan sampingan biasa:

- Reaksi hipersensitiviti seperti geligata dan kegatalan pada kulit.
- Keadaan darah: Sel darah merah dimusnahkan dengan cepat, sel darah putih yang semakin menurun.
- Masalah hati: keradangan pada hati, kekuningan pada kulit atau putih mata.
- Sebahagian kecil pengguna telah mengalami:
- Keradangan pada usus besar menyebabkan cirit birit yang teruk, selalunya bersama darah dan lendir, sakit perut, demam. (*Pseudomembranous colitis*).

Kesan sampingan yang jarang berlaku:

Gangguan kulit seperti *Erythema multiforme*, sindrom *Stevens-Johnson*, *toxic epidermal necrolysis*.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers→ Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan SPIZEF

Penyimpanan

Jauhkan ubat ini daripada kanak-kanak. Simpan di tempat yang kering pada suhu tidak melebihi 30 °C, lindungi daripada cahaya.

Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

- SPIZEF TABLET 250MG: Tablet bersalut filem berwarna putih kekuningan, berbentuk kapsul ditandakan dengan 250 pada satu belah dan tiada tanda pada bahagian lain. - SPIZEF TABLET 500MG: Tablet bersalut filem berwarna putih kekuningan, berbentuk kapsul ditandakan dengan 500 pada satu belah dan tiada tanda pada bahagian lain.	<i>Opadry (Y-I-7000) White, Pregelatinised Starch (1500), Croscarmellose Sodium, Colloidal Silicon Dioxide, Sodium Lauryl Sulphate, Purified Water</i>	Nombor Siri NPRA(R2/1)260804/00107
- <u>Bahan-bahan kandungan</u> - <u>Bahan aktif</u> SPIZEF TABLET 250MG: Setiap tablet bersalut filem 250mg mengandungi cefuroxime 250mg. SPIZEF TABLET 500MG: Setiap tablet bersalut filem 500mg mengandungi cefuroxime 500mg. - <u>Bahan tidak aktif</u>	- <u>Nombor MAL</u> SPIZEF TABLET 250MG: MAL07122799AZ SPIZEF TABLET 500MG: MAL07122800AZ Pengilang Orchid Healthcare (A Division of Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Limited) B77, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District – 603110, Tamil Nadu, India. Pemegang Pendaftaran Produk Unimed Sdn. Bhd., 53, Jalan Tembaga SD5/2B, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia	Tarikh kemas kini RiMUP Ogos 2026