

PANTAZ TABLETS

Pantoprazole sodium tablets (40 mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pantaz
2. Bagaimana Pantaz berfungsi
3. Sebelum menggunakan Pantaz
4. Cara menggunakan Pantaz
5. Semasa menggunakan Pantaz
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pantaz
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pantaz

- Jangkitan bakteria *Helicobacter pylori* dalam orang yang mempunyai ulser duodenum dan ulser perut, ia diguna dalam kombinasi dengan dua antibiotik (terapi penghapusan). Tujuannya adalah untuk menghapuskan bakteria dan mengurangkan kemungkinan ulser kembali
- Ulser gastrik dan duodenum
- Oesophagitis refluks yang sederhana atau serius (radang esofagus disertai dengan regurgitasi asid perut.
- Zollinger-Ellison Syndrome dan keadaan hipersekreteri patologi lain dan lain (keadaan yang jarang berlaku di mana satu atau lebih tumor terbentuk di pankreas atau bahagian atas usus kecil anda)

Bagaimana Pantaz berfungsi

Pantaz merupakan ubat jenis "perencat proton pam" (proton pump inhibitor) selektif, ia adalah ubat yang mengurangkan penghasilan jumlah asid dalam perut anda. Ia digunakan untuk merawat penyakit perut dan usus yang berkaitan dengan asid.

Sebelum menggunakan Pantaz

- Bila tidak boleh menggunakan

- Anda tidak boleh mengambil Pantaz jika anda alah kepada pantoprazole atau mana-mana ramuan lain dari ubat ini.
- Anda mempunyai masalah hati dan buah pinggang yang sederhana hingga teruk
- Anda mengadu gastrointestinal ringan

Mengandung dan menyusukan anak

Jangan ambil Pantaz jika anda mengandung, sedang merancang untuk mengandung atau mungkin mengandung.

Jangan ambil product name jika anda sedang menyusukan anak. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang ubat.

Jangan mengambil Pantaz jika anda alah terhadap active ingredient, atau ubat lain yang serupa atau sebarang bahan kandungan lain yang disenaraikan pada hujung risalah ini.

- Sebelum menggunakan Pantaz

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai perkara berikut:

- Jika mengandung atau merancang untuk hamil. Tidak diketahui apakah Pantaz boleh membahayakan bayi anda yang belum lahir.
- Adakah menyusu atau merancang untuk menyusu. Doktor anda harus memutuskan sama ada anda akan mengambil Pantaz atau menyusu. Anda tidak boleh melakukan kedua-duanya tanpa terlebih dahulu berbincang dengan doktor anda.
- Mempunyai simpanan badan yang berkurang atau faktor risiko penurunan penyerapan vitamin B12
- Doktor akan merancang beberapa ujian jika anda mempunyai simptom penggera (mis. Penurunan berat badan yang tidak disengajakan, muntah berulang, kesukaran menelan muntah darah, sel darah merah rendah atau hitam, najis tarry) dan apabila ulser gastrik disyaki atau hadir untuk mendiagnosis barah.
- Beritahu doktor anda sebelum mengambil ubat ini, jika anda akan menjalani ujian darah tertentu (Chromogranin A).

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda mengenai semua ubat yang anda ambil termasuk ubat yang memerlukan preskripsi dan tanpa preskripsi, vitamin dan ubat herba.

Controloc boleh menjejaskan fungsi ubat lain dan sebaliknya. Sila beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat berikut:

- Atazanavir atau nelfinavir (ubat untuk Human Immunodeficiency Virus (HIV))
- Methotrexate (ubat kemoterapi untuk merawat kanser)
- Warfarin, phenprocoumon (mencegah pembekuan darah)
- Tacrolimus (mencegah penolakan pemindahan)
- Fluvoxamine (untuk kemurungan atau gangguan keresahan)

Cara menggunakan Pantaz

- Berapa banyak harus digunakan

Ambil 1 atau 2 Pantaz 40mg setiap hari untuk rawatan esofagitis refluks sederhana dan teruk

- Ambil 2 Pantaz 40mg + kombinasi mana-mana 2 antibiotik untuk pembasmian *H. pylori*
- Dua kali setiap hari seperti di bawah:
 - o 1000mg amoxicillin
 - o 500mg clarithromycin
 - o 500mg metronidazole
- Ambil 1 atau 2 Pantaz 40mg untuk pemyembuhan ulser gastrik dan usus
- Ambil 2 Pantaz 40mg setiap hari untuk pengurusan jangka panjang Zollinger-Ellison-Syndrome. Dos boleh diubah ke atas atau ke bawah.

- Bila perlu digunakan

Pantaz diambil 1 jam sebelum sarapan pagi. Terapi gabungan untuk *H. pylori*, dos kedua perlu diambil sebelum makan malam.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaa ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan

jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan Pantaz

- Perkara yang perlu dilakukan

Controloc hendaklah ditelan bulat-bulat dengan air.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Controloc tidak boleh dikunyah atau dihancurkan.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Semasa anda mengambil ubat ini, doktor anda ingin mengawasi anda (terutamanya jika anda mengambilnya untuk jangka masa panjang). Oleh itu, anda harus melaporkan sebarang simptom dan keadaan baru dan luar biasa setiap kali berjumpa doktor.

- Ruam (terutamanya di kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari), mungkin dengan rasa sakit pada sendi (Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus, SCLE)
- Demam, keletihan yang teruk, nanah / darah dalam air kencing.
- Pengecutan otot secara bukan sukarela, disorientasi, kejang, pening, peningkatan kadar jantung
- Keretakan pada pinggul, pergelangan tangan atau tulang belakang.
- Najis berair, sakit perut dan demam yang tidak hilang
- Anemia (kulit pucat, lemah, letih atau ringan), sesak nafas, lidah licin, masalah saraf (mati rasa atau kesemutan, kelemahan otot dan masalah berjalan), kehilangan penglihatan dan masalah mental (kemurungan, kehilangan ingatan atau perubahan tingkah laku).
- Gangguan tidur
- Sakit kepala
- Pening
- Loya
- Muntah
- Sembelit
- Mulut kering, sakit perut dan rasa tidak selesa
- Enzim hati meningkat
- a) Lupus Erythematosus Kutub Subakut (SCLE)
Kekerapan "tidak diketahui"
- b) Interstitial Nephritis
Masalah buah pinggang (interstitial nephritis)
- c) Hypomagnesaemia
Kekerapan "tidak diketahui": Tahap magnesium yang rendah juga dapat menyebabkan penurunan kadar kalium atau kalsium dalam darah.
- d) Keretakan
Kekerapan "tidak biasa": Beritahu doktor anda jika anda menghidap osteoporosis atau jika anda mengambil kortikosteroid (yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis).
- e) Clostridium Difficile Diarrhea
Cirit-birit yang teruk yang mungkin disebabkan oleh jangkitan (Clostridium difficile) di usus anda.
- f) Fundic Gland Polyps (Benign)
Kekerapan "Biasa": Polyp benigna di perut

g) Kekurangan vitamin B12

Inhibitor pam Proton boleh menyebabkan kekurangan vitamin B12.

h) Keradangan pada usus besar

Kekerapan 'tidak diketahui': Keradangan pada usus besar, yang menyebabkan cirit-birit berair yang berterusan

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara penyimpanan dan pelupusan Pantaz

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan dibawah suhu tidak melebihi 30°C, di tempat yang kering.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Berwarna kuning cair, bulat, dwicembung, tablet bersalut enterik yang mempunyai permukaan kosong pada kedua-dua belah bahagian.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Pantoprazole Sodium (40 mg)

- Bahan tidak aktif

Yellow Iron Oxide, Polyethylene Glycol 6000 BP, Hydroxy Propyl Methyl Cellulose, Dibutyl phthalate, crospovidone, Titanium Dioxide, Sodium Carbonate Anhydrous, Methocel, Calcium Stearate, Talcum BP, Eudragit L 100, mannitol USP, Methylene Chloride BP, Acetone BP,

Isopropyl Alcohol BP and distilled water.

- Nombor MAL
MAL08061577AZ

Pengilang

Medley Pharmaceuticals Limited
Plot 18 and 19, Zari Causeway Road,
Kachigam, Daman, 396210 India

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn Bhd
53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

20/04/2021