

AROXICAM

Meloxicam Tablets 7.5mg and 15mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan AROXICAM
2. Bagaimana AROXICAM berfungsi
3. Sebelum menggunakan AROXICAM
4. Cara menggunakan AROXICAM
5. Semasa menggunakan AROXICAM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan AROXICAM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP

Apakah kegunaan AROXICAM

AROXICAM digunakan untuk melegakan kesakitan dan keradangan *osteoarthritis, rheumatoid arthritis dan ankylosing spondylitis*.

Bagaimana AROXICAM berfungsi

AROXICAM tergolong dalam kelas ubat yang dikenali sebagai *Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID's)*. Mereka membantu melegakan kesakitan, keradangan dan demam dengan menghalang pengeluaran bahan yang menyebabkannya.

Sebelum menggunakan AROXICAM

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil ubat ini jika:

- anda alah kepada Meloxicam, Aspirin atau mana-mana jenis NSAID lain atau mana-mana ramuan lain ubat ini (disenaraikan di hujung risalah ini).
- jika anda mempunyai asma, angioedema (bengkak kulit anda), urtikaria (gatal-gatal), nasal polyps dan gejala menjadi lebih teruk disebabkan oleh Aspirin atau NSAID.
- Ulser usus gastrik yang aktif atau sejarah ulser gastro-usus berulang.
- Jika anda mempunyai masalah buah pinggang dan hati yang teruk
- Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, kecuali jika diluluskan untuk digunakan dalam Juvenile Rheumatoid Arthritis. Anda mengalami pendarahan dari perut, usus atau sebarang masalah pendarahan dari tempat lain.
- Mengandung atau menyusui badan

Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat. Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mula menggunakan ubat ini, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

- Sebelum menggunakan AROXICAM

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mempunyai alahan kepada AROXICAM, aspirin atau sebarang NSAID lain.

Beritahu doktor anda jika anda mempunyai mana-mana masalah perubatan yang berikut:

- Tekanan darah tinggi atau pengumpulan cecair (*Fluid Retention*)
- jika anda mengalami ulser atau pendarahan dari perut atau usus anda.
- Penyakit buah pinggang, hati atau jantung
- Asma atau sebarang masalah pernafasan lain.
- Warga emas
- Dehidrasi
- Pesakit yang mempunyai masalah keturunan yang jarang berlaku iaitu intoleransi galaktosa, Kekurangan Lapp-laktase atau malabsorpsi glukosa galaktosa

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi jika anda mengandung, merancang untuk mengandung atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Sesetengah ubat mungkin mengakibatkan interaksi dengan Tablet AROXICAM. Ini termasuk:

- *Aspirin* atau *NSAID's* lain
- Ubat cair darah seperti *Ticlopidine, Clopidogrel*
- Ubat yang digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi dan masalah jantung yang lain.
- *Lithium*, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat kemurungan
- *Methotrexate*, sejenis ubat yang digunakan untuk merawat rheumatoid arthritis dan beberapa jenis kanser
- *Cyclosporin*, sejenis ubat yang dikenali sebagai imunosupresan. Ia digunakan oleh mereka yang telah menjalani pemindahan organ untuk mengelakkan organ rejection.
- *Cholestyramine*, ubat yang digunakan untuk menurunkan kolesterol dalam darah.
- *Intrauterine device*

Tanya doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti sama ada anda boleh mengambil mana-mana ubat ini.

Cara menggunakan AROXICAM

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi

- Berapa banyak harus digunakan

Osteoarthritis (Penyakit sendi degeneratif):

7.5mg/hari. Jika perlu dos boleh ditingkatkan kepada 15mg/hari.

Rheumatoid arthritis (keradangan sendi kronik):

15mg/hari. Mengikut tindak balas terapeutik, dos boleh dikurangkan kepada 7.5mg/hari.

Ankylosing spondylitis (sejenis arthritis yang menjejaskan tulang belakang):

Untuk pesakit yang mempunyai risiko tinggi untuk tindak balas advers, mulakan rawatan dengan 7.5mg/hari

Kegagalan Buah Pinggang yang Teruk:

Untuk pesakit dialisis dengan kegagalan buah pinggang yang teruk, Jumlah dos harian tidak boleh melebihi 15mg.

Warga Emas:

Untuk warga emas yang dirawat untuk rheumatoid arthritis, dos yang disyorkan untuk rawatan jangka panjang ialah 7.5mg/hari.

Kanak-Kanak (Bawah 15 tahun):

Tidak disyorkan

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan AROXICAM mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika anda terlupa menggunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda tentang apa yang perlu dilakukan jika anda terlupa menggunakan ubat ini.

Ambil dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan mengambil ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika menggunakannya secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika dos berlebihan telah digunakan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Semasa menggunakan AROXICAM

- Perkara yang perlu dilakukan

Guna ubat anda mengikut arahan doctor. Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan AROXICAM.

AROXICAM

Meloxicam Tablets 7.5mg and 15mg

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula menggunakan sebarang ubat baharu tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan memberi AROXICAM kepada sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama dengan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera. Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Jika anda hamil, cuba hamil atau sedang menyusun badan, anda tidak digalakkan mengambil AROXICAM tanpa berbincang dengan doktor anda terlebih dahulu.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, AROXICAM boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Hematologi (darah): *Anemia* (rendah sel darah merah), gangguan kiraan darah, termasuk pengurangan abnormal bilangan sel putih, *leukocytopenia* (pengurangan sel darah putih) dan *thrombocytopenia* (kekurangan platelet dalam darah).

Reaksi hipersensitiviti: *Angio-edema* dan tindak balas hipersensitiviti serta- merta termasuk *Anaphylactoid/ anaphylactic reaction*.

Sistem Saraf Pusat (Central Nervous System): rasa pening dan sakit kepala, vertigo, tinnitus (deringan dalam telinga), mengantuk, kekeliruan.

Pernafasan: asma

Gastrosus: *Dispepsia* (ketidakhadaman), loya, muntah, sakit perut, sembelit, kembung perut dan cirit-birit, *esophagitis* (keradangan pada esofagus), *gastro-duodenal ulcer*, pendarahan perut dan usus, penembusan perut dan usus, kolitis (keradangan pada lapisan kolon/usus), hepatitis (keradangan pada hati), gastritis (keradangan pada lapisan perut).

Dermatologi (kulit): Gatal-gatal dan ruam kulit, dan *urticaria*, *Sindrom Stevens-Johnson* dan *nekrolisis epidermis toksik*, *angioedema*, tindak balas bulosa seperti *erythema multiforme*, *fotosensitiviti*.

Sistem Buah Pinggang: buah pinggang berfungsi secara tidak normal (peningkatan kreatinin serum dan / atau serum urea), kegagalan buah pinggang akut.

Gangguan Mata: Gangguan penglihatan termasuk penglihatan kabur.

Masalah Jantung dan Vaskular: Palpitasi, peningkatan tekanan darah, kemerahan kulit (*flushes*).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan AROXICAM

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Simpan di tempat kering di bawah 30 °C.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Tablet Aroxicam 7.5mg:

Tablet kuning muda, bulat, tidak bersalut, dengan garisan skor antara 'F' dan '1' dinyahbos pada satu bahagian dan kosong di sebelah lagi.

Tablet Aroxicam 15mg:

Tablet kuning muda, bulat, tidak bersalut, dengan garisan skor antara 'F' dan '2' dinyahbos pada satu bahagian dan kosong di sebelah lagi.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Meloxicam

- Bahan tidak aktif
Magnesium stearate, povidone, cellulose microcrystalline, sodium citrate, crospovidone, lactose monohydrate, silica colloidal anhydrous, purified water

- Nombor MAL

AROXICAM Tablets 7.5mg:
MAL08111909AZ

AROXICAM Tablets 15mg:
MAL08111899AZ

Pengilang

AUROBINDO PHARMA LTD.

Unit-III, Sy. No 313 314, Bachupally Village, Bachupally Mandal, Medchal Malkajgiri District, Hyderabad, Telangana, 500090, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn. Bhd.
53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tarikh kemas kini RiMUP
23/02/2026

Nombor Siri

NPRA(R2/2)240206/1203