

ONEGABA CAPSULES

Gabapentin (300mg, 400mg)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ONEGABA
2. Bagaimana ONEGABA berfungsi
3. Sebelum menggunakan ONEGABA
4. Cara menggunakan ONEGABA
5. Semasa menggunakan ONEGABA
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ONEGABA
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ONEGABA CAPSULE

ONEGABA CAPSULE digunakan:

- bersama dengan ubat-ubatan lain untuk membantu merawat sawan separa (sawan yang bermula di satu bahagian otak) dalam kalangan orang dewasa dan kanak-kanak yang berumur 3 tahun ke atas.
- untuk merawat kesakitan yang berkaitan dengan saraf dalam kalangan orang dewasa (18 tahun ke atas), sebagai contoh yang disebabkan oleh kencing manis, kayap, atau neuralgia trigeminal (sakit saraf di bahagian muka)

Bagaimana ONEGABA berfungsi

ONEGABA CAPSULE mengandungi gabapentin sebagai bahan aktif, iaitu sejenis ubat anti sawan. Gabapentin berfungsi dengan menenangkan saraf yang terlalu aktif. Ia mengurangkan isyarat elektrik berlebihan dalam otak yang mencetuskan sawan. Bagi sakit saraf, ia menghalang saraf yang rosak daripada menghantar isyarat sakit yang salah ke otak.

Sebelum menggunakan ONEGABA CAPSULE

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ONEGABA CAPSULE:

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada gabapentin atau kepada mana-mana bahan lain dalam ubat ini. (seperti yang disenaraikan dalam bahagian maklumat lanjut)

- Sebelum menggunakan

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mempunyai:

- masalah pernafasan
- penyakit buah pinggang
- keadaan saraf/otak yang lain

Kehamilan dan penyusuan

- Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang hamil, merancang untuk hamil, atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.
- Gabapentin hanya boleh digunakan semasa kehamilan jika manfaatnya melebihi risiko kepada janin.
- Gabapentin dirembeskan ke dalam susu ibu dan mungkin menjejaskan bayi anda. Doktor anda akan berbincang mengenai risiko dan manfaat penyusuan semasa anda mengambil gabapentin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil:

- Antasid yang mengandungi aluminium atau magnesium (untuk pedih ulu hati/indigestion). Ambil Gabapentin sekurang-kurangnya 2 jam selepas antasid.
- Cimetidine (untuk ulser perut/acid reflux)
- Ubat epilepsi lain
- Morfin (ubat penahan sakit jenis opioid)

Cara menggunakan ONEGABA CAPSULE

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Arahan tersebut mungkin berbeza daripada maklumat yang terdapat dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, sila minta bantuan daripada doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk epilepsi

- Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: Dos biasa adalah antara 900 mg hingga 3,600 mg sehari, dibahagikan kepada tiga dos berasingan.
- Kanak-kanak berumur 3–12 tahun: Dos akan ditentukan oleh doktor berdasarkan berat badan kanak-kanak.

Untuk sakit saraf pada orang dewasa:

- Dos permulaan biasanya ialah 300mg tiga kali sehari (jumlah 900 mg sehari).
- Doktor anda mungkin akan meningkatkan dos secara

berperingkat jika perlu, sehingga 3,600 mg sehari (dalam 3 dos berasingan).

Bagi pesakit dengan masalah buah pinggang:

Doktor anda akan melaraskan dos mengikut keadaan anda jika anda sedang menjalani hemodialisis atau mengalami masalah buah pinggang.

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi dengan teliti. Arahan tersebut mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, sila minta bantuan daripada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

- ONEGABA CAPSULE boleh diambil dengan atau tanpa makanan.
- Ambil tiga kali sehari atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.
- Ambil setiap dos tepat pada masanya dan jangan biarkan lebih daripada 12 jam antara dos.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor anda

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambilnya secepat mungkin apabila anda ingat, kecuali jika sudah hampir waktu untuk dos seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan kapsul yang berlebihan boleh menyebabkan pening, penglihatan berganda, pertuturan tidak jelas, mengantuk, lesu, dan cirit-birit ringan.

Semasa menggunakan ONEGABA CAPSULE

- Perkara yang perlu dilakukan

- Ambil ubat anda tepat seperti yang diarahkan oleh doktor.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi, dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil

ONEGABA CAPSULES

Gabapentin (300mg, 400mg)

ONEGABA CAPSULE.

- Maklumkan kepada doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Ambil ONEGABA CAPSULE hanya dengan preskripsi doktor
- Perkara yang tidak boleh dilakukan
- Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
- Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
- Jangan berkongsi ONEGABA CAPSULE dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.
- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

- Ubat ini mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika tablet ini membuat anda berasa mengantuk, pening, atau menjejaskan penglihatan anda, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.
- Jangan berhenti mengambil ONEGABA CAPSULE secara tiba-tiba, kerana penghentian secara cepat boleh menyebabkan sawan kembali.
- Berhati-hati jika mengalami masalah pernafasan semasa mengambil ubat ini. Jika ini berlaku, segera berjumpa doktor.
- Gabapentin kadang-kadang boleh menyebabkan keputusan positif palsu pada ujian protein air kencing menggunakan ujian dipstick tertentu. Ujian yang lebih tepat harus digunakan jika perlu

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ONEGABA CAPSULE boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Sangat biasa:

- jangkitan virus
- mengantuk
- pening
- kehilangan kawalan dan keseimbangan otot

Biasa:

- jangkitan pernafasan
- jangkitan saluran kencing
- jangkitan telinga tengah
- bilangan sel darah putih rendah
- gangguan selera makan
- peningkatan selera makan

- sikap agresif atau mudah marah
- perubahan emosi yang tidak menentu
- kemurungan
- kegelisahan
- rasa gementar
- berfikir tidak normal
- sawan
- peningkatan aktiviti otot
- gangguan pertuturan motor
- hilang ingatan
- gegaran
- gangguan tidur
- sakit kepala
- gangguan penglihatan seperti mata malas (penglihatan berkurang pada satu mata yang disebabkan oleh perkembangan visual yang tidak normal pada awal kehidupan) dan penglihatan berganda
- perasaan atau sensasi bahawa jantung anda berdebar atau berlumba
- rasa hilang keseimbangan
- tekanan darah tinggi, pelebaran saluran darah
- sukar bernafas
- *bronchitis* (keradangan pada saluran pernafasan)
- Faringitis (sakit tekak)
- Batuk
- Rhinitis (demam hay)
- Muntah
- Loya
- Kelainan gigi
- Gingivitis (radang gusi)
- Cirit-birit
- Sakit perut
- Gangguan Pencernaan
- Sembelit
- Mulut atau tekak kering
- Kembung perut (Kentut berlebihan)
- Pembengkakan muka
- Purpura (lebam kecil akibat trauma fizikal), ruam, gatal dan jerawat
- Sakit sendi
- Sakit otot
- Sakit belakang
- *Twitching* (pengecutan otot kecil di dalam badan)
- *incontinence* (hilang kawalan pundi kencing)
- mati pucuk (ketidakupayaan lelaki untuk mendapatkan dan mengekalkan ereksi)

Jarang

- tahap platelet rendah
- reaksi alahan
- halusinasi
- gangguan pergerakan
- berdering di telinga
- pancreatitis (keradangan pankreas)

- Alopecia (kebotakan tempat)
- Stevens-Johnson syndrome (gangguan jarang dan serius pada kulit dan selaput lendir)
- Angioedema (pembengkakan teruk di bawah kulit)
- Erythema multiforme (keadaan kulit)
- kegagalan buah pinggang akut
- Hepatitis (radang hati)
- Penyakit kuning (keadaan yang menyebabkan kulit dan putih mata menjadi kuning)
- perasaan atau sensasi jantung berdebar

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npa.gov.my [*Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*]

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini

Cara penyimpanan dan pelupusan ONEGABA CAPSULE

- Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

- Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

ONEGABA CAPSULE 300

Kapsul gelatin keras berwarna kuningIa mempunyai cetakan huruf 'D' pada penutup kuning dan '03' pada badan kuning. Kapsul ini mengandungi serbuk hablur berwarna putih hingga putih kekuningan.

ONEGABA CAPSULE 400

Kapsul gelatin keras berwarna jingga. Mempunyai cetakan huruf 'D' pada penutup jingga dan '04' pada badan jingga. Kapsul ini mengandungi serbuk hablur berwarna putih hingga putih kekuningan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Gabapentin

- Bahan tidak aktif

ONEGABA CAPSULES

Gabapentin (300mg, 400mg)

Maize starch, Purified Talc, Empty

Hard Gelatin Capsule

- Nombor MAL

MAL09020987AZ - (ONEGABA
300mg Capsules)

MAL09020988AZ - (ONEGABA
400mg Capsules)

Pengilang

AUROBINDO PHARMA LIMITED,
Unit III, Sy. No. 313 & 314,
Bachupally Mandal, Medchal -
Malkajgiri District, Telangana State,
India

Pemegang Pendaftaran Produk

UNIMED SDN BHD
No. 53, Jalan Tembaga SD5/2B
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur

Tarikh kemaskini RiMUP

27/10/2025

Nombor Siri

NPRA(R4/1)100925/00069