

PYRICORT EYE DROPS

Gentamicin / Dexamethasone (0.3% w/v / 0.1% w/v)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Pyricort
2. Bagaimana Pyricort berfungsi
3. Sebelum menggunakan Pyricort
4. Cara menggunakan Pyricort
5. Semasa menggunakan Pyricort
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Pyricort
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Pyricort

Pyricort Eye Drops membantu dalam merawat jangkitan bakteria.

Bagaimana Pyricort berfungsi

Pyricort Eye Drops tergolong dalam kumpulan ubat yang dikenali sebagai antibiotik aminoglikosida. Ubat menghentikan pertumbuhan bakteria dengan menghalang atau merawat jangkitan.

Sebelum menggunakan Pyricort

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Pyricort if:

- Jika anda alah terhadap Gentamicin atau Dexamethasone, atau mana-mana ramuan dalam produk

Mengandung dan menyusukan anak

Gentamicin hanya boleh digunakan dalam kehamilan atau laktasi apabila dianggap penting oleh doktor, selepas penilaian risiko dan manfaat yang berpotensi dengan teliti.

- Sebelum menggunakan Pyricort

Langkah-langkah pencegahan:

- Penggunaan antibiotik topical dengan masa yang panjang boleh membawa kepada penumbuhan organisma yang cepat, termasuk kulat atau bakteria tidak sensitif kepada gentamicin juga boleh berkembang. Jika keradangan semakin buruk lagi, pengguna perlu menghentikan penggunaan ubat dan berjumpa dengan doktor.

- Jika kerengsaan atau hipersensitiviti kepada mana-mana komponen ubat berlaku, pengguna perlu berhenti penggunaan penyediaan ini, dan terapi yang sesuai patut dimulakan.
- PYRICORT meningkatkan tekanan di dalam mata. Oleh itu, ia mesti diguna hanya di bawah preskripsi doktor dan pengawasan.

Amaran:

- Produk mengandungi Benzalkonium klorida; Oleh itu kanta lekap lembut tidak boleh dipakai sehingga sekurang-kurangnya 20 minit selepas menggunakan ubat ini.
- Penggunaan topical gentamicin tidak digalakkan dalam hospital dengan persekitaran tertutup.
- Persediaan ini mengandungi Sodium Metabisulphite yang boleh menyebabkan reaksi alahan yang serius kepada individu mudah jatuh sakit. Jangan gunakan jika diketahui hipersensitif kepada bisulphites.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor jika anda menggunakan sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi dari farmasi, pasaraya, atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Pyricort

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa: Titiskan 1-2 titis ke dalam mata yang terjejas setiap empat jam kalau diperlukan. (jika keadaan jangkitan yang teruk, kekerapan penjanaan boleh ditambah)

Kanak-kanak: Tiada pelarasan dos yang diperlukan oleh kanak-kanak.

Arahan untuk digunakan

- Mencuci tangan anda
- Elakkan daripada menyentuh mata (atau mana-mana permukaan lain) dengan hujung botol

- Jika anda memakai kanta lekap lembut, ia perlu dikeluarkan sebelum menggunakan titis mata dan menunggu sekurang-kurangnya 15 minit sebelum memasukkannya semula
- Ubat ini dibekalkan dalam botol tertutup. Apabila menggunakan botol pertama kali, ketatkan penutupnya ke bawah untuk menusuk hujung botol.
- Dongakkan kepala ke belakang dan melihat siling. Tarik kelopak mata bawah dengan tekan botol perlahan-lahan. Pegang botol terbalik di atas mata dan perlahan-lahan memerah botol untuk mengeluarkan setitik ke mata anda
- Pastikan mata yang terjejas tertutup dan tekan hujung jari anda daripada sudut bahagian dalam mata yang tertutup, dan tahan selama 1 minit
- Ulangi untuk mata lain jika perlu dan ketatkan penutup botol dengan segera selepas digunakan.

- Bila perlu digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Teruskan penggunaan ubat ini untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos terlepas dan tunggu untuk mengambil dos seterusnya pada masa biasa. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Oleh kerana ciri-ciri penyediaan ini bertujuan untuk kegunaan topikal, tiada kesan toksik dijangka dengan penggunaan produk ini pada dos yang disyorkan. Dalam kes berlebihan atau

pemakanan tidak sengaja daripada kandungan botol, terutamanya pada kanak-kanak, gejala ubat pelali yang memerlukan rawatan simptomatik mungkin berlaku. Dalam kes-kes ini beritahu kepada doktor atau Pusat Kawalan Racun.

Semasa menggunakan Pyricort

- Perkara yang perlu dilakukan

Ambil ubat anda mengikut arahan doktor.

Maklumkan kepada semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Pyricort

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi Pyricort dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

Ubat ini mungkin mengganggu keupayaan anda untuk memandu atau mengendalikan jentera, Jika ubat ini menyebabkan anda terasa loya, pening, letih, atau sakit kepala, jangan memandu atau mengendalikan jentera dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, Pyricort boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kerengsaan, sakit, gatal, dan pembakaran boleh berlaku, yang kadang-kadang memerlukan pemberhentian rawatan. Rawatan yang lama dengan kortikosteroid boleh meningkatkan tekanan dalam

mata. Jangkitan mata yang disebabkan oleh kulat atau mikroorganisma lain yang tidak mudah dirawat dengan antibiotic boleh berlaku, di mana ubat harus dihentikan dan langkah-langkah sewajarnya akan diambil. Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.moh.gov.my (*Consumers Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*).

Cara penyimpanan dan pelupusan Pyricort

- Penyimpanan

Jauhi semua ubat daripada kanak-kanak.

Store in a dry place, below 25°C and protect from light.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair yang jelas, tidak berwarna dalam LDPE vial yang dilabelkan.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Gentamicin sulphate (0.3W/V)

Dexamethasone sodium phosphate (0.1W/V)

- Bahan tidak aktif

Disodium edetate, Sodium didyrogen phosphate dehydrate, Sodium phosphate, Sodium metabisulphate, Creatinine, Benzalkonium chloride, Water for injection.

- Nombor MAL

MAL12020006AZ

Pengilang

FDC LIMITED,

Plot No. B-8, M.I.D.C. Industrial Area,

Waluj, Aurangabad,

431 136, Maharashtra State, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

UNIMED SDN BHD

53, Jalan Tembaga 5/2B

Bandar Sri Damansara

52200, Kuala Lumpur

Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

20/06/2019

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)100119/00006