

EURYTHMIC TABLET 200MG

Amiodarone Hydrochloride 200mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan EURYTHMIC tablet
2. Bagaimana EURYTHMIC tablet berfungsi
3. Sebelum menggunakan EURYTHMIC tablet
4. Cara menggunakan EURYTHMIC tablet
5. Semasa menggunakan EURYTHMIC tablet
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan EURYTHMIC tablet
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan EURYTHMIC tablet

Eurythmic tablet digunakan hanya untuk rawatan gangguan irama jantung yang teruk, apabila rawatan lain tidak boleh digunakan atau tidak bertindak balas untuk:

- Merawat degupan jantung tidak sekata
- Merawat lain-lain jenis degupan jantung yang laju atau tidak sekata yang dikenali sebagai 'atrial flutter' atau 'fibrilasi atrium'
- Merawat degupan jantung yang laju secara tiba-tiba dan mungkin tidak seragam
- Merawat penyakit dipanggil Sindrom Wolff-Parkinson-White. Ini adalah disebabkan oleh jantung anda yang berdegup dengan luar biasa laju.

Bagaimana EURYTHMIC tablet berfungsi

Eurythmic tablet mengandungi Amiodarone hydrochloride yang tergolong dalam kumpulan ubat-ubatan dikenali *antiarrhythmics*. Ia berfungsi dengan mengawal degupan jantung yang tidak seragam (dipanggil 'aritmia'). Mengambil tablet Cordarone boleh membantu degupan jantung anda kembali biasa.

Sebelum menggunakan EURYTHMIC tablet

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil EURYTHMIC tablet Jika:

- Anda alah (hipersensitif) terhadap *iodine*, *amiodarone*, atau mana-mana bahan-bahan lain Eurythmic tablet (yang di senaraikan dalam Seksyen 8 di bawah).
- Tanda-tanda reaksi alergi termasuk: ruam, masalah menelan atau bernafas, bengkak bibir, muka, tekak atau lidah.
- Anda mempunyai degupan jantung yang lebih perlahan daripada biasa (dipanggil '*sinus bradycardia*') atau '*sino-atrial*' blok di jantung
- Anda mempunyai masalah-masalah lain dengan degupan jantung anda dan tidak memasang perentak jantung.
- Anda pernah mempunyai masalah tiroid. Doktor perlu memeriksa tiroid anda sebelum memberikan ubat ini.
- Anda sedang mengandung atau menyusukan bayi.
- Anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain yang boleh menyebabkan gangguan irama jantung.

Jika anda berada dalam senarai menunggu pemindahan jantung, doktor anda mungkin akan mengubah rawatan anda. Ini kerana pengambilan amiodarone sebelum pemindahan jantung telah menunjukkan peningkatan risiko komplikasi yang mengancam nyawa (primary graft dysfunction), di mana jantung yang dipindahkan tidak berfungsi dengan baik dalam 24 jam pertama selepas pembedahan.

Jangan menggunakan ubat ini, jika anda mempunyai mana-mana situasi di atas berkenaan dengan anda. Jika anda tidak pasti, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Eurythmic tablet.

Sebelum menggunakan

Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Eurythmic tablet:

- Anda mempunyai masalah jantung.
- Anda mempunyai masalah hati.
- Anda mempunyai gangguan saraf.

- Anda mempunyai masalah dengan tiroid anda.
- Anda mempunyai masalah dengan paru-paru atau asma.
- Anda mempunyai masalah dengan penglihatan anda. Ini termasuk penyakit dipanggil 'radang urat saraf optik'.
- Anda berusia melebihi 65 tahun.
- Anda mempunyai perentak atau defibrilator kardioverter implan (ICD).
- Anda mempunyai intoleransi laktosa.

Jika mana-mana di atas berkenaan dengan anda, atau jika anda tidak pasti, sila berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil Eurythmic tablet.

Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi dari farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan, terutamanya:

- Ubat untuk degupan jantung tidak tetap (*arrhythmia*) contoh: quinidine, bepridil, sotalol)
- Sebarang ubat lain untuk merawat tekanan darah tinggi, terutamanya beta-blockers (atenolol, metoprolol) dan calcium channel-blockers (diltiazem, verapamil)
- Ubat untuk mencairkan darah contoh: warfarin
- Phenytoin (untuk rawatan sawan)
- Digoxin, ubat untuk merawat masalah jantung
- Diuretik (ubat untuk meningkatkan jumlah air kencing) dan amphotericin (ubat antikulat) yang boleh menyebabkan tahap rendah kalium dan magnesium di dalam darah
- Ubat pelali
- Ubat untuk menekan aktiviti imunisasi badan (contoh: ciclosporin)
- Ubat-ubatan yang lain (seperti, Vincamine, suitorpride, erythromycin IV, Pentamidine).

Cara menggunakan EURYTHMIC tablet

Berapa banyak harus digunakan
Ikuti semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Sekiranya anda tidak faham arahan pada label, minta bantuan doktor atau ahli farmasi anda.

Dos permulaan adalah 200mg tiga tablet setiap hari selama 8 hingga 10 hari.

Dos penyelenggaraan minimum adalah di antara setengah tablet hingga 2 tablet setiap hari

Bila perlu digunakan

Adalah penting untuk anda mengambil semua ubat anda seperti yang ditetapkan oleh doktor anda.

Menelan keseluruhan tablet secara oral. Jangan menghancurkan atau mengunyah tablet anda.

Berapa lama perlu digunakan

Teruskan mengambil ubat anda selagi doktor anda memberitahu anda untuk meneruskannya.

Jika terlupa menggunakan

Jangan mengambil mana-mana dos yang tertinggal. Jangan mengambil dos tambahan untuk menggantikan dos yang terlupa. Sebaliknya, teruskan jadual dos yang biasa.

Rujuk doktor atau ahli farmasi tentang apa yang perlu anda lakukan jika anda terlupa untuk menggunakannya.

Jika mengguna berlebihan (terlebih dos)

Jika anda mengambil terlebih dos, hubungi doktor anda atau jabatan kecemasan hospital terdekat dengan segera. Sila bawa ubat dengan anda. Kesan-kesan berikut boleh berlaku: degupan jantung yang terlalu perlahan atau terlalu cepat, kegagalan hati.

Semasa menggunakan EURYTHMIC tablet

Perkara yang perlu dilakukan

- Jika anda mengandung semasa anda mengambil ubat ini, sila beritahu doktor anda dengan segera.

- Jauhkan dari sinar matahari secara langsung semasa mengambil ubat ini dan beberapa bulan selepas anda selesai mengambilnya. Ini adalah kerana kulit anda akan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya matahari seperti gatal atau teruk melepuh jika anda tidak mengambil langkah berikut:

- Pastikan anda menggunakan krim pelindung matahari berfaktor pelindung tinggi
- Sentiasa memakai topi dan pakaian yang menutup tangan dan kaki anda.

Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan ubat ini melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berkongsi EURYTHMIC tablet kepada orang lain.

Hadkan jumlah alkohol yang anda minum semasa mengambil ubat ini. Ini kerana ia akan meningkatkan peluang anda mendapati masalah hati

Perkara yang perlu diberi perhatian

Kehamilan dan penyusuan

Maklumkan kepada doktor sekiranya anda mengandung, beranggapan anda telah mengandung atau bercadang untuk mengandung. Pengambilan amiodarone semasa mengandung boleh membawa bahaya kepada bayi. Eurythmic tablet adalah tidak disyorkan semasa mengandung.

Maklumkan kepada doktor sekiranya anda sedang menyusu atau bercadang untuk menyusu. Eurythmic tablet tidak disyorkan untuk digunakan untuk ibu yang sedang menyusu. Doktor anda mungkin akan pilih rawatan yang lain sekiranya anda ingin menyusu bayi anda.

Memandu dan menggunakan jentera

Penglihatan anda mungkin akan kabur selepas mengambil Cordarone. Jika ini berlaku, jangan memandu atau menggunakan mana-mana alat atau mesin.

Maklumat penting tentang beberapa bahan-bahan dalam EURYTHMIC tablet

Ubat ini mengandungi:

- Lactose (sejenis gula): Jika anda tidak boleh bertoleransi dengan lactose, sila berbincang dengan doktor anda sebelum mengambil ubat ini
- Iodine boleh menyebabkan masalah terhadap tiroid anda.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubat yang lain, ubat ini boleh mendatangkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Berhenti mengambil Captab dengan segera dan hubungi doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami sebarang kesan sampingan berikut selepas menggunakan ubat ini.

- Kalenjar tiroid terlampau aktif. Simptom termasuk berat badan berkurang, gelisah, tidak tahan panas, bergetar, berpeluh, bengkak pada leher, kadar denyutan jantung cepat
- Kalenjar tiroid kurang aktif. Simptom termasuk keletihan, lesu, kelemahan otot, kejang, rasa sejuk, kadar denyutan jantung perlahan, kulit kering dan menggelup
- Kadar denyutan jantung yang perlahan
- Loya, muntah dan perubahan dalam rasa
- Sensitif kepada cahaya — menyebabkan selaran matahari dan ruam kulit

- Peningkatan enzim hati
- Bergetar-getar, insomnia dan gangguan tidur
- Kelemahan otot, pergerakan luar kawalan atau koordinasi terjejas
- Gangguan penglihatan
- Kesukaran untuk bernafas atau kesesakan nafas

Kekerapan tidak diketahui:

- Komplikasi yang mengancam nyawa selepas pemindahan jantung (*primary graft dysfunction*) di mana jantung yang dipindahkan tidak berfungsi dengan baik.

Kesan sampingan yang tidak tersenarai di atas boleh juga berlaku pada sesetengah pesakit. Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi untuk maklumat lanjut. Jangan terkejut dengan senarai kesan sampingan ini. Anda mungkin tidak akan mengalami sebarangnya.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan EURYTHMIC tablet

Penyimpanan

Simpan jauh daripada jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Simpan di bawah suhu 30°C, dilindungi daripada cahaya

Pelupusan

Jangan membuang ubat melalui air buangan atau barangan buangan rumah. Tanya ahli farmasi cara untuk membuang ubat yang tidak digunakan lagi. Kaedah ini membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

Rupa dan warna produk

EURYTHMIC TABLET 200MG:

Tablet berwarna putih atau seolah-olah putih, bulat, rata, tepinya serong tidak bersalut dan mempunyai garisan putus pada sebelah permukaan

Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif:

Setiap Cordarone 200 mg Tablet mengandungi 200mg bahan aktif iaitu amiodarone hydrochloride.

Bahan tidak aktif:

Crospovidone, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Polyvinyl Pyrrolidone (k 30), Isopropyl Alcohol, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate.

MAL number(s):

MAL10080068AZ

Pengilang

Troikaa Pharmaceuticals Ltd.
C-1, Sara Industrial Estate, Selaqui,
Dehradun-248197, Uttarakhand,
India.

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn. Bhd.,
53, Jalan Tembaga SD5/2B, Bandar
Sri Damansara, 52200 Kuala
Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

28.01.2026

Nombor Siri

NPRA(R2/2)260128/00010