

(Lamivudine Oral Solution USP 10mg/ml)

Lamivudine (10mg/ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Lamivox
2. Bagaimana Lamivox berfungsi
3. Sebelum menggunakan Lamivox
4. Cara menggunakan Lamivox
5. Semasa menggunakan Lamivox
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Lamivox
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Lamivox

Lamivudine Oral solution digunakan untuk merawat HIV (human immunodeficiency virus) jangkitan di kalangan orang dewasa dan kanak-kanak.

Bagaimana Lamivox berfungsi

Lamivudine Oral solution sepenuhnya tidak menyembuhkan jangkitan HIV; mengurangkan jumlah virus di dalam badan anda, dan memastikan ia pada tahap yang rendah. Ia juga meningkatkan kiraan CD4 sel dalam darah anda. CD4 sel-sel jenis sel-sel darah putih yang penting dalam membantu badan anda untuk melawan jangkitan

Sebelum menggunakan Lamivox

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Lamivudine Oral solution:

- jika anda alah (hipersensitif) Lamivudine atau mana-mana bahan-bahan lain dalam Lamivudine Oral solution.

Periksa dengan doktor anda jika anda mengalami perkara ini.

- Sebelum menggunakan Lamivox

Sesetengah orang yang mengambil rawatan gabungan Lamivudine Oral solution atau lain-lain untuk HIV mempunyai lebih risiko kesan sampingan yang serius. Anda perlu menyedari risiko tambahan:

- jika anda pernah mempunyai penyakit hati, termasuk hepatitis B atau C (jika anda mempunyai

hepatitis B jangkitan, jangan berhenti Lamivudine Oral solution tanpa nasihat doktor anda, kerana hepatitis anda boleh datang kembali)

- jika anda mempunyai berat badan berlebihan yang serius (terutamanya jika anda seorang wanita)
- jika anda menghidap diabetes dan menggunakan insulin.
- jika anda atau anak anda mempunyai masalah buah pinggang, dos anda boleh diubah. Berbincang dengan doktor anda jika anda mengalami semua ini. Anda mungkin perlu pemeriksaan tambahan, termasuk ujian darah, semasa anda mengambil ubat ini.

Maklumat penting tentang beberapa bahan-bahan Lamivudine Oral solution

Jika anda adalah pesakit diabetes, sila ambil perhatian bahawa setiap ml mengandungi gula sebanyak 200.00mg.

Lamivudine Oral solution mengandungi sukrosa. Jika anda telah diberitahu oleh doktor anda bahawa anda tidak mempunyai toleransi terhadap beberapa gula, hubungi doktor anda sebelum mengambil Lamivudine Oral solution. Sukrosa boleh memudaratkan gigi. Lamivudine Oral solution juga mengandungi bahan pengawet (paraben) yang boleh menyebabkan reaksi alahan (mungkin lambat).

Mengandung

Jika anda hamil, jika anda jadi hamil atau merancang untuk hamil, berbincanglah dengan doktor anda mengenai risiko dan manfaat ubat serta risiko kepada anda dan bayi anda yang mengambil Lamivudine Oral solution.

Lamivudine Oral solution dan ubat yang sama boleh menyebabkan kesan sampingan pada bayi yang belum lahir. Jika anda hamil semasa anda mengambil Lamivudine Oral solution, bayi anda mungkin diberi pemeriksaan tambahan (termasuk ujian darah) untuk memastikan ia membesar secara normal.

Kanak-kanak yang ibu mereka mengambil NRTIs (ubat-ubatan seperti Lamivudine Oral solution) semasa mengandung mempunyai kurang risiko dijangkiti dengan HIV. Manfaat ini adalah lebih besar daripada risiko mendapat kesan-kesan sampingan.

Menyusu

Wanita yang positif HIV tidak boleh menyusukan, kerana jangkitan HIV boleh dipindahkan kepada bayi melalui susu ibu. Jika anda menyusukan bayi, atau memikirkan untuk menyusukan, berbincang dengan doktor anda dengan segera.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika anda mengambil sebarang ubat-ubatan lain, atau jika anda mengambil apa-apa baru-baru ini, termasuk ubat-ubatan herba atau ubat-ubatan lain yang anda beli tanpa preskripsi.

Jangan lupa untuk memberitahu doktor atau ahli farmasi jika anda mula mengambil ubat yang baru semasa anda mengambil Lamivudine Oral solution.

Ubat-ubatan ini tidak harus digunakan dengan Lamivudine Oral solution:

- ubat-ubatan lain yang mengandungi Lamivudine, (digunakan untuk merawat jangkitan HIV atau hepatitis B)
- bersama-sama bersama-sama trimoxazole, sejenis antibiotic, dalam dos yang tinggi. Beritahu doktor anda jika anda dirawat dengan mana-mana di atas.

Cara menggunakan Lamivox

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda dengan teliti. Ia mungkin berbeza dari maklumat di dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label ubat anda, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi.

- Bila perlu digunakan

Dewasa dan remaja lebih daripada 12 tahun :

Dos yang biasa: Lamivudine Oral solution 30 ml sehari (300 mg) yang akan diambil kira sebagai 15 ml (150 mg) dua kali sehari pada masa yang tetap, iaitu kira-kira 12 jam di antara setiap dos.

Kanak-kanak 3 bulan hingga 12 tahun : Dos biasa :Lamivudine Oral solution 4 mg / kg dua kali sehari sehingga maksimum 300 mg setiap hari. Beri setiap dos kepada anak anda pada masa yang tetap, iaitu kira-kira 12 jam di antara setiap dos.

Gunakan picagari dos oral yang dibekalkan dengan setiap pembelian pek untuk mengukur dos anda dengan tepat .

1. Keluarkan penutup botol. Simpan dengan selamat.
2. Pegang botol dengan kukuh. Tolak penyesuai plastik ke dalam leher botol
3. Masukkan picagari ke penyesuai.
4. Terbalikkan botol .
5. Tarik pelocok picagari sehingga picagari mengandungi bahagian pertama dos anda.
6. Tegakkan botol cara yang betul. Keluarkan picagari daripada penyesuai
7. Letakkan picagari ke dalam mulut anda, letakkan hujungnya pada bahagian dalam pipi anda. Perlahan-lahan tolak pelocok, untuk memberi masa untuk menelan. Jangan tolak cecair terlalu kuat hingga muncrat ke belakang tekak anda kerana anda mungkin tercekik.
8. Ulangi langkah 3 hingga 7 dengan cara yang sama sehingga anda telah mengambil dos keseluruhan anda. Sebagai contoh, jika dos anda adalah 15 ml, anda perlu mengambil sebanyak satu setengah picagari .
9. Ambil alat penyuntik daripada botol dan basuh dengan teliti dalam air bersih. Biarkan ia benar-benar kering sebelum anda menggunakannya lagi.
10. Tutup botol dengan ketat dengan penutup, dan biarkan penyesuai di tempatnya .

Jika anda atau anak anda mempunyai masalah buah pinggang, dos boleh diubah. Berbincang dengan doktor anda jika anda atau anak anda mengalami masalah ini.

Bila perlu ambil

Lamivudine Oral solution membantu untuk mengawal keadaan anda. Anda perlu terus mengambil setiap hari untuk menghalang penyakit anda menjadi semakin teruk. Anda masih boleh mendapat jangkitan dan penyakit-penyakit lain yang dikaitkan dengan jangkitan HIV.

- Berapa lama perlu digunakan Perlu berhubung dengan doktor anda, dan jangan berhenti mengambil Lamivudine Oral solution tanpa nasihat doktor anda.

Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa untuk mengambil satu dos, ambil dengan seberapa segera yang anda ingat. Kemudian teruskan rawatan anda seperti sebelum ini. Jangan ambil dos berganda untuk ganti dos yang terlepas

Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Jika terambil Lamivudine Oral solution terlalu banyak tanpa sengaja tidak akan mendatangkan sebarang masalah yang serius . Jika anda terambil terlalu banyak, beritahu doktor atau ahli farmasi anda, atau hubungi jabatan kecemasan hospital terdekat untuk mendapatkan nasihat lanjut.

Semasa menggunakan Lamivox -

Perkara yang perlu dilakukan

Perhatikan gejala-gejala penting Sesetengah orang yang mengambil ubat-ubatan untuk jangkitan HIV boleh mendapat lain-lain penyakit yang lebih serius. Anda perlu tahu dan perhatikan tentang tanda-tanda dan gejala-gejala penting semasa dalam rawatan dengan Lamivudine Oral solution.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan
Tiada

- Perkara yang perlu diberi perhatian
Tiada

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat-ubatan, Lamivudine Oral solution boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan, tetapi tidak semua orang mendapatnya.

Apabila anda sedang dirawat untuk HIV, adalah sukar untuk mengetahui sama ada simptom itu adalah gejala kesan sampingan ubat-ubatan Lamivudine Oral solution atau lain-lain ubat yang anda ambil, atau kesan penyakit HIV itu sendiri. Oleh itu, ia adalah sangat penting untuk berbincang dengan doktor anda tentang apa-apa perubahan dalam kesihatan anda.

Selain kesan-kesan sampingan yang disenaraikan di bawah untuk

Lamivudine Oral solution, lain-lain penyakit boleh timbul semasa terapi gabungan untuk HIV .

Adalah penting untuk membaca maklumat dalam seksyen ini di bawah 'Lain-lain kesan sampingan yang mungkin terjadi dari terapi gabungan untuk HIV '.

Kesan-kesan sampingan ini boleh menjejaskan sehingga kepada 1 dalam 10 orang:

1. sakit kepala
2. rasa sakit (loya)
3. sakit (muntah)
4. cirit-birit
5. perut sakit
6. keletihan, kekurangan tenaga
7. demam (suhu tinggi)
8. rasa tidak sihat
9. sakit otot dan rasa tidak selesa
10. sakit sendi
11. ruam
12. keguguran rambut (alopecia).
13. hyperlactatemia

Jika anda mendapat kesan-kesan sampingan

Beritahu doktor atau ahli farmasi jika mana-mana kesan-kesan sampingan menjadi semakin teruk atau bermasalah, atau jika anda mendapati apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Lain-lain kesan sampingan yang mungkin terjadi akibat terapi gabungan untuk HIV

Terapi gabungan seperti Lamivudine Oral solution boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain semasa rawatan untuk HIV.

Jangkitan Lama mungkin bergejolak

Pesakit jangkitan HIV(AIDS) yang lama mempunyai sistem imun yang lemah, dan lebih cenderung untuk mendapat jangkitan serius. Apabila pesakit-pesakit ini memulakan rawatan, mereka mungkin mendapati jangkitan lama bergejolak, sehingga menyebabkan tanda-tanda dan gejala radangan. Gejala-gejala ini mungkin disebabkan oleh sistem pertahanan badan yang menjadi lebih kuat, supaya badan mula untuk melawan jangkitan-jangkitan ini. Jika anda mendapat apa-apa gejala jangkitan semasa anda mengambil Lamivudine Oral solution:

Beritahu doktor anda dengan segera.

Jangan mengambil ubat-ubatan lain untuk jangkitan tanpa nasihat doktor anda.

Bentuk badan anda mungkin berubah

Pesakit yang mengambil terapi gabungan untuk HIV mungkin mendapati perubahan bentuk badan mereka, kerana perubahan dalam pengagihan lemak:

- Lemak mungkin hilang dari kaki, lengan atau muka.
- Lemak tambahan boleh membina sekitar perut (abdomen), atau di dada atau organ-organ dalaman.

Ketulan lemak (kadang-kadang dipanggil bonggol kerbau) mungkin muncul pada belakang leher. Punca yang menyebabkan perubahan-perubahan ini tidak diketahui, atau sama ada mereka mempunyai apa-apa kesan jangka panjang ke atas kesihatan anda. Jika anda perasan perubahan dalam bentuk badan anda: Beritahu doktor anda.

Asidosis laktik adalah kesan sampingan yang jarang berlaku tetapi serius

Sesetengah pesakit yang mengambil Lamivudine Oral solution, atau ubat-ubatan lain sepertinya (NRTIs), mengalami satu keadaan yang dipanggil

asidosis laktik, bersama-sama dengan hati yang membesar.

Asidosis laktik disebabkan oleh pengumpulan asid laktik dalam badan. Ianya jarang berlaku, jika ia berlaku, ia selalunya berlaku selepas beberapa bulan rawatan. Ia boleh mengancam nyawa, menyebabkan kegagalan organ-organ dalaman.

Asidosis laktik adalah lebih cenderung untuk terjadi kepada pesakit yang mempunyai penyakit hati, atau pesakit yang gemuk (berlebihan berat badan), terutamanya wanita.

Tanda-tanda asidosis laktik termasuk:

Pernafasan yang dalam, cepat dan sukar, mengantuk, kebas atau lemah badan, rasa sakit (loya), sakit (muntah), sakit perut.

Semasa rawatan, doktor anda akan memantau anda untuk tanda-tanda asidosis laktik. Jika anda mempunyai apa-apa gejala yang disenaraikan di atas, atau mana-mana gejala-gejala lain yang membimbangkan anda: Jumpa doktor anda secepat mungkin.

Jika anda melihat ada tanda-tanda ini, Beritahu doktor anda

Kesan-kesan lain mungkin ditunjukkan dalam ujian darah

Terapi kombinasi untuk HIV juga boleh menyebabkan:

- peningkatan tahap asid laktik dalam darah, yang pada masa-masa yang jarang berlaku boleh membawa kepada asidosis laktik
- peningkatan tahap gula dan lemak (trigliserida dan kolesterol) dalam darah yang resistant kepada insulin (jadi jika anda mengidap diabetes, anda mungkin perlu mengubah dos insulin anda untuk mengawal gula dalam darah anda).

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers -> Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Cara penyimpanan dan pelupusan Lamivox

- Penyimpanan

Jauhkan dari jangkauan dan penglihatan kanak-kanak

Jangan ambil Lamivudine Oral Solution selepas tarikh luput yang ditunjukkan di atas bekas.

Buang satu bulan selepas ia dibuka.

Simpan kurang daripada 30°C.

- Pelupusan

Jika anda mempunyai sebarang Lamivudine Oral solution yang tidak diperlukan, jangan lupuskan melalui air kumbahan atau pembuangan isi rumah.

Tanya ahli farmasi anda cara untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak lagi diperlukan. Langkah-langkah ini akan membantu untuk melindungi alam sekitar..

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Cecair jernih, tanpa warna atau kuning pucat, berperisa strawberi pisang

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif
Bahan-bahan
Bahan aktif adalah Lamivudine Bahan-bahan lain: sukrosa, Propylene glycol, metil paraben, propyl paraben, asid sitrik anhydrous, natrium sitrat, strawberi rasa cecair, pisang perisa cecair, dan air yang ditapis

- Nombor MAL

MAL 12065069AZ

Pengilang

Aurobindo Pharma Ltd.
Unit III, Sy.No. 313 & 314,
Bachupally, Bachupally Mandal,
Medchal-Malkajgiri District,
Telangana state, INDIA.

Pemegang Pendaftaran Produk

UNIMED SDN BHD
No.53 Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini RiMUP

Ogos 2023