

MYCODERM – C POWDER

Clotrimazole (1% w/w)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Mycoderm C
2. Bagaimana Mycoderm C berfungsi
3. Sebelum menggunakan Mycoderm C
4. Cara menggunakan Mycoderm C
5. Semasa menggunakan Mycoderm C
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Mycoderm C
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Mycoderm C

Mycoderm C digunakan untuk merawat jangkitan kulat dan yis pada kulit.

Bagaimana Mycoderm C berfungsi

Mycoderm C mengandungi bahan aktif clotrimazole, iaitu antikulat, yang merawat jangkitan kulat dan yis pada kulit.

Sebelum menggunakan Mycoderm C

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan Mycoderm C jika:

- anda alah kepada clotrimazole, atau mana-mana bahan lain yang terkandung dalam ubat ini (disenaraikan dalam Penerangan Produk).
- Sebelum mula menggunakan.

Mengandung dan menyusukan anak.

Sila dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi anda jika anda hamil, merancang untuk mengandung atau menyusu bayi sebelum menggunakan sebarang ubat.

Mycoderm C hanya boleh digunakan semasa kehamilan di bawah pengawasan anggota kesihatan.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang anda beli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Cara menggunakan Mycoderm C

- Berapa banyak harus digunakan

Jika Mycoderm C telah diberikan untuk anda oleh doktor anda, ikuti arahan yang diberikan kepada anda.

Jika anda membeli produk ini tanpa preskripsi, ikut arahan ini dengan teliti:

Serbuk hendaklah ditaburkan pada kawasan yang terjadi jangkitan. Serbuk juga boleh diletakkan pada bahagian dalam pakaian dan kasut yang bersentuhan dengan kawasan yang dijangkiti.

- Bila perlu digunakan

Gunakan 2 hingga 3 kali sehari. Penggunaan tetap adalah penting untuk rawatan yang berkesan.

- Berapa lama perlu digunakan

Rawatan perlu diteruskan sehingga hilang semua tanda jangkitan untuk mengelakkan jangkitan semula.

Gejala jangkitan seperti gatal-gatal atau pedih, akan bertambah baik dalam beberapa hari rawatan walaupun tanda-tanda seperti kemerahan dan mengelupas mungkin mengambil masa lebih lama untuk hilang. Rujuk doktor jika tidak bertambah baik (untuk *athlete's foot*) atau (untuk *jock itch*).

- Jika terlupa menggunakan

Sapukan dos yang tertinggal sebaik sahaja anda teringat. Sekiranya sudah hampir masa untuk dos seterusnya, abaikan dos yang tertinggal dan kemudian teruskan menyapu ubat mengikut jadual seperti biasa. Jangan sapukan dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil secara berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda atau sesiapa sahaja mungkin menggunakan terlalu banyak ubat ini atau termakan ubat ini secara tidak sengaja. Lakukan ini walaupun terdapat tiada tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa menggunakan Mycoderm C

- Perkara yang perlu dilakukan

Gunakan ubat anda seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Mycoderm C.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Anda boleh membantu proses penyembuhan dengan lebih cepat melalui tips-tips di bawah:

- Pastikan kawasan kulit yang dijangkiti sentiasa bersih.
- Beri perhatian khusus dengan memastikan kulit sentiasa dikeringkan, tetapi elakkan menggosok secara berlebihan.
- Kebersihan kulit juga penting dalam pengurusan jangkitan kulat, terutamanya pelipat dan kaki.
- Sentiasa basuh tangan anda selepas merawat jangkitan untuk mengelakkannya daripada merebak

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berkongsi tuala, alas kaki, dsb. dengan orang lain kerana anda boleh merebakkan jangkitan kepada mereka.

Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan sebarang ubat baharu tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Mycoderm C kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Serbuk Mycoderm C adalah untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan masukkan serbuk ke dalam mulut anda atau telan.

Sentiasa basuh tangan anda dengan segera selepas menggunakan ubat ini supaya anda tidak memindahkannya ke kawasan sensitif seperti bibir atau mata anda. Jika ini berlaku, bilas dengan air bersih.

Walaupun kawasan jangkitan akan gatal, elakkan daripada menggaru. Menggaru akan merosakkan permukaan kulit dan menyebabkan jangkitan semakin merebak.

Kesan-kesan sampingan

Serbuk Mycoderm C boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Sesetengah orang mungkin mengalami kesan sampingan yang jarang berlaku

MYCODERM – C POWDER

Clotrimazole (1% w/w)

seperti rasa kulit terbakar atau
kerengsaan kulit.

Beritahu doktor anda dengan segera
jika anda mengalami mana-mana kesan
di atas atau bertindak balas dengan
teruk kepada serbuk yang tidak
disenaraikan dalam risalah ini, beritahu
doktor atau ahli farmasi anda dengan
segera.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan
sampingan atau kesan advers ubat
kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers
Ubat Kebangsaan melalui laman web
npra.gov.my [*Consumers → Reporting
Side Effects to Medicines (ConSERF) or
Vaccines (AEFI)*]

Cara penyimpanan dan pelupusan Mycoderm C

- Penyimpanan

Simpan di tempat kering yang dingin di
suhu 30°C, terlindung daripada cahaya.

Pastikan bekas ditutup dengan rapat.

Jauhi daripada kanak-kanak.

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan
melalui air buangan atau sisa isi rumah.
Sila rujuk kepada ahli farmasi anda
mengenai cara yang betul untuk
melupuskan ubat yang tidak diperlukan
lagi. Langkah-langkah ini dapat
membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

Serbuk putih atau putih pucat dengan bau
yang menyenangkan.

- Bahan-bahan Kandungan

- Bahan Aktif:

Clotrimazole 1% w/w

- Bahan Tidak Aktif:

*Colloidal Silicon Dioxide (Aerosil),
Sandal P-4114-A, Starch and Purified
Talc*

- Nombor MAL:

MAL07090895XZ

Pengilang

FDC LIMITED

B-8, MIDC Industrial Area, Waluj,
Aurangabad, Maharashtra, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

UNIMED SDN BHD

53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemas kini RiMUP

10/10/2023

Nombor Siri

NPRA(R4/1)101023/00082