

ALLOR (LORATADINE ORAL SOLUTION 5MG/5ML USP)

Loratadine (5mg/5ml)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ALLOR
2. Bagaimana ALLOR berfungsi
3. Sebelum mengambil ALLOR
4. Cara menggunakan ALLOR
5. Semasa menggunakan ALLOR
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ALLOR
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ALLOR

Allor digunakan untuk melegakan gejala rinitis alergi pada orang dewasa dan kanak-kanak berusia lebih daripada 2 tahun, yang merangkumi:

- bersin
 - hidung yang jengkel, berair atau tersumbat
 - mata rasa gatal, merah dan berair
- Ia juga digunakan untuk melegakan gejala alahan kulit pada orang dewasa dan kanak-kanak (berumur lebih dari 2 tahun), yang merangkumi:
- ruam, gatal-gatal dan urtikaria (gatal-gatal)

Bagaimana ALLOR berfungsi

Allor tergolong dalam kumpulan ubat yang dipanggil antihistamin. Ia berfungsi dengan bertindakbalas kesan histamin yang dihasilkan secara semula jadi oleh sistem pertahanan badan anda, tetapi mungkin berlebihan dalam reaksi alergi

Sebelum mengambil ALLOR

-Bila tidak boleh mengambil

- Jangan gunakan ALLOR jika:
- alergi terhadap *loratadine*, atau bahan-bahan lain dalam ubat ini
 - hamil atau merancang untuk hamil.
 - menyusui bayi, kerana *loratadine*

boleh masuk ke dalam susu ibu.

Kehamilan dan penyusuan bayi

Jangan mengambil ubat ini jika anda hamil atau jika anda menyusui

Kanak-kanak

Jangan berikan Allor kepada kanak-kanak yang berumur kurang dari 2 tahun.

-Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil, baru-baru ini mengambil atau mungkin mengambil ubat lain, termasuk ubat yang diperoleh tanpa preskripsi. Terdapat beberapa ubat yang boleh meningkatkan risiko kesan sampingan.

Terutamanya, beritahu doktor anda jika anda mengambil salah satu ubat berikut:

- *cimetidine* (untuk masalah perut)
- *erythromycin* (antibiotik)
- *ketoconazole* atau *fluconazole* (untuk jangkitan kulat)

Cara menggunakan ALLOR

-Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa minum ubat ini sama seperti yang dijelaskan dalam risalah ini atau seperti yang diberitahu oleh doktor, ahli farmasi atau jururawat anda. Tanyakan kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti. Penting untuk mengetahui berapa berat anak anda untuk memastikan bahawa anda memberikan jumlah ubat yang betul. Sekiranya ragu-ragu timbang anak anda dan ikuti arahan di jadual.

Allor hanya boleh diminum melalui mulut dan tidak boleh diberikan kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun.

Cawan pengukur yang disediakan

boleh mengukur 10 ml ubat anda. Goncangkan botol dengan baik sebelum digunakan. Dos biasa adalah:

Kanak-kanak berumur 2 hingga 12 tahun yang beratnya 30 kg atau kurang: 5 ml sekali sehari

Kanak-kanak berumur 2 hingga 12 tahun yang beratnya melebihi 30 kg: 10 ml sekali sehari

Dewasa dan kanak-kanak berumur lebih dari 12 tahun: 10ml sekali sehari

Sekiranya anda mempunyai masalah hati yang serius, doktor atau ahli farmasi mungkin akan menasihati anda untuk mengambil jumlah yang disyorkan selang sehari. Sekiranya ini berlaku untuk anda ikuti arahan mereka.

-Bila perlu digunakan

Ambil ubat anda seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi.

-Berapa lama perlu digunakan

ALLOR harus digunakan selagi doctor anda mengesyorkan ubat ini.

-Jika terlupa menggunakan

Sekiranya anda terlupa mengambil dos, ambil ia secepatnya anda ingati, kecuali sudah hampir waktunya untuk dos seterusnya. Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikan dos yang dilupakan.

-Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Sekiranya anda atau anak anda telah mengambil terlalu banyak ubat ini, berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi dengan segera. Anda atau anak anda mungkin akan berasa mengantuk, sakit kepala atau

ALLOR (LORATADINE ORAL SOLUTION 5MG/5ML USP)

Loratadine (5mg/5ml)

degupan jantung yang cepat

Semasa menggunakan ALLOR

-Perkara yang perlu dilakukan

Beritahu doktor anda:

- Sekiranya anda mengandung ketika mengambil ubat ini
- bakal memulakan rawatan dengan ubat baru lain.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti mengambil ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.

Jangan memberi rawatan anda kepada orang lain, walaupun anda mengesyaki bahawa mereka mengalami gejala yang sama seperti anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin Allor biasanya tidak menyebabkan rasa mengantuk pada dos yang disyorkan. Walau bagaimanapun, kesan pada individu berlainan adalah bertindak balas secara berbeza, jadi disyorkan jangan memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda tahu bagaimana ia mempengaruhi anda

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya.

Bengkak pada muka, mulut, bibir atau tekak boleh menjadi tanda reaksi alergi. Sekiranya ini berlaku kepada anda, Hentikan pengambilan Allor dan beritahu doktor anda dengan segera, atau pergi ke hospital terdekat. Bawa botol itu jika anda boleh.

Kesan sampingan yang sangat jarang berikut juga telah dilihat semasa pemasaran loratadine:

- reaksi alahan yang teruk
- pening
- degupan jantung yang cepat atau tidak teratur
- loya (berasa sakit)
- mulut kering
- Sakit perut
- masalah hati
- keguguran rambut
- ruam
- penat

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui, atau laman web npra.gov.my [Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)].

Cara penyimpanan dan pelupusan ALLOR

-Penyimpanan

- Simpan ALLOR di bawah 30°C.
- Jauhi daripada kanak-kanak.

-Pelupusan

Jangan buang ubat-ubatan melalui air buangan atau sampah isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana cara untuk membuang ubat yang tidak lagi anda gunakan. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut

-Rupa dan warna ALLOR

Sirup berwarna oren dengan rasa oren

-Bahan-bahan kandungan

Bahan aktif: Loratadine

Bahan tidak aktif:
Refined sugar, glycerine,

propylene glycol, sodium benzoate, citric acid monohydrate, colour sunset yellow supra, essence sweet orange dan purified water

-Nombor MAL:

MAL21046021ACZ

Pengilang

XL Laboratories Pvt. Ltd., E-1223, Phase-I, Extn. (Ghatal), RIICO Industrial Area, Bhiwadi-301019, Dist. Alwar (Raj.), INDIA

Pemegang Pendaftaran Produk / Pengimport

Unimed Sdn Bhd
No.53, Jalan Tembaga SD 5/2B, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur

Tarikh kemaskini RiMUP
07/11/2023

Nombor siri

NPRA (R2) 20/103