

IOBRIM 0.15% w/v EYE DROPS

(Brimonidine Tartrate)

Apa yang ada dalam risalah ini

1. Apa kegunaan IOBRIM
2. Bagaimana IOBRIM berfungsi
3. Sebelum mengambil IOBRIM
4. Cara menggunakan IOBRIM
5. Semasa menggunakan IOBRIM
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan IOBRIM
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang pendaftaran produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apa Kegunaan IOBRIM

IOBRIM digunakan untuk mengurangkan tekanan dalam mata.

Bagaimana IOBRIM berfungsi

Ia boleh digunakan sama ada bersendirian, apabila titis mata *beta-blocker* di kontradiksi, atau dengan ubat titis mata lain, apabila ubat tunggal tidak cukup untuk menurunkan tekanan yang meningkat dalam mata, dalam rawatan *glaukoma open angle* atau hipertensi okular

Sebelum menggunakan IOBRIM

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan gunakan IOBRIM

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada IOBRIM atau mana-mana bahan-bahan lain IOBRIM
- Jika anda sedang menyusukan bayi.

- Sebelum menggunakan IOBRIM

Sebelum anda menggunakan ubat ini, beritahu doktor anda:

Jika anda menderita atau mengalami kemurungan, kurang keupayaan mental, kekurangan bekalan darah ke otak, masalah jantung, bekalan darah yang terganggu daripada anggota badan atau penyakit tekanan darah.

- Jika anda mempunyai atau telah mempunyai masalah buah pinggang atau hati masa lalu.
- Jika diberikan untuk kanak-kanak yang berumur di antara 2 dan 12 tahun kerana IOBRIM tidak digalakkan untuk digunakan dalam kumpulan umur ini.
- Mengandung dan menyusu

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk nasihat sebelum mengambil sebarang ubat. Beritahu doktor anda sekiranya anda hamil atau merancang untuk mengandung. IOBRIM tidak boleh digunakan semasa menyusukan bayi.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau telah baru-baru ini menggunakan apa-apa ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi.

Beritahu doktor anda jika anda mengambil mana-mana ubat-ubatan berikut:

- Ubat bius, sedatif, opiat, barbiturat atau kerap minum arak.
- Dadah yang menghalang reseptor beta (titis mata dan ubat makan), ubat-ubatan yang mengurangkan tekanan darah dan / atau *cardiac glycosides*
- Antidepresan kumpulan Tricyclic
- Jika dos sebarang ubat-ubatan yang sedang diambil ditukar. Ini boleh menjejaskan rawatan anda dengan IOBRIM.

Bagaimana menggunakan IOBRIM

Berapa banyak harus digunakan

Sentiasa gunakan IOBRIM tepat seperti yang doktor anda telah memberitahu anda. Anda perlu menyepak dengan doktor atau ahli farmasi anda sekiranya anda tidak pasti.

Titiskan satu titisan pada mata yang terjejas 3 kali sehari, kira-kira 8 jam selang

- Apabila menggunakannya

Untuk lebih berkesan IOBRIM mesti digunakan setiap hari.

- Berapa lama untuk menggunakannya

Jangan berhenti menggunakan IOBRIM sehingga doktor anda memberitahu anda untuk.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan produk ini, bertanya kepada doktor atau ahli farmasi anda.

- Jika anda terlupa menggunakannya

Jika anda terlupa untuk mengambil satu dos, gunakan sebaik sahaja anda ingat. Jika, ia adalah hampir masa untuk dos seterusnya, anda perlu meninggalkan dos yang tertinggal sama sekali dan kemudian ikut rutin biasa anda.

- Jika anda menggunakan terlalu banyak (berlebihan)

Dewasa

Tidak ada kes penggunaan berlebihan di kalangan orang dewasa menggunakan IOBRIM. Ini tidak mungkin apabila diberi sebagai titis mata.

Jika IOBRIM telah sengaja ditelan atau jika anda telah menggunakan IOBRIM lebih dari yang seharusnya, sila hubungi doktor anda dengan segera

Semasa menggunakan IOBRIM

- Perkara yang perlu dilakukan

Arahan untuk penggunaan

IOBRIM adalah ubat titis mata. Basuh tangan anda sebelum menggunakan titis mata. Label preskripsi anda memberitahu anda berapa banyak titisan untuk digunakan pada setiap dos. Jika anda menggunakan IOBRIM dengan lain ubat titisan mata, tunggu 5 minit sebelum menggunakan titisan mata kedua.

Guna titis mata anda dengan cara yang berikut:

1. Dongakkan kepala ke belakang dan melihat siling.
2. Perlahan-lahan tarik kelopak mata lebih rendah ke bawah sehingga terdapat poket kecil.
3. Letakkan penitis di atas mata dan picit botol perlahan-lahan untuk mengeluarkan titisan ke dalam mata.
4. Lihat ke bawah dan tutup perlahan-lahan mata anda selama 1 hingga 2 minit. Tekan jari anda pada sudut dalam mata yang tertutup, dan tahan selama 1 minit.
5. Cuba jangan berkelip dan jangan gosok mata.
6. Ulangi langkah di atas untuk mata sebelah jika perlu.
7. Tutup dan ketatkan penutup selepas digunakan.

IOBRIM 0.15% w/v EYE DROPS

(Brimonidine Tartrate)

Elakkan daripada menyentuh hujung penitis terhadap mata. Tutup dan ketatkan penutup selepas digunakan.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Memandu dan menggunakan mesin

- IOBRIM boleh menyebabkan penglihatan kabur atau tidak normal. Kesan ini mungkin kelihatan lebih teruk pada waktu malam atau dalam pencahayaan rendah.
- IOBRIM juga boleh menyebabkan rasa mengantuk atau keletihan dalam sesetengah pesakit.
- Jika anda mengalami mana-mana gejala-gejala ini, jangan memandu atau menggunakan jentera sehingga tanda-tanda hilang.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau mesin digunakan. Jika tablet membuat anda merasa sakit, pening atau letih, atau memberikan anda sakit kepala, tidak memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.

Kesan-kesan sampingan

Kesan-kesan sampingan: konjunktivitis alahan, hyperemia konjunktiva, dan pruritus mata.

Kesan buruk: rasa terbakar, kehadiran folikel limfa dalam jumlah yang besar (folliculosis konjunktiva), tekanan darah tinggi, kekeringan mulut, dan gangguan visual.

Peristiwa: alergi reaksi, lemah (asthenia) keradangan kronik kelopak mata (blepharitis), bronkitis, edema, konjunktiva, pendarahan konjunktiva, konjunktivitis, batuk, pening, pencernaan yang terganggu, nafas yang sulit, epiphora, pelepasan mata, kekeringan mata, kerengsaan mata, sakit mata, kelopak mata edema, erythema kelopak mata, sindrom selesema, konjunktivitis folikel, sensasi badan asing, sakit kepala, sakit tekak, fotofobia, ruam, rinitis, jangkitan sinus, resdung, rasa pedih, superficial punctate keratopathy, kecacatan medan penglihatan, *floaters vitreous* (debris kecil dalam vitreous mata), dan bertambah buruk ketajaman

penglihatan.

Reaksi buruk berikut katanya: hakisan kornea, insomnia, kekeringan hidung, sifat tidur, perubahan rasa.

Jika anda mendapat mana-mana kesan sampingan, beritahu doktor dan ahli farmasi anda. Ini termasuk mana-mana kesan sampingan yang mungkin tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my (Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)).

Cara Penyimpanan dan Pelupusan IOBRIM EYE DROP

Penyimpanan

Simpan di bawah 30°C. Untuk mengelakkan pencemaran titis mata simpan di bekas yang sentiasa ditutup. Jangan sentuh hujung penitis untuk mana-mana permukaan.

Kandungan adalah steril jika meterai masih utuh.

JAUHKAN DARI KANAK-KANAK.

Selepas pembukaan: Simpan di bawah 30°C. Buang kandungan 28 hari selepas membuka botol.

Pelupusan


Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau buangan isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat-ubatan yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan Warna Produk

Setiap botol mengandungi 5ml **IOBRIM EYE DROP**. Ubat anda adalah cecair jernih berwarna hijau-kekuningan.

Cara-cara mengguna:



Bahan-bahan Kandungan

Bahan aktif
Brimonidine Tartrate Ph. Eur.

Bahan tidak aktif
Benzalkonium Chloride Ph. Eur. (As preservative)
Aqueous Buffered (As Vehicle)

Nombor MAL:
MAL*****

Pengilang

FDC Limited
B-8, MIDC Industrial Area, Waluj,
Aurangabad- 431 136, Maharashtra

Pemegang Pendaftaran Produk

UNIMED SDN BHD
53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh Kemaskini
19/11/2021

Nombor Siri: NPRA(R2)21/061