OCUDOR-T (Dorzolamide and Timolol Eye Drop BP)

Dorzalamide Hydrochloride 20mg/mL /Timolol Maleate 5mg/mL

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Ocudor-T Eye Drops
2. Bagaimana Ocudor-T Eye Drops berfungsi
3. Sebelum menggunakan Ocudor-T Eye Drops
4. Cara menggunakan Ocudor-T Eye Drops
5. Semasa menggunakan Ocudor-T Eye Drops
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Ocudor-T Eye Drops
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan pemegang Pendaftaran produk
10. Tarikh kemas kini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan Ocudor-T Eye Drops

Ocudor-T Eye Drops terdiri dari dua komponen.Dorzolamide hydrochloride dan Timolol maleate.Dorzolamide tergolong dalam golongan ubat-ubatan "*carbonic anhydrase inhibitors*". Timolol tergolong dalam golongan ubat-ubatan "*beta blockers*".

Bagaimana Ocudor-T Eye Drops berfungsi

Setiap dua komponen ini menurunkan tekanan intraokular yang tinggi, sama ada atau tidak berkaitan dengan glaukoma, dengan mengurangkan rembesan cecair di mata.

Sebelum menggunakan Ocudor-T Eye Drops

- *Bila tidak boleh menggunakan*

Jangan mengambil Ocudor-T Eye Drops jika:

- Jika anda alah kepada dorzolamide dan timolol atau mana-mana bahan lain ubat ini.
- Sekiranya anda mengalami masalah pernafasan yang lalu, seperti asma atau bronkitis obstruktif kronik yang teruk (penyakit paru-paru yang teruk yang boleh menyebabkan kesukaran bernafas, sukar bernafas dan / atau batuk yang berpanjangan).
- Jika anda mempunyai degupan jantung perlahan, kegagalan jantung atau gangguan irama jantung (rentak jantung yang tidak teratur).

Sekiranya ini berlaku untuk anda, beritahu doktor anda dengan segera dan jangan gunakan Ocudor-T Eye Drops.

- *Sebelum anda mula menggunakkan*

Berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda sebelum menggunakan Ocudor-T Eye Drops jika anda:

- Mempunyai sejarah kegagalan jantung
- Menghidap penyakit paru-paru
- Menghidap Diabetes
- Terlalu banyak aktiviti kelenjar tiroid
- Akan menjalani pembedahan
- Pakai kanta lekap

- *Sebelum mengambil ubat lain*

Beritahu doktor anda jika anda menggunakan atau berhasrat untuk menggunakan ubat lain untuk menurunkan tekanan darah, ubat jantung atau ubat-ubatan untuk merawat diabetes.

- *Sebelum anda mula menggunakkan*

Beritahu doktor anda jika anda mengambil:

- Mengambil ubat untuk menurunkan tekanan darah, merawat penyakit jantung atau degupan jantung yang tidak teratur (seperti penyekat saluran kalsium, penyekat beta-adrenergik atau beta-blocker)
- Menggunakan titisan mata lain yang mengandungi beta-blocker
- Mengambil ubat lain di bawah perencat anhidrase karbonik seperti asetazolamida.
- Mengambil quinidine (digunakan untuk merawat keadaan jantung dan beb
- Mengambil inhibitor pengambilan serotonin Selektif (SSRI) yang digunakan untuk merawat keadaan psikologi.rapa jenis Malaria).
- Mengambil ubat yang mengubah neurotransmitter (Catecholamine depleting drug).
- Ubat untuk merawat tekanan darah tinggi (Clonidine)

Cara menggunakan Ocudor-T Eye Drops

- *Berapa banyak harus digunakan*

Dos adalah satu titis sedian pada mata yang terjejas dua kali sehari.

Sekiranya lebih daripada satu ubat oftalmik topikal digunakan, ubat harus diberikan jarak sekurang-kurangnya sepuluh minit.

Jangan biarkan hujung bekas menyentuh mata atau kawasan di sekitar mata. Ia mungkin tercemar dengan bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan mata yang menyebabkan kerosakan mata yang serius, bahkan kehilangan penglihatan. Untuk mengelakkan kemungkinan pencemaran bekas, basuh tangan anda sebelum menggunakan ubat ini dan jauhkan hujung bekas daripada bersentuhan dengan permukaan mana pun. Sekiranya anda fikir ubat anda mungkin tercemar, atau jika anda mengalami jangkitan mata, segera hubungi doktor anda mengenai penggunaan bekas ini secara berterusan.

Ocudor-T Eye Drops tidak digalakkan digunakan pada kanak-kanak di bawah umur 2 tahun.

- *Bila perlu digunakan*

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- *Berape lama perlu digunakan*

Terus mengambil Ocudor-T Eye Drops selama yang disyorkan oleh doktor anda.

- *Jika terlupa untuk menggunakkan*

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda mengenai perkara yang harus anda lakukan sekiranya anda lupa menggunakannya.

Ambil dos yang terlupa sebaik sahaja anda ingat. Sekiranya sudah hampir masanya untuk dos seterusnya, tunggu sehingga mengambil ubat dan abaikan dos yang terlupa. Jangan mengambil dos berganda untuk menggantikkan dos yang terlupa.

- *Jika menggunakkan berlebihan (terlebih dos)*

Segera hubungi doktor anda atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah mengambil terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tidak ada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Semasa menggunakan Ocudor-T Eye Drops

Perkara yang perlu dilakukan
Gunakan ubat anda dengan tepat sebagaimana doktor anda telah memberitahu anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda menggunakan Ocudor-T Eye Drops.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda menjadi hamil semasa menggunakan ubat ini.

-Perkara yang tidak boleh dilakukan
Jangan berhenti menggunakan ubat ini melainkan dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

-Perkara yang perlu diberi perhatian

Kehamilan dan penyusuan
Jangan gunakan Ocudor -T Eye Drops jika anda hamil, cuba hamil atau menganggap anda mungkin hamil kecuali jika doktor anda menganggapnya perlu.

Jangan gunakan Ocudor -T Eye Drops jika anda menyusu. Minta nasihat doktor atau ahli farmasi anda sebelum mengambil sebarang ubat.

Memandu dan menggunakan jentera
Tidak ada kajian mengenai kesan keupayaan memandu atau menggunakan mesin yang dilakukan. Terdapat kesan sampingan dengan Ocudor -T Eye Drops, seperti penglihatan kabur, yang boleh mempengaruhi kemampuan anda untuk memandu dan / atau mengendalikan mesin. Jangan memandu atau mengendalikan mesin sehingga anda merasa sihat atau penglihatan anda jelas.

Kesan-kesan sampingan
Seperti semua ubat-ubat yang lain, ubat ini boleh mendatangkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang akan mengalaminya.

Berhenti menggunakan Ocudor -T Eye Drops dengan segera dan hubungi doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengalami kesan sampingan berikut setelah menggunakan ubat ini.

Kesan sampingan:
- Pesongan rasa (rasa pahit, manis, tidak biasa)
- Mata pedih
- Gatal mata
- Penglihatan kabur
- Mata berair / merah
- Mata sensitif terhadap cahaya
- Konjungtivitis

Sekiranya ada kesan sampingan yang serius, atau jika anda melihat kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini, sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumer → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan Ocudor-T Eye Drops

-Penyimpanan
Simpan jauh daripada jangkauan dan penglihatan kanak-kanak.

Sebelum dibuka: Jangan simpan pada suhu melebihi 30^{O}C. Lindungi dari Cahaya.
Selepas dibuka: Simpan pada suhu dibawah 25^{O}C. Buang selepas 28 hari pembukaan pertama.

-Pelupusan
Jangan membuang ubat melalui air buangan atau barangan buangan rumah. Tanya ahli farmasi cara untuk membuang ubat yang tidak digunakan lagi. Kaedah ini membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat Lanjut
Rupa dan warna produk
Larutan jernih, tidak berwarna, sedikit likat, praktikal bebas dari zarah yang kelihatan.

Bahan-bahan kandungan
-Bahan aktif:
Dorzolamide Hydrochloride and Timolol Maleate
-Bahan tidak aktif:
Hydroxy Ethyl Cellulose Ph. Eur, Mannitol Ph. Eur., Sodium Citrate Ph. Eur., Sodium Hydroxide Ph. Eur, Water for Injection Ph. Eur.

-Nombor MAL:
xxxxxx

Pengilang
FDC LIMITED
B-8, MIDC Area, Waluj- 431 136
Dist. Aurangabad Maharashtra India.

Pemegang Pendaftaran Produk
Unimed Sdn. Bhd.,
53, Jalan Tembaga SD5/2B, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
05.05.2023

Nombor Siri
NPRA (R2) 21/116