PGB Pregabalin Capsules

Pregabalin Kapsul 75 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan PGB Kapsul
2. Bagaimana PGB Kapsul berfungsi
3. Sebelum menggunakan PGB Kapsul
4. Cara menggunakan PGB Kapsul
5. Semasa menggunakan PGB Kapsul
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan PGB Kapsul
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor Siri

Apakah kegunaan PGB Kapsul

Kesakitan sistem saraf

Pregabalin digunakan untuk merawat kesakitan sistem saraf periferi dan pusat dalam pesakit dewasa.

Epilepsi

Pregabalin digunakan untuk terapi adjung dalam rawatan sawan separa dengan atau tanpa generalisasi sekunder dalam pesakit dewasa.

Gangguan keresahan umum

Pregabalin digunakan untuk rawatan Gangguan Keresahan Umum (GAD) dalam pesakit dewasa

Bagaimana PGB Kapsul berfungsi

LYRICA mengurangkan bilangan isyarat saraf dan membantu untuk menenangkan sel-sel saraf yang terlalu sensitif.

Sebelum menggunakan PGB Kapsul

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan ambil Kapsul PGB jika anda :

- Jika anda alah kepada Kapsul PGB atau mana-mana bahan lain ubat ini (disenaraikan dalam bahagian bahan-bahan)

Jika anda tidak pasti tentang pekara ini, berunding dengan doktor,ahli farmasi atau jururawat anda sebelum mengambil ubat ini .

- Sebelum mula menggunakan PGB Kapsul

Jangan ambil kapsul PGB jika:

- mengalami atau pernah mengalami kemurungan, masalah perasaan atau pemikiran atau kelakuan membunuh diri
- mempunyai masalah buah pinggang atau mendapat dialisis buah pinggang
- mempunyai masalah jantung termasuk kegagalan jantung
- pernah bengkak di bahagian muka, mulut (lidah, bibir, gusi) dan leher (tekak dan larinks; angioedema)
- sedang atau pernah mengalami ketidakhadaman kepada susu atau produk tenusu (tak tolerans laktosa).
- Jika anda menghidap diabetes, anda mungkin mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk penambahan berat badan semasa tempoh rawatan
- Jika anda mempunyai masalah berkaitan penglihatan
- pernah menyalahgunakan atau mengalami episod penyalahgunaan dan kebergantungan ubat (tingkah laku pencarian ubat) pada masa lalu
- Jika anda mempunyai masalah sedia ada yang berkaitan dengan kedua –dua perut dan usus.

- Kehamilan dan penyusuan

Tidak diketahui sama ada PGB Kapsul akan membahayakan bayi dalam kandungan anda. Anda dan penyedia penjagaan kesihatan anda hendaklah membuat keputusan sama ada anda perlu mengambil PGB Kapsul semasa anda hamil.

PGB Kapsul diketahui meresap ke dalam susu ibu, tetapi tidak diketahui sama ada ia boleh membahayakan bayi anda. Anda dan penyedia penjagaan kesihatan anda hendaklah berbincang sama ada anda perlu mengambil PGB Kapsul atau menyusukan anak, tetapi anda tidak boleh melakukan kedua-duanya sekali.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang mengambil , baru – baru ini mengambil atau mungkin mengambil sebarang ubat lain.Ini termasuk ubat-ubatan herba dan makanan tambahan

Ini kerana kapsul PGB boleh menjejaskan cara sesetengah ubat lain berfungsi.Juga beberapa ubat lain boleh menjejaskan cara Kapsul PGB berfungsi.

- Sebarang ubat yang boleh menyebabkan anda mengantuk
- PGB kapsul mungkin meningkatkan kesan ethanol dan lorazepam.
- PGB kapsul tampaknya berupaya meningkatkan kesan tertentu (gangguan proses pemikiran dan gaya pergerakan yang tidak normal) yang disebabkan oleh oxycodone.
- Kegagalan paru-paru dan koma telah dilaporkan berlaku pada pesakit yang mengambil PGB Kapsul dan ubat penindas sistem saraf pusat yang lain, termasuk pada pesakit yang menyalahgunakan ubat.

Jika mana-mana perkara di atas berlaku kepada anda (atau anda tidak pasti), berbincang dengan doktor, ahli farmasi atau jururawat anda sebelum mengambil ubat ini.

Cara menggunakan Kapsul PGB

-Berapa banyak untuk digunakan

Ikuti semua arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan berhati-hati. Mereka mungkin berbeza daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan

Doktor anda akan menetapkan dos dan rejimen rawatan yang sesuai untuk anda. Julat dos ialah 150 hingga 600mg sehari diberikan sama ada dibahagikan dalam dua atau tiga dos.

- *Bila perlu digunakan*

Ambil Kapsul PGB tepat seperti yang ditetapkan. Pembekal penjagaan kesihatan anda akan memberitahu anda bila hendak mengambil Kapsul PGB. Adalah dinasihatkan untuk mengambil Kapsul PGB pada masa yang sama setiap hari.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput yang dinyatakan pada karton dan label botol selepas EXP. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut

- *Berapa lama perlu digunakan*

Teruskan menggunakan Kapsul PGB untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor.

Jangan berhenti mengambil Kapsul PGB tanpa berunding dengan pembekal penjagaan kesihatan anda.

Jika Kapsul PGB dihentikan, tapis ubat secara beransur-ansur selama 1 minggu daripada menghentikan ubat secara tiba-tiba. Berbincang dengan pembekal penjagaan kesihatan anda tentang cara menghentikan Kapsul PGB dengan perlahan.

- *Jika terlupa menggunakkan*

Rujuk doktor atau ahli farmasi anda tentang perkara yang perlu anda lakukan jika anda terlupa menggunakannya.

Ambil dos yang terlepas sebaik sahaja anda ingat. Jika hampir tiba masanya untuk dos seterusnya, tunggu sehingga kemudian untuk mengambil ubat dan langkau dos yang terlepas. Anda boleh mengambil dos yang terlepas hanya jika anda meninggalkan 4 jam antara dos. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang terlepas.

- *Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)*

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat anda, jika anda fikir anda atau orang lain mungkin telah menggunakan terlalu banyak ubat ini. Lakukan ini walaupun tiada tanda-tanda ketidakselesaan atau keracunan. Anda mungkin memerlukan rawatan perubatan segera.

Mengambil terlalu banyak tablet boleh menyebabkan kesan sampingan yang dijelaskan.

Semasa menggunakkan

-*Pekara yang perlu dilakukan*

Gunakan ubat anda betul-betul seperti yang diarahkan oleh doktor anda.

Beritahu semua doktor, doktor gigi dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang menggunakan Kapsul PGB.

Beritahu doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.

Ambil Kapsul PGB hanya dengan preskripsi doktor.

- *Pekara yang tidak boleh dilakukan*

Jangan berhenti menggunakan ubat kecuali dinasihatkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan sebarang ubat baru tanpa berunding dengan doktor atau ahli farmasi anda.

Jangan berikan Kapsul PGB kepada orang lain, walaupun mereka mempunyai simptom atau keadaan yang sama seperti anda.

Kehamilan, penyusuan susu ibu dan kesuburan.
Jangan hamil semasa anda mengambil ubat ini. Jika anda hamil atau menyusu, fikir anda mungkin hamil atau merancang untuk melahirkan bayi, minta nasihat doktor, ahli farmasi atau jururawat anda sebelum mengambil ubat ini.

- *Pekara yang perlu diberi perhatian*

Memandu dan menggunakan mesin

Ubat ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika tablet membuatkan anda berasa pening dan mengantuk yang melampau, jangan memandu atau menggunakan mesin.

Bertanya pembekal penjagaan kesihatan anda tentang bila boleh melakukan aktiviti ini.

Kesan sampingan

Seperti semua ubat, Kapsul PGB boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun tidak semua orang mendapatnya
.
Lawati doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana kesan sampingan berikut selepas menggunakan ubat ini.

Gejala yang lazim

- Pening
- Mengantuk
- Sakit Kepala

Lazim

- Serangan radang pada farinks dan rongga hidung.Increase appetite
- Perubahan emosi, keadaan keliru, mudah marah, kemurungan, hilang arah, tidak dapat tidur, dorongan seks berkurangan.
- Kekurangan koordinasi otot secara sukarela, kehilangan kawalan postur, pengecutan otot, kehilangan ingatan, gangguan ingatan, gangguan perhatian, kesemutan dan sensasi menusuk yang tidak normal, deria sentuhan berkurangan, keadaan santai/pengurangan kerengsaan atau kegelisahan, gangguan keseimbangan , kurang tenaga
- Penglihatan kabur dan penglihatan berganda
- Kehilangan imbangan
- Muntah, sembelit atau usus keras, pengumpulan gas dalam saluran pencernaan, pengumpulan gas atau udara dalam perut, mulut kering
- Kekejangan otot, sakit sendi, sakit belakang, sakit pada anggota badan, mengetatkan otot
- Disfungsi erektil
- Pengumpulan cecair dalam tisu, berjalan tidak normal, jatuh, berasa mabuk, berasa tidak normal, lemah.
- .Menambah berat badan

Tidak Lazim

- Tahap gula (glukosa) dalam darah anda jatuh terlalu rendah (hipoglisemia).
- Masalah penglihatan, bengkak mata atau sakit.
- Sensitif kepada pelbagai bunyi, mendapati bunyi yang tidak dapat ditanggung dan beban yang menyakitkan (Hyperacusis).
- Masalah jantung termasuk kegagalan jantung kongestif.
- Sukar bernafas, hidung berdarah, batuk, hidung tersumbat, rinitis, berdengkur, hidung kering
- Rasa terbakar atau tercucuk-cucuk dirasai pada tangan, lengan, kaki atau mana-mana bahagian badan yang lain.
- Penyakit refluks gastroesophageal,
- Hipersekresi air liur
- Kurangkan dorongan seks, kelewatan ejakulasi, haid yang menyakitkan atau sakit payudara.
- Gangguan darah atau kiraan platelet darah rendah.
- Penurunan berat badan

Jarang

- Koma

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau tindak balas advers ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan dengan melawati laman web npra.gov.my [Pengguna → Melaporkan Kesan Sampingan kepada Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)]

Cara Penyimpanan dan Pelupusan

Penyimpanan

Jauhkan ubat ini daripada pandangan dan capaian kanak-kanak.

Simpan di bawa suhu 30^0c

Ubat ini tidak memerlukan sebarang syarat penyimpanan khas.

Pelupusan

Ubat tidak boleh dibuang melalui air buangan atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- *Rupa dan warna produk*
  PGB-75 – Kapsul Pregabalin 75mg berwarna putih dan oren , kapsul gelatin keras bersaiz "4" dengan "I" dicetak pada penutup dan "35" pada sarung bawah yang mengandungi serbuk putih.

- *Bahan-bahan kandungan*

  - Bahan aktif
  Setiap kapsul keras mengandungi 75 mg of Pregabalin.

  - Bahan tidak aktif
  Lactose Monohydrate, Maize starch, Talc, kapsul keras .

  - Kulit capsule :
  Titanium dioxide, Red Iron oxide

- *MAL number(s):*

Pengilang
Indoco Remedies Limited.
Plant 1, L-14, Verna Industrial Area, Verna, IN- 403722, India.

Pemegang Pendaftaran Produk
Unimed Sdn. Bhd.,
53, Jalan Tembaga SD5/2B, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP
10.01.2024

Nombor Siri
NPRA (R2) 22/118