

VAGID 500

Clotrimazole Pessary 500mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan *VAGID 500*
2. Bagaimana *VAGID 500* berfungsi
3. Sebelum menggunakan *VAGID 500*
4. Cara menggunakan *VAGID 500*
5. Semasa menggunakan *VAGID 500*
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan *VAGID 500*
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP
11. Nombor siri

Apakah kegunaan *VAGID 500*

VAGID 500 merupakan ubat antikulat yang melawan jangkitan kawasan genital (*vaginitis*) iaitu radang pada faraj disebabkan oleh kulat (biasanya *candida*) dan jangkitan superinfeksi yang disebabkan oleh bakteria sensitif *Clotrimazole*.

Bagaimana *VAGID 500* berfungsi

Clotrimazole bertindak terhadap kulat dengan menghalang sintesis *ergosterol*. Dengan menghalang sintesis *ergosterol*, ia membawa kepada kemerosotan struktur dan fungsi membran sitoplasmik kulat. *Clotrimazole* mempunyai aksi spektrum antimikotik yang luas in vitro dan in vivo, yang meliputi dermatofita, yis dan kulat.

Sebelum mengambil *VAGID 500*

- Bila tidak boleh mengambil

Jangan mengambil *VAGID 500*:

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada clotrimazole atau mana-mana bahan lain *VAGID 500* (lihat Bahagian Maklumat Selanjutnya).
- Semasa haid anda kerana ia mungkin kurang berkesan

Langkah berjaga-jaga khas:

Seperti pesari lain, produk ini mungkin mengurangkan keberkesanan kontraseptif getah, seperti kondom atau diafragma. Oleh itu, anda harus menggunakan langkah berjaga-jaga alternatif selama sekurang-kurangnya lima hari selepas menggunakan produk ini. Jangan gunakan tampon, *douch* *intravaginal*, *spermisid* atau produk faraj lain semasa menggunakan produk ini. Elakkan hubungan faraj semasa

anda mengalami jangkitan kulat (*thrush*) dan semasa menggunakan produk ini kerana pasangan anda boleh dijangkiti.

- Jika mengambil ubat-ubat lain


Sila beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil atau baru-baru ini mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat-ubatan yang diperolehi tanpa preskripsi. Beritahu doktor anda jika anda mengambil *tacrolimus* atau *sirolimus* (digunakan untuk mengurangkan tindak balas imun untuk mencegah penolakan selepas pemindahan organ)

Kehamilan dan penyusuan badan:


Sekiranya anda mengandung, menyusu atau merancang untuk mengandung, beritahu doktor atau bidan anda sebelum menggunakan *VAGID 500 Pessary*. Sekiranya anda telah memaklumkan kepada doktor atau bidan anda, ikuti arahannya.

Cara menggunakan *VAGID 500*

1. Keluarkan aplikator dari bungkusan. Tarik pelocok sehingga ke penghujungnya.
2. Keluarkan pesari daripada lepuh dan masukkan dengan kukuh ke dalam aplikator.
3. Pesari muat rapat ke dalam aplikator dan perlu dihipit ke dalam pemegangnya cukup jauh (kira-kira 1 cm.) supaya dapat dipegang dengan kekal di tempat semasa memasukkannya.



4. Masukkan aplikator dengan berhati-hati ke dalam faraj sedalam yang selesai. (Ini lebih mudah dilakukan dengan berbaring sambil lutut dibengkokkan ke atas.)
5. Sambil memegang aplikator di tempatnya, tekan pelocok perlahan-lahan sehingga ia berhenti supaya pesari dimasukkan ke dalam faraj.



6. Jika pessari terlalu lembut, ia boleh disejukkan di dalam peti sejuk atau di bawah air paip sejuk yang mengalir sebelum dibuka bungkusannya.

7. Keluarkan aplikator dengan berhati-hati. Buang aplikator di tempat yang selamat, di luar capaian kanak-kanak.

Aplikator tidak boleh dibuang ke dalam tandas dan disiram air.

- Berapa banyak harus digunakan

Ikut segala arahan yang diberikan kepada anda oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Mungkin terdapat perbezaan daripada maklumat yang terkandung dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan bantuan.

Kesan sampingan

Seperti semua ubat, *VAGID 500* boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Seperti semua ubat, sesetengah orang mungkin alah kepada pesari. Sekiranya anda alah, tindak balas akan berlaku sebaik sahaja anda menggunakan ubat ini. Jika anda mengalami reaksi alergi atau kemerahan, rasa membakar, sakit, gatal-gatal atau bengkak menjadi lebih buruk, berhenti menggunakan produk ini dan beritahu doktor anda segera atau hubungi Jabatan Kecemasan Jabatan hospital terdekat anda.

Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk:

- Ruam
- Sukar menelan atau bernafas.
- Bengkak pada bibir, muka, tekak atau lidah anda
- Kelemahan, rasa pening atau pingsan.
- Loya.
- Selepas anda menggunakan pesari, anda mungkin mengalami:
- Gatal-gatal, ruam, bengkak, kemerahan, ketidakselesaan, rasa "membakar", kerengsaan, faraj mengelupas atau pendarahan.
- sakit di bahagian perut atau pelvis.

Jika anda mengalami apa-apa kesan di atas, beritahu doktor anda dengan serta-merta.

VAGID 500

Clotrimazole Pessary 500mg

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan sampingan ubat terus kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan dengan melayari laman web npra.gov.my [Pengguna →Melaporkan Kesan Sampingan kepada Ubat (ConSERF) atau Vaksin (AEFI)]

No. Siri

NPRA(R2/1)241212/1388.

Penyimpanan dan Pelupusan VAGID 500

Penyimpanan

Simpan di tempat kering di bawah 30°C. Jangan bekukan. Jauhi daripada kanak-kanak

Pelupusan

Ubat-ubatan tidak boleh dibuang melalui air sisa atau sisa isi rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi alam sekitar.

Penerangan Produk

- Rupa dan warna produk

Pesari berbentuk peluru berwarna putih legap.

- Bahan-bahan kandungan:

- Bahan aktif

Clotrimazole

- Bahan tidak aktif

Hard Fat Ph.Eur., Macrogol
Hydroxystearate Ph.Eur., Polysorbate
80 Ph.Eur.

Nombor MAL:

MAL23116016AZ

Pengilang

Bliss GVS Pharma Limited
Plot No. 11, Dewan Udyog Nagar,
Aliyali, Palghar, 401404.
Maharashtra, India

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn. Bhd.
No.53, Jalan Tembaga SD 5/2B,
Bandar Sri Damansara,
52200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh kemaskini RiMUP

September 2025