

ELECTRAL (Oral Rehydration Salts BP 4.4 g)

Potassium chloride, Sodium chloride, Anhydrous glucose, Sodium citrate (0.3 g, 0.52 g, 2.7 g, 0.58 g)

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan Electral 4.4G
2. Bagaimana Electral 4.4G berfungsi
3. Sebelum menggunakan Electral 4.4G
4. Cara menggunakan Electral 4.4G
5. Semasa menggunakan Electral 4.4G
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan Electral 4.4G
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan Electral 4.4 G

Electral 4.4 G boleh digunakan untuk melegakan cirit-birit jangka pendek (akut) dan menggantikan garam dan cecair yang hilang, untuk mengelakkan dehidrasi.

Bagaimana Electral 4.4 G berfungsi

Electral 4.4 G mengandungi glukosa dan pelbagai garam yang tergolong dalam kumpulan ubat yang disebut elektrolit oral yang bertindak untuk menggantikan cecair dan garam yang hilang dalam badan.

Sebelum menggunakan Electral 4.4 G

Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil Electral 4.4G jika:

- Anda mengalami dehidrasi teruk dan muntah berterusan.
- Anda alergi atau hipersensitif kepada mana-mana ramuan electral 4.4G
- Anda mempunyai penyumbatan sebahagian atau sepenuhnya (obstruksi) usus.
- Anda mempunyai penyakit hati atau buah pinggang

Sebelum menggunakan Electral 4.4G

Beritahu ahli farmasi atau doktor anda jika anda menggunakan mana-mana garam rehidrasi lain.

Ubat ini mengandungi glukosa, iaitu sejenis gula. Jika anda telah diberitahu oleh doktor bahawa anda tidak boleh mengambil gula, berbincanglah dengan doktor sebelum mengambil ubat ini.

Kehamilan dan Penyusuan

Tanya doktor atau ahli farmasi anda untuk mendapatkan nasihat sebelum penggunaan ubat ini sekiranya anda hamil atau menyusui. Ini termasuk jika anda merancang untuk hamil atau kemungkinan anda hamil.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Ubat ini tidak dijangka memberi kesan kepada apa-apa ubat lain yang mungkin anda ambil. Jika anda tidak pasti tentang interaksi dengan mana-mana ubat, bincang dengan ahli farmasi anda. Ini termasuk ubat-ubatan yang ditetapkan oleh doktor dan ubat yang anda beli untuk diri sendiri, termasuk ubat herba dan homeopati.

Cara menggunakan Electral 4.4G

Sentiasa gunakan Electral 4.4G sama seperti yang diberitahu oleh doktor atau ahli farmasi anda.

Semak paket ubat tidak koyak sebelum digunakan. Sekiranya ia, jangan ambil paket itu.

Cara menyediakan ubat ini

1. Campurkan kandungan setiap paket dengan 200 ml (tujuh cawan auns) air minuman segar. Untuk bayi hanya gunakan air masak dan sejuk pada setiap masa.
2. Untuk orang dewasa apabila air minuman segar tidak ada, gunakan air masak atau sejuk.
3. Sediakan ubat hanya jika diperlukan dan minum dalam masa satu jam.
4. Hanya gunakan air untuk larutkan kandungan dalam paket ubat. Pastikan anda menggunakan jumlah air yang betul (iaitu 200 ml untuk satu paket, 400 ml untuk dua sachet). Ini untuk memastikan garam dan air dapat diserap ke dalam badan dengan betul.
5. Akhirnya minum larutan yang dibancuh.

- Berapa banyak harus digunakan

Dewasa dan kanak-kanak 12 tahun dan ke atas:

Ambil satu atau dua sachet dan larutkan dalam air.

Kanak-kanak:

Ambil satu sachet dan larutkan dalam air.

Bayi:

Jangan berikan ubat ini melainkan jika doktor memberitahu anda. Ikut arahan doktor anda dan tanya ahli farmasi anda jika anda memerlukan lebih banyak maklumat.

Sekiranya perlu hentikan semua makanan pepejal dan cecair. Selama 24 jam pertama berikan satu hingga satu setengah kali jumlah suapan normal yang bayi anda ambil pada setiap suapan.

Untuk bayi menyusui, berikan ubat ini pada masa suapan biasa sahaja.

- Bila perlu digunakan

Gunakan seperti yang diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Rujuk kepada doktor atau ahli farmasi mengenai tempoh rawatan.

- Jika terlupa menggunakan

Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos terlupa. Ambil dos seterusnya apabila anda perlu.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Electral 4.4G biasanya tidak berbahaya jika anda mengambil lebih dari yang anda perlukan. Walau bagaimanapun, jika jumlah yang banyak diambil, anda harus berbincang dengan doktor anda atau pergi ke hospital dengan segera. Ini amat penting jika kanak-kanak atau bayi atau jika anda mempunyai masalah hati atau buah pinggang yang teruk. Ambil pek ubat dengan anda.

Semasa menggunakan Electral 4.4G

- Perkara yang perlu dilakukan

Sekiranya anda akan mula mengambil apa-apa ubat baru, beritahu ahli farmasi atau doktor anda bahawa anda sedang mengambil elektrol 4.4G

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan menggunakan lebih daripada dos yang disarankan melainkan dibenarkan oleh doktor anda.

Jangan gunakan kurang atau lebih daripada 200 ml air. Jika anda

ELECTRAL (Oral Rehydration Salts BP 4.4 g)

Potassium chloride, Sodium chloride, Anhydrous glucose, Sodium citrate (0.3 g, 0.52 g, 2.7 g, 0.58 g)

membuat minuman itu akan menjadi terlalu lemah atau terlalu kuat. Ia tidak akan berfungsi juga. Anda juga boleh menggangguimbangan garam dalam badan anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Hentikan penggunaan jika berlaku kerengsaan atau sensitiviti.

Sekiranya simptom berterusan selama lebih dari 24 hingga 48 jam, anda perlu berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda kerana rawatan lain mungkin diperlukan. Cirit-birit yang teruk dan berterusan dan / atau demam perlu dirawat di bawah pengawasan perubatan.

Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, Electral 4.4g boleh menyebabkan kesan sampingan walaupun bukan semua orang mengalaminya. Beritahu doktor anda dengan segera jika anda mengalami mana-mana simptom berikut selepas mengambil ubat ini kerana simptom ini boleh memudaratkan.

- Muntah
- Hidrasi teruk
- Kalium darah tinggi

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [Consumers - > Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)]

Penyimpanan dan pelupusan

Electral 4.4g

- Penyimpanan

Simpan di bawah 30 °C

- Pelupusan

Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

Rupa dan warna produk

Ia adalah serbuk butiran putih yang mempunyai aroma seperti oren, larutan

dalam air memberikan rasa manis dan masam.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Potassium chloride, Sodium chloride, anhydrous glucose, Sodium citrate

- Bahan tidak aktif

Anhydrous Citric Acid, Orange flavor, Sucralose

-Nombor MAL: MAL23116024XZ

Pengilang

FDC Limited

B-8, MIDC Industrial Area,
Waluj, Chhatrapati Sambhajnagar
-431 136, Maharashtra.

Pemegang Pendaftaran Produk

Unimed Sdn Bhd
53, Jalan Tembaga SD 5/2B, Bandar
Sri Damansara,
52200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tarikh Kemaskini RiMUP

30/06/2025

Nombor Siri

NPRA (R2) 23/139