

ONEGABA 600

Gabapentin 600 mg

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan ONEGABA 600
2. Bagaimana ONEGABA 600 berfungsi
3. Sebelum menggunakan ONEGABA 600
4. Cara menggunakan ONEGABA 600
5. Semasa menggunakan ONEGABA 600
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan ONEGABA 600
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang dan Pemegang Pendaftaran Produk
10. Tarikh kemaskini RiMUP

Apakah kegunaan ONEGABA 600

ONEGABA 600 digunakan:

- bersama dengan ubat-ubatan lain untuk membantu merawat sawan separa (sawan yang bermula di satu bahagian otak) dalam kalangan orang dewasa dan kanak-kanak yang berumur 3 tahun ke atas.
- untuk merawat kesakitan yang berkait dengan saraf dalam kalangan orang dewasa (18 tahun ke atas), sebagai contoh yang disebabkan oleh kencing manis, atau kayap.

Bagaimana ONEGABA 600 berfungsi

ONEGABA 600 mengandungi gabapentin sebagai bahan aktif, iaitu sejenis ubat anti sawan. Gabapentin berfungsi dengan menenangkan saraf yang terlalu aktif. Ia mengurangkan isyarat elektrik berlebihan dalam otak yang mencetuskan sawan. Bagi sakit saraf, ia menghalang saraf yang rosak daripada menghantar isyarat sakit yang salah ke otak.

Sebelum menggunakan ONEGABA 600

- Bila tidak boleh menggunakan

Jangan mengambil ONEGABA 600:

- Jika anda alah (hipersensitif) kepada gabapentin atau kepada mana-mana bahan lain dalam ubat ini (seperti yang disenaraikan dalam bahagian maklumat lanjut).

- Sebelum menggunakan

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mempunyai:

- masalah pernafasan
- penyakit buah pinggang
- keadaan saraf/otak yang lain

Kehamilan dan penyusuan

- Sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda jika anda sedang hamil,

merancang untuk hamil, atau sedang menyusukan anak sebelum menggunakan sebarang ubat.

- Gabapentin hanya boleh digunakan semasa kehamilan jika manfaatnya melebihi risiko kepada janin.
- Gabapentin dirembeskan ke dalam susu ibu dan mungkin menjejaskan bayi anda. Doktor anda akan berbincang mengenai risiko dan manfaat penyusuan semasa anda mengambil gabapentin.

- Jika mengambil ubat-ubat lain

Maklumkan kepada doktor anda jika anda mengambil sebarang ubat lain, termasuk ubat yang dibeli tanpa preskripsi daripada farmasi, pasar raya atau kedai makanan kesihatan.

Beritahu doktor anda jika anda sedang mengambil, baru mengambil minuman beralkohol atau dadah rekreasi kerana ia boleh mempengaruhi cara ONEGABA 600 berfungsi atau meningkatkan risiko kesan sampingan.

Beritahu doktor atau ahli farmasi anda jika anda mengambil:

- Antasid yang mengandungi aluminium atau magnesium (untuk pedih ulu hati/indigestion). Ambil Gabapentin sekurang-kurangnya 2 jam selepas antasid.
- Cimetidine (untuk ulser perut/acid reflux).
- Ubat epilepsi lain seperti phenobarbital, phenytoin, valproic acid, carbamazepine.
- Morfin (ubat penahan sakit jenis opioid).
- pil perancang yang mengandungi norethindrone dan/atau ethinyl estradiol.
- Probenecid (ubat untuk rawatan gout).

Doktor anda mungkin perlu memantau keadaan anda dengan lebih rapi atau melaraskan dos ubat. Sekiranya anda mengambil morfin bersama gabapentin, anda perlu dipantau bagi tanda-tanda mengantuk yang berlebihan atau penekanan sistem saraf pusat (CNS), dan dos salah satu ubat mungkin perlu diselaraskan.

Cara menggunakan ONEGABA 600

Ikuti semua arahan yang diberikan oleh doktor dan ahli farmasi anda dengan teliti. Arahan tersebut mungkin berbeza daripada maklumat yang terdapat dalam risalah ini. Jika anda tidak memahami arahan pada label, sila minta bantuan daripada doktor atau ahli farmasi anda.

- Berapa banyak harus digunakan

Untuk epilepsi

- Dewasa dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas: Dos permulaan biasanya antara 300 mg dan 900 mg setiap hari. Selepas itu, dos boleh ditingkatkan seperti yang diarahkan oleh doktor anda, sehingga maksimum 3600 mg setiap hari.
- Kanak-kanak berumur 3 – 12 tahun: Dos akan ditentukan oleh doktor berdasarkan berat badan kanak-kanak.

Untuk sakit saraf pada orang dewasa:

- Dos permulaan biasanya ialah 300mg tiga kali sehari (jumlah 900 mg sehari).
- Doktor anda mungkin akan meningkatkan dos secara berperingkat jika perlu, sehingga 3,600 mg sehari (dalam 3 dos berasingan).

Bagi pesakit dengan masalah buah pinggang:

Doktor anda akan melaraskan dos mengikut keadaan anda jika anda sedang menjalani hemodialisis atau mengalami masalah buah pinggang.

- Bila perlu digunakan

- ONEGABA 600 boleh diambil dengan atau tanpa makanan.
- Ambil tiga kali sehari atau ikut arahan doktor atau ahli farmasi anda.
- Ambil setiap dos tepat pada masanya dan jangan biarkan lebih daripada 12 jam antara dos.

- Berapa lama perlu digunakan

Ambil ubat ini untuk tempoh yang disyorkan oleh doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Jika anda terlupa mengambil satu dos, ambilnya secepat mungkin apabila anda ingat, kecuali jika sudah hampir waktu untuk dos seterusnya. Jangan ambil dos berganda untuk menggantikan dos yang tertinggal.

- Jika mengambil berlebihan (terlebih dos)

Hubungi doktor anda dengan segera atau pergi ke Jabatan Kecemasan hospital terdekat, jika terambil dos berlebihan. Ini perlu dilakukan walaupun tiada sebarang kesan keracunan atau rasa tidak selesa. Anda mungkin memerlukan perhatian perubatan segera.

Pengambilan tablet yang berlebihan boleh menyebabkan pening, penglihatan berganda, pertuturan tidak jelas, mengantuk, lesu, dan cirit-birit ringan.

Semasa menggunakan ONEGABA 600

- Perkara yang perlu dilakukan

ONEGABA 600

Gabapentin 600 mg

- Ambil ubat anda tepat seperti yang diarahkan oleh doktor.
- Beritahu semua doktor, doktor gigi, dan ahli farmasi yang merawat anda bahawa anda sedang mengambil ONEGABA 600.
- Maklumkan kepada doktor anda dengan segera jika anda hamil semasa menggunakan ubat ini.
- Ambil ONEGABA 600 hanya dengan preskripsi doktor.
- Perkara yang tidak boleh dilakukan
 - Jangan berhenti menggunakan ubat ini kecuali diarahkan oleh doktor anda.
 - Jangan mula mengambil sebarang ubat baru tanpa berbincang dengan doktor atau ahli farmasi anda.
 - Jangan berkongsi ONEGABA 600 dengan sesiapa, walaupun mereka mempunyai simptom atau penyakit yang sama.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Memandu dan menggunakan jentera

- Ubat ini mungkin menjejaskan keupayaan anda untuk memandu atau menggunakan mesin. Jika tablet ini membuat anda berasa mengantuk, pening, atau menjejaskan penglihatan anda, jangan memandu atau menggunakan mesin dan hubungi doktor anda dengan segera.
- Jangan berhenti mengambil ONEGABA 600 secara tiba-tiba, kerana ia boleh menyebabkan sawan berulang, termasuk sawan yang berterusan dan teruk. Jika rawatan perlu dihentikan, doktor anda akan mengurangkan dos secara berperingkat selama sekurang-kurangnya satu minggu.
- Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika anda mengalami kesukaran bernafas semasa mengambil ubat ini, terutamanya jika anda merupakan warga emas atau sedang mengambil ubat yang menekan sistem saraf pusat (CNS). Jika ini berlaku, dapatkan rawatan perubatan dengan segera atau hubungi doktor anda secepat mungkin.

Kesan-kesan sampingan

Seperti ubat-ubatan lain, ONEGABA 600 boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya.

Kesan sampingan yang mungkin berlaku termasuk:

Biasa dilaporkan

- pening

- vertigo (rasa seperti berputar)
- mengantuk
- rasa kebas atau kesemutan (paresthesia)
- perubahan refleks
- pergerakan badan yang berlebihan (hiperkinesia)
- keresahan
- perasaan bermusuhan
- lemah badan
- rasa tidak sihat
- bengkak muka
- tekanan darah tinggi
- hilang selera makan
- kembung perut
- keradangan gusi
- sakit sendi
- radang paru-paru
- jangkitan saluran kencing
- lebam (purpura)
- gangguan penglihatan

Kanak-kanak (3–12 tahun)

- jangkitan virus
- demam
- loya dan/atau muntah
- mengantuk

Jarang berlaku tetapi serius

Dapatkan rawatan perubatan segera jika anda mengalami:

- masalah pernafasan yang teruk (pernafasan menjadi perlahan atau lemah).
- kesukaran menelan.

Jumpa doktor atau ahli farmasi anda dengan segera jika anda mengalami sebarang kesan sampingan selepas menggunakan ubat ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*].

Cara penyimpanan dan pelupusan ONEGABA 600

- Penyimpanan

Simpan dibawah suhu 30°C.

- Pelupusan

- Ubat-ubatan tidak harus dilupuskan melalui air buangan atau sisa isi rumah. Sila rujuk kepada ahli farmasi anda mengenai cara yang betul untuk melupuskan ubat yang tidak diperlukan lagi. Langkah-langkah ini dapat membantu melindungi alam sekitar.

Maklumat lanjut

- Rupa dan warna produk

ONEGABA 600

Tablet berbentuk putih, dwicembung, elips, bersalut filem, dengan garisan pemisah yang jelas di kedua-dua belah, terukir huruf 'D' dan nombor '24' di kedua-dua sisi garisan pemisah pada satu bahagian, dan bahagian lain licin tanpa sebarang ukiran.

Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Gabapentin

- Bahan tidak aktif

Maize starch, Crospovidone, Copovidone, Isopropyl Alcohol, Cellulose, microcrystalline (Avicel PH102 & Ceolus KG1000), Magnesium stearate, Opadry White YS-1-18111 and Methylene Chloride

- Nombor MAL

MAL13025038AZ

Pengilang

Aurobindo Pharma Limited, Unit-VII (SEZ),

Plot No. S1 Survey No. 411/P, 425/P, 434/P, 435/P & 458/P, (Part) Green Industrial Park, Polepally Village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana State, India.

Pemegang Pendaftaran Produk

UNIMED SDN BHD
No. 53, Jalan Tembaga SD5/2B
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur.

Tarikh kemaskini RiMUP

26/08/2026

Nombor Siri:

NPRA(R4/1)090626/00027